

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 79003

Agrarwirtschaft 37/79

C II 4 - m 8/79 (Erscheint nur für Juni bis November)

15.8.79

Wachstumstand der Reben Anfang August 1979

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Weinbaugebiet	1979		Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	1979	
	Anfang Juli	Anfang August		Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern ¹⁾			Begutachtungsziffern ¹⁾	
Remstal-Stuttgart	2,0	2,0	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,1	1,9
Württembergisches Unterland	2,1	1,9	Breisgau	2,1	2,0
Kocher-Jagst-Tauber	3,2	3,1	Ortenau	2,1	2,0
Württemberg	2,1	2,0	Baden	2,2	2,1
dagegen 1978	2,5	2,6	dagegen 1978	2,7	3,0
1977	2,1	1,9	1977	2,3	2,2
1976	1,9	2,1	1976	1,8	1,9
1975	2,0	2,0	1975	2,0	2,2
			Baden-Württemberg	2,2	2,1
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,3	2,2	dagegen 1978	2,6	2,9
Badisches Frankenland	4,2	3,9	1977	2,2	2,1
Bodensee	2,0	2,0	1976	1,8	2,0
Markgräflerland	2,1	2,1	1975	2,0	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
48	51	1	3	44	53	5	59	36	0	29	71
Baden											
35	64	1	5	45	50	7	52	31	2	25	73
Baden-Württemberg											
41	58	1	4	45	51	6	61	33	1	27	72

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Verrieselungsschäden

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche ¹⁾			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	92	7	1	-
Riesling	91	8	1	-
Silvaner	93	7	-	-
Gutedel	91	9	-	-
Ruländer	95	5	-	-
Weißer Burgunder	86	13	1	-
Auxerrois	-	-	-	-
Kerner	93	7	-	-
Gewürztraminer	95	5	-	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	-	-
Blauer Spätburgunder	96	4	-	-
Portugieser	92	8	-	-
Lemberger	92	7	1	-
Schwarzriesling	97	3	-	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	84	14	2	-
Riesling	89	9	2	-
Silvaner	87	12	1	-
Gutedel	63	26	9	2
Ruländer	87	12	1	-
Weißer Burgunder	86	13	1	-
Auxerrois	84	13	3	-
Kerner	-	-	-	-
Gewürztraminer	76	21	3	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	98	2	-	-
Blauer Spätburgunder	91	8	1	-
Portugieser	92	7	1	-
Lemberger	94	3	3	-
Schwarzriesling	90	10	-	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	85	13	2	-
Riesling	91	8	1	-
Silvaner	91	9	-	-
Gutedel	63	26	9	2
Ruländer	87	12	1	-
Weißer Burgunder	86	13	1	-
Auxerrois	84	13	3	-
Kerner	93	7	-	-
Gewürztraminer	77	20	3	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	-	-
Blauer Spätburgunder	91	8	1	-
Portugieser	92	8	-	-
Lemberger	92	7	1	-
Schwarzriesling	96	4	-	-

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.