

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 80003

Agrarwirtschaft 35/80

C II 4 - m 8/80 (Erscheint nur für Juni bis November)

19.8.80

Wachstumstand der Reben Anfang August 1980

1. Wachstumstand der Reben

1. Wachstumstand der Reben		1980		Weinbaubereich		1980	
Weinbaubereich		Anfang Juli	Anfang August	Weinbaubereich		Anfang Juli	Anfang August
Weinbaugbiet		Bewertungsdifferenz ¹⁾		Land		Bewertungsdifferenz ¹⁾	
Remstal-Stuttgart		2,5	3,2	Kaiserstuhl-Tuniberg		2,6	3,7
Württembergisches Unterland		2,5	3,2	Breisgau		2,8	3,8
Kocher-Jagst-Tauber		2,5	4,1	Ortenau		3,1	4,1
Württemberg		2,5	3,2	Baden		2,7	3,8
dagegen 1979		2,1	2,0	dagegen 1979		2,2	2,1
1978		2,5	2,6	1978		2,7	3,0
1977		2,1	1,9	1977		2,3	2,2
1976		1,9	2,1	1976		1,8	1,9
				Baden-Württemberg		2,6	3,6
Badische Bergstraße/Kraichgau		2,5	4,0	dagegen 1979		2,2	2,1
Badisches Frankenland		2,4	4,1	1978		2,6	2,9
Bodensee		2,9	3,3	1977		2,2	2,1
Markgräflerland		2,7	3,6	1976		1,8	2,0

¹⁾ Skizzen: 1,0 = sehr gut = mehr als 1/4 Rebstock, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Rebstock, 3,0 = mittel = 1/2 Rebstock, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Rebstock, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Rebstock.

2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonneneindauer			Gesamtbewertung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungenügend	normal	genügend	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut

Württemberg

1	14	85	92	6	2	91	8	1	80	20	0
---	----	----	----	---	---	----	---	---	----	----	---

Baden

1	11	88	94	5	1	97	2	1	89	11	-
---	----	----	----	---	---	----	---	---	----	----	---

Baden-Württemberg

1	12	87	93	5	2	94	5	1	85	15	0
---	----	----	----	---	---	----	---	---	----	----	---

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Verrieselungsschäden

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
Schäden in % der Ertragsreife(Achel)				

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	23	15	28	34
Riesling	18	11	33	38
Silvaner	27	22	28	23
Gutedel	21	10	38	31
Ruländer	15	12	35	38
Weißer Burgunder	33	7	32	28
Auxerrois	-	-	-	-
Kerner	33	34	22	11
Gewürztraminer	6	7	2	85

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	41	37	17	5
Blauer Spätburgunder	21	16	35	28
Portugieser	38	32	21	9
Lemberger	19	17	30	34
Schwarzriesling	24	18	26	32

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	17	9	29	45
Riesling	13	5	19	63
Silvaner	18	25	28	29
Gutedel	25	10	51	14
Ruländer	14	11	30	45
Weißer Burgunder	18	9	24	49
Auxerrois	19	8	20	53
Kerner	-	-	-	-
Gewürztraminer	4	-	10	86

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	14	19	29	38
Blauer Spätburgunder	20	13	35	32
Portugieser	24	16	29	31
Lemberger	9	20	44	27
Schwarzriesling	17	8	21	54

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	18	10	29	43
Riesling	16	9	28	47
Silvaner	23	23	28	26
Gutedel	25	10	51	14
Ruländer	14	11	30	45
Weißer Burgunder	18	9	24	49
Auxerrois	19	8	20	53
Kerner	33	34	22	11
Gewürztraminer	4	-	10	86

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	41	37	17	5
Blauer Spätburgunder	20	13	35	32
Portugieser	36	30	22	12
Lemberger	19	17	30	34
Schwarzriesling	23	17	26	34

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.