

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 81001

Agrarwirtschaft 22/81

C II 4 - m 6/81 (Erscheint nur für Juni bis November)

16.6.81

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1981

Weinbaubereich Weinbaugebiet	Anfang Juni 1981	Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Anfang Juni 1981
	Begutachtungsziffer ¹⁾		Begutachtungsziffer ¹⁾
Remstal-Stuttgart	3,1	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,7
Württembergisch Unterland	3,9	Breisgau	2,9
Kocher-Jagst-Tauber	4,8	Ortenau	2,6
Württemberg	3,8	Baden	2,9
dagegen 1980	1,8	dagegen 1980	1,9
1979	2,2	1979	2,4
1978	2,1	1978	2,2
1977	2,3	1977	2,4
Badische Bergstraße/Kraichgau	3,0	Baden-Württemberg	3,2
Badisches Frankenland	4,6	dagegen 1980	1,9
Bodensee	3,2	1979	2,3
Markgräflerland	2,9	1978	2,2
		1977	2,4

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

1. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstellern beurteilt ... die (den)								
Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

0	100	0	4	94	2	49	39	12
---	-----	---	---	----	---	----	----	----

Baden

3	97	-	8	90	2	45	43	12
---	----	---	---	----	---	----	----	----

Baden-Württemberg

2	98	0	6	92	2	47	41	12
---	----	---	---	----	---	----	----	----

2. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1981

Weinbaubereich Weinbaugbiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreife Fläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	98	1	0	1			
Württembergisch Unterland	97	3	0	0	5	44	51
Kocher-Jagst-Tauber	83	6	8	3	1	42	57
Württemberg					22	69	9
	97	3	0	0	4	45	51
Badische Bergstraße/Kraichgau	94	4	2	0			
Badisches Frankenland	50	26	18	6	5	46	49
Bodensee	86	3	9	2	26	55	19
Harkgrüflerland	93	6	1	-	13	67	20
Kaiserstuhl-Tuniberg	95	5	-	-	3	62	35
Breisgau	98	2	-	-	4	72	24
Ortenau	87	12	1	-	-	68	32
Baden					-	45	55
	91	7	2	0	6	56	38
Baden-Württemberg	94	5	1	0	5	51	44

3. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Weinbaugbiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsreife Fläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	37	21	21	21	16	42	42
Württembergisch Unterland	17	13	25	45	11	34	55
Kocher-Jagst-Tauber	6	3	9	82	57	26	17
Württemberg							
	20	14	23	43	16	35	48
Badische Bergstraße/Kraichgau	60	22	13	5	10	46	44
Badisches Frankenland	11	3	13	73	23	47	30
Bodensee	37	14	22	27	21	43	36
Harkgrüflerland	64	22	10	4	1	62	37
Kaiserstuhl-Tuniberg	59	32	6	3	-	72	28
Breisgau	72	20	6	2	3	74	23
Ortenau	75	21	4	0	2	55	43
Baden							
	62	24	8	6	7	57	36
Baden-Württemberg	46	20	14	20	11	47	42