

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 83001

Agrarwirtschaft 21/83

C II 4 - m 6/83 (Erscheint nur für Juni bis November)

16.6.83

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1983

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Weinbaugebiet	Anfang Juni 1983	Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Anfang Juni 1983
	Begutachtungsziffer ¹⁾		Begutachtungsziffer ¹⁾
Remstal-Stuttgart	2,6	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,1
Württembergisch Unterland	2,3	Breisgau	2,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,5	Ortenau	2,4
Württemberg	2,4	Baden	2,8
dagegen 1982	2,1	dagegen 1982	2,3
1981	3,8	1981	2,9
1980	1,8	1980	1,9
1979	2,2	1979	2,4
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	Baden-Württemberg	2,6
Badisches Frankenland	2,1	dagegen 1982	2,2
Bodensee	2,1	1981	3,2
Markgräflerland	2,9	1980	1,9
		1979	2,3

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstatlern beurteilten % die (den)								
Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig
Württemberg								
-	71	29	-	25	75	24	60	16
Baden								
1	73	26	0	23	77	44	51	5
Baden-Württemberg								
1	72	27	0	24	76	35	55	10

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1983

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	0	0	4	35	61
Württembergisch Unterland	99	1	-	-	1	19	80
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	-	18	82
Württemberg	99	1	0	0	1	24	75
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	-	27	73
Badisches Frankenland	99	1	-	-	3	39	58
Bodensee	100	-	-	-	-	57	43
Markgräflerland	99	1	0	-	3	51	46
Kaiserstuhl-Tuniberg	99	1	-	-	-	53	47
Breisgau	98	2	-	-	-	69	31
Ortenau	99	1	-	-	-	45	55
Baden	99	1	0	-	1	45	54
Baden-Württemberg	99	1	0	0	1	36	63

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	-	49	51
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	19	81
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	-	23	77
Württemberg	100	0	-	-	-	27	73
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	-	-	-	-	33	67
Badisches Frankenland	100	-	-	-	3	20	77
Bodensee	100	-	-	-	-	33	67
Markgräflerland	100	-	-	-	3	65	32
Kaiserstuhl-Tuniberg	99	-	-	1	-	73	27
Breisgau	100	-	-	-	6	56	38
Ortenau	99	1	-	-	3	47	50
Baden	100	0	-	0	2	48	50
Baden-Württemberg	100	0	-	0	1	39	60