

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 83002

Agrarwirtschaft 28/83

C II 4 - m 7/83 (Erscheint nur für Juni bis November)

29.7.83

## Wachstumstand der Reben Anfang Juli 1983

### 1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Weinbaugebiet		1983		Weinbaubereich Weinbaugebiet Land		1983	
		Anfang Juni	Anfang Juli			Anfang Juni	Anfang Juli
		Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>				Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>	
Remstal-Stuttgart	2,6	2,5	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,1	3,0		
Württembergisches Unterland	2,3	2,2	Breisgau	2,9	2,8		
Kocher-Jagst-Tauber	2,5	2,4	Ortenau	2,4	2,5		
Württemberg	2,4	2,3	Baden	2,8	2,7		
dagegen 1982	2,1	1,9	dagegen 1982	2,3	2,1		
1981	3,8	3,5	1981	2,9	2,7		
1980	1,8	2,5	1980	1,9	2,7		
1979	2,2	2,1	1979	2,4	2,2		
			Baden-Württemberg	2,6	2,5		
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	2,5	dagegen 1982	2,2	2,0		
Badisches Frankenland	2,1	2,1	1981	3,2	3,0		
Bodensee	2,1	2,5	1980	1,9	2,6		
Markgräflerland	2,9	2,6	1979	2,3	2,2		

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

### 2. Witterung der letzten sechs Wochen

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
5	70	25	6	60	34	7	77	16	1	47	52
Baden											
5	72	23	11	57	32	11	73	16	4	53	43
Baden-Württemberg											
5	71	24	9	58	33	9	75	16	3	50	47

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

### 3. Beginn der Blüte nach Rebsorten

Rebsorten	Beginn				Dauer				
	bis 10.6.	11.6. bis 20.6.	21.6. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 4 Tage	5 bis 7 Tage	8 bis 10 Tage	11 bis 14 Tage	15 Tage und mehr
	% der Meldungen								

#### Württemberg

<b>Weißweinsorten</b>									
Müller-Thurgau	1	28	70	1	16	55	26	3	0
Riesling	0	13	81	6	14	51	32	3	-
Silvaner	-	12	81	7	12	51	28	9	0
Gutedel	-	17	78	5	14	60	19	7	-
Ruländer	-	28	69	3	16	51	31	2	-
Weißer Burgunder	-	7	89	4	24	56	16	4	-
Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner	1	19	78	2	15	54	28	3	-
Gewürztraminer	-	15	76	9	21	47	27	5	-
<b>Rotweinsorten</b>									
Blauer Trollinger	-	12	82	6	10	48	36	6	-
Blauer Spätburgunder	-	28	66	6	15	56	25	4	0
Portugieser	1	30	67	2	13	58	25	4	-
Lemberger	-	18	78	4	15	52	27	6	-
Schwarzriesling	-	22	73	5	13	54	32	1	-

#### Baden

<b>Weißweinsorten</b>									
Müller-Thurgau	1	35	61	3	11	40	41	8	0
Riesling	1	22	72	5	9	37	47	7	0
Silvaner	1	20	70	9	10	38	41	11	-
Gutedel	1	8	79	12	7	27	48	18	0
Ruländer	1	43	52	4	10	47	37	6	0
Weißer Burgunder	1	40	57	2	8	45	40	7	-
Auxerrois	1	25	72	2	9	48	31	12	-
Kerner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	27	65	7	12	31	45	12	0
<b>Rotweinsorten</b>									
Blauer Trollinger	-	12	82	6	26	33	33	8	-
Blauer Spätburgunder	2	46	49	3	10	43	41	6	0
Portugieser	-	33	65	2	6	51	32	11	-
Lemberger	-	7	93	-	26	33	33	8	-
Schwarzriesling	-	17	77	6	15	19	53	13	-

#### Baden-Württemberg

<b>Weißweinsorten</b>									
Müller-Thurgau	1	32	65	2	13	47	35	5	0
Riesling	1	17	77	5	12	45	38	5	0
Silvaner	0	15	77	8	11	46	33	10	0
Gutedel	1	11	79	9	10	40	36	14	0
Ruländer	1	38	58	3	12	48	35	5	0
Weißer Burgunder	1	35	62	2	10	47	37	6	-
Auxerrois	1	25	72	2	9	48	31	12	-
Kerner	1	19	78	2	15	54	28	3	-
Gewürztraminer	1	23	69	7	15	36	39	10	0
<b>Rotweinsorten</b>									
Blauer Trollinger	-	12	82	6	11	47	36	6	-
Blauer Spätburgunder	1	38	56	5	12	48	35	5	0
Portugieser	1	31	66	2	12	57	26	5	-
Lemberger	-	17	79	4	16	50	28	6	-
Schwarzriesling	-	21	74	5	14	48	35	3	-