

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 16

C 11 2

16. Juni 1958

Wachstumstand und Ernteaussichten bei Gemüse Ende Mai 1958

Infolge des meist feuchten, mäßig warmen Maiwetters holten alle Gemüskulturen, die wegen der verzögerten Aussaat und verspäteten Vegetation in der Wachstumsentwicklung stark zurück waren, gut auf.

Günstige Wintergemüseernte

Da die Erntefläche für Winterkopfsalat und Winterspinat merklich höher lag als im Vorjahr und als im mehrjährigen Durchschnitt, erntete man 1958 allgemein mehr als damals. Die große Ernte bei Winterkopfsalat konnte allerdings nur durch eine erweiterte Anbaufläche erzielt werden; der Hektarertrag blieb stark hinter dem Vorjahr und dem sechsjährigen Durchschnitt zurück.

Frühgemüse uneinheitlich

Obwohl die Schätzung infolge des immer noch bestehenden Wachstumrückstands erschwert war, läßt sich die Frühgemüseernte doch einigermaßen zuverlässig überblicken. Danach bleibt die Ernte bei Frühblumenkohl, Spargel und Rhabarber hinter der vorjährigen zurück. Die Ernte an Frühlkohlrabi hält sich etwa auf Vorjahreshöhe, die an Winterkopfsalat ist um 12 vH größer als 1957. Dagegen sind die Ernten größer als im mehrjährigen Durchschnitt. Der Frühjahrsspinat bringt weniger als 1957, aber mehr als im Durchschnitt 1952/57!

Gute Erdbeerernte.

Es steht mit 70 dz/ha und einem Gesamtertrag von annähernd 42 000 dz eine sehr gute Erdbeerernte an. Man erwartet gut 40 vH mehr als 1957 und doppelt soviel wie im mehrjährigen Durchschnitt.

Günstiger Wachstumstand für Sommergemüse

Der Wachstumstand für die frühen Sorten von Weiß-, Rot- und Wirsingkohl ist gut bis zufriedenstellend. Damit verbesserten sich die Ernteaussichten gegen den Vormonat merklich. Wenn keine widrigen Umstände eintreten, wird die Ernte kaum hinter der guten Vorjahreseernte zurückbleiben. Bei Frühen Möhren, Grünen Pflückerbsen und Winterzwiebeln rechnet man ebenfalls mit einer überdurchschnittlichen Ernte.

An Pflanzenschädlingen sind in wenigen Lagen Engerlinge, Erdflöhe, Wühlmäuse und Schnecken besonders stark aufgetreten.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Mai 1958

Gebiet	Erntevorschätzung von														
	Frühblumenkohl			Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Spargel (ertragfähig)			Rhabarber		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	58,1	175,7	10 208	29,5	161,0	4 750	89,4	169,0	15 107	2,6	26,2	68	47,5	284,5	13 513
Nordbaden	30,6	160,0	4 896	18,3	142,1	2 601	54,1	155,9	8 436	713,3	32,0	22 843	13,9	266,0	3 697
Südbaden	38,5	167,2	6 437	34,0	192,1	6 532	61,7	184,0	11 350	19,4	48,5	940	14,4	211,0	3 039
Südwestfalen - Hohenzollern	11,3	186,3	2 105	7,8	171,8	1 340	20,7	194,5	4 026	-	-	-	4,2	250,2	1 051
Baden - Württemberg	138,5	170,7	23 646	89,6	169,9	15 223	225,9	172,3	38 919	735,3	32,4	23 851	80,0	266,3	21 300
Vormonat	-	-	-	89,6	146,6	13 135	225,9	154,6	34 935	-	-	-	-	-	-
endgültig 1957	125,3	193,4	24 233	78,1	193,4	15 101	188,1	184,9	34 787	794,0	32,7	25 933	80,0	267,3	21 382
Mittel 1952 / 57	121,6	178,0	21 649	70,7	176,1	12 447	193,0	177,7	34 300	615,1	29,1	17 914	78,1	269,7	21 061
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>															
<u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH, Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	31,6	171,5	5 419	13,3	158,3	2 106	47,1	151,6	7 142	0,8	26,5	22	36,8	285,9	10 520
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	8,2	183,4	1 504	3,6	168,6	607	12,7	164,3	2 087	1,5	26,3	39	3,0	262,7	788
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	26,7	160,9	4 295	15,3	143,8	2 200	48,5	153,5	7 444	713,2	32,0	22 838	12,5	267,9	3 349
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	9,1	192,9	1 755	8,1	183,6	1 487	12,1	193,5	2 341	3,4	37,4	127	4,7	212,1	997
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	16,4	148,9	2 442	17,2	210,1	3 614	23,6	202,1	4 770	-	-	-	1,0	252,0	252
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	2,0	180,0	360	1,2	130,0	156	4,1	269,8	1 106	-	-	-	0,5	254,0	127
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	2,0	155,0	310	1,4	174,3	244	3,5	166,0	581	8,1	45,4	368	1,0	196,0	196

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958. 2) = Endgültiger Gemüseanbau 1957 (bei Spargel voraussichtlicher Anbau 1958).

3) In vH des Gesamtanbaues.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Mai 1958

Gebiet	Erntevorschätzung von			Endgültige Ernteschätzung von								
	Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanzen)			Winterkopfsalat			Winterspinat			Frühjahrsspinat		
	Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	199,4	79,3	15 809	8,3	148,2	1 230	58,7	121,7	7 141	69,6	115,8	8 059
Nordbaden	98,6	81,7	8 060	26,0	139,3	3 622	50,1	99,7	4 995	57,2	106,6	6 099
Südbaden	230,7	58,2	13 420	81,6	159,0	12 971	62,1	167,6	10 407	18,7	106,1	1 985
Südwestfalen - Hohenzollern	62,5	70,2	4 388	2,0	153,0	306	7,2	101,5	731	9,2	114,7	1 055
Baden - Württemberg	591,2	70,5	41 677	117,9	153,8	18 129	178,1	130,7	23 274	154,7	111,2	17 198
Vormonat	-	-	-	117,9	171,3	20 196	178,1	115,4	20 544	154,7	94,9	14 681
endgültig 1957	460,7	64,2	29 574	98,4	184,0	18 109	137,3	150,3	20 638	132,5	135,7	17 974
Mittel 1952 / 57	341,0	61,4	20 927	84,9	176,3	14 964	156,9	119,3	18 721	128,2	120,3	15 417
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
<u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH, 3), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	152,9	84,4	12 906	5,0	165,8	829	25,9	140,3	3 634	38,1	123,1	4 689
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	30,2	73,1	2 208	1,5	132,0	198	11,4	107,3	1 223	20,7	117,1	2 423
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	84,3	86,2	7 268	23,6	140,0	3 303	38,7	104,0	4 025	39,1	103,2	4 036
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	17,8	49,9	889	9,3	166,8	1 551	22,2	118,2	2 625	3,7	98,1	363
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	2,6	88,8	231	65,8	160,2	10 541	27,7	220,3	6 102	4,8	99,2	476
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,7	48,8	83	0,3	133,3	40	0,1	137,5	14	2,2	145,9	321
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	130,2	69,7	9 078	0,2	145,0	29	1,6	96,3	154	2,3	115,7	266

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958. 2) = Endgültiger Gemüseanbau 1957 (abzüglich ausgewinterte Flächen).

3) In vH des Gesamtanbaues.

Wachstumstand des Gemüses Ende Mai 1958

Gebiet	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing- kohl	Frühe Möhren (Karotten)	Winter- zwiebeln (Herbst- aussaat)	Grüne Pflück- erbsen	Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nordwürttemberg	2,5	2,6	2,5	2,7	2,8	2,4	2,1	2,1
Nordbaden	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	2,5	2,9	2,1
Südbaden	2,5	2,7	2,5	2,6	2,4	2,6	2,9	1,9
Südwestfalen - Hohenzollern	2,4	2,4	2,4	2,6	2,7	2,9	2,5	2,5
Baden - Württemberg	2,5	2,6	2,5	2,7	2,7	2,5	2,5	2,1
Vormonat	3,2	3,1	3,0	3,0	3,2	-	-	-
Ende Mai 1957	2,4	2,4	2,4	2,7	2,7	2,3	2,6	2,6
darunter in den Gemüseanbaugebieten:								
Oberes Neckar- und Remstal	2,5	2,6	2,5	2,8	2,9	2,2	2,1	2,1
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,5	2,8	2,6	2,7	2,4	2,4	2,4	2,1
Unteres Rheintal	2,4	2,4	2,4	2,7	2,7	2,5	2,9	2,1
Breisgau und Kaiserstuhl	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	3,1	3,0	1,4
Konstanz mit Insel Reichenau	2,8	2,9	2,8	3,0	2,3	3,2	.	1,8
Oberes Gäugebiet	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	2,9	.	2,3
Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,5	2,5	2,8	2,9	2,2	2,6	3,0	2,2

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende April bis Ende Mai 1958

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstatter meldeten Berichterstatter					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	3	93	4	-	76	24
Nordbaden	-	95	5	-	71	29
Südbaden	15	85	-	-	79	21
Südwestfalen - Hohenzollern	6	89	5	-	76	24
Baden - Württemberg	5	91	4	-	75	25