

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

C II 4

Agrardienst 65

3. Dezember 1969

Der neue Weinherbst
(Stand Ende Oktober 1969)

Die anhaltend ruhige, sonnige Herbstwitterung ermöglichte es, die Weinlese bei der Mehrzahl der weißen und roten Rebsorten bis spät in den Oktober zu verschieben. Lediglich bei Müller-Thurgaubegann die Hauptlese bereits im September und war bis Mitte Oktober abgeschlossen. Beim Blauen Portugieser wurden fast 70% der Bestände zwischen dem 1. und 10. Oktober gelesen. Beim Riesling, Silvaner, Gewürztraminer, Trollinger und Limberger fiel die Ernte hauptsächlich in die zweite und dritte Oktoberwoche. Zum Zeitpunkt der zweiten Erntevorschätzung lagen daher nur für einen Teil der Rebsorten Kelterergebnisse vor, die von den Weinbausachverständigen bei der Schätzung berücksichtigt werden konnten.

Immerhin läßt sich erkennen, daß die erste Vorschätzung von Ende September durch die bisherigen Ernteergebnisse nicht überall voll bestätigt werden konnten. Es zeigt sich vielmehr, daß vor allem der Mangel an Niederschlägen trotz günstiger Besonnungs- und Temperaturverhältnisse die Ernteaussichten etwas gedämpft hat. Nach der jetzt vorliegenden zweiten Vorschätzung zum Stand von Ende Oktober wird der voraussichtliche Hektarertrag auf 71,6 hl/ha (gegenüber 73,0 hl im Vormonat) veranschlagt, das sind 16,5 hl/ha weniger als im Vorjahr und 18,5 hl/ha weniger als im Mittel der Jahre 1963/68. Legt man die aus der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitete vorläufige Ertragsreblfläche zugrunde, so dürfte sich die Weinmosternte des Jahres 1969 mengenmäßig auf 1,12 hl belaufen, das sind 17,6% weniger als im Vorjahr. Infolge der Ausdehnung des Anbaues, der sich mehr und mehr zu einer vergrößerten Ertragsreblfläche ausweitete, ist die Einbuße bei der Flächenproduktivität (-23,0%) etwas verringert worden. Endgültigen Aufschluß über die Weinmosternte wird man allerdings erst von den Ergebnissen der objektiven Erntemessung erwarten können. Bei den wichtigsten Rebsorten rechnet man jetzt mit folgenden Flächenleistungen, wobei allerdings gebietsweise größere Unterschiede bestehen (in Klammern Schätzungsergebnisse zur gleichen Zeit des Vorjahres):

Müller-Thurgau	88,2 hl/ha	(91,3)
Riesling	70,1 hl/ha	(61,1)
Silvaner	76,3 hl/ha	(80,4)
Gutedel	80,4 hl/ha	(102,5)
Ruländer	58,2 hl/ha	(67,9)
Blauer Trollinger	64,6 hl/ha	(90,6)
Blauer Spätburgunder	64,8 hl/ha	(77,6)
Portugieser	72,1 hl/ha	(87,2)
Limberger	64,5 hl/ha	(46,0)
Schwarzriesling	64,6 hl/ha	(69,9)

Die Qualität des neuen Jahrgangs dürfte den hohen Erwartungen wohl weitgehend entsprechen. Gut sieben Zehntel der Weinmoste wurden von den Weinbausachverständigen als qualitativ gut, ein Fünftel sogar als sehr gut bezeichnet. Von den verbleibenden Mostmengen wurde etwa ein Viertel als mittelmäßig eingestuft. Der Anteil der guten und sehr guten Moste ist damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr und entspricht nahezu dem des guten Weinjahres 1967. Auch die bis jetzt gemessenen Mostgewichte und Säuregehalte lassen einen großen Anteil von Qualitätsweinen erwarten. Bei Weißmost wurden im Mittel aller Sorten 74 Grad Oechsle, bei Rotmost sogar 76 Grad Oechsle und ein Säuregehalt von 10,1 bzw. 10,6°/oo angegeben. Möglicherweise wird sich die gute Beurteilung der Weinmoste bis zur endgültigen Ernteschätzung aufgrund der Kelterergebnisse aber noch weiter verbessern.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Vorschätzung der Weinmosternte 1969

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Wein- bau- ge- mein- den 1)	Weißmost												
		ertrag- fähige Rebfläche 2) ha	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
			von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
					h1	h1	%	h1	%	h1	%	h1	%	h1
Oberes Neckartal	7	39	47,9	1 867	12	216	55	1 032	26	487	7	132	-	-
Unteres Neckartal	93	1 399	70,1	98 035	18	17 206	62	60 735	18	18 037	2	1 889	0	168
Remstal	23	341	76,2	25 986	19	4 936	67	17 231	14	3 714	0	105	-	-
Enztal	29	108	69,5	7 508	19	1 465	41	3 043	33	2 461	7	539	-	-
Zabergäu	29	342	82,4	28 189	7	1 963	57	15 965	25	7 181	11	3 080	-	-
Kocher- und Jagsttal	32	393	75,7	29 740	9	2 601	62	18 469	27	8 119	1	423	1	128
Tauber- und Jagsttal	10	121	75,5	9 130	41	3 735	35	3 176	22	2 003	2	216	-	-
Nordwürttemberg	223	2 743	73,1	200 455	16	32 122	60	119 651	21	42 002	3	6 384	0	296
Tauber- und Maintal	29	285	75,0	21 365	4	912	61	12 876	32	6 858	3	698	0	21
Neckar- und Jagsttal	10	38	67,0	2 547	14	360	75	1 920	11	267	-	-	-	-
Bergstraße	25	479	68,0	32 551	23	7 339	51	16 685	23	7 356	3	1 171	-	-
Kraichgau	41	587	59,7	35 037	24	8 290	61	21 491	15	5 124	0	132	-	-
Pfingst-, Enz- und Albtal	16	58	70,9	4 113	3	130	37	1 530	43	1 765	17	688	-	-
Nordbaden	121	1 447	66,1	95 613	18	17 031	57	54 502	22	21 370	3	2 689	0	21
Seegegend	11	76	72,4	5 506	48	2 653	24	1 316	17	949	11	588	-	-
Oberes Rheintal	3	4	122,5	490	29	143	62	302	9	45	-	-	-	-
Markgräflerland	61	1 309	75,0	98 147	2	1 434	37	36 474	53	52 292	8	7 947	-	-
Kaiserstuhl	21	1 980	77,5	153 410	32	48 768	36	55 561	27	41 037	2	3 275	3	4 769
Breisgau	62	1 222	90,2	110 168	15	16 430	58	63 838	25	27 723	2	2 177	-	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	56	978	72,4	70 804	22	15 791	47	32 932	27	19 263	4	2 818	-	-
Südbaden	214	5 569	78,7	438 525	20	85 219	43	190 423	32	141 309	4	16 805	1	4 769
Oberes Neckartal	8	8	68,1	545	7	37	64	348	26	141	3	19	-	-
Enztal	3	1	23,0	23	-	-	48	11	52	12	-	-	-	-
Südwestfalen-Lippe ³⁾	12	10	64,3	643	6	37	67	434	24	153	3	19	-	-
Baden - Württemberg	570	9 769	75,3	735 236	18	134 409	50	365 010	28	204 834	3	25 897	1	5 086
Endgültig 1968 ⁴⁾	574	9 582	86,5	828 594	1	8 286	26	215 434	54	447 441	17	140 861	2	16 572

Noch: Vorschätzung der Weinmosternte 1969

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Rotmost 5)												
	ertrag- fähige Rebfläche 2) ha	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
		von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
				%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	1	47,0	47	64	30	34	16	2	1	-	-	-	-
Unteres Neckartal	2 049	66,2	135 678	22	29 363	64	86 706	13	18 089	1	1 520	-	-
Remstal	425	69,0	29 314	42	12 335	49	14 323	9	2 656	-	-	-	-
Enztal	421	58,5	24 643	13	3 170	58	14 395	27	6 663	2	415	-	-
Zabergäu	516	69,4	35 825	25	8 939	52	18 689	18	6 334	5	1 863	-	-
Kocher- und Jagsttal	82	68,3	5 601	10	563	56	3 152	29	1 641	4	201	1	44
Taubergegend	13	84,3	1 096	18	198	61	667	14	154	5	53	2	24
Nordwürttemberg	3 507	66,2	232 204	24	54 598	59	137 948	15	35 538	2	4 052	0	68
Tauber- und Maintal	33	54,5	1 797	5	97	33	582	57	1 021	5	97	-	-
Neckar- und Jagsttal	10	51,8	518	3	16	58	302	32	164	7	36	-	-
Bergstraße	121	64,1	7 755	33	2 562	36	2 825	24	1 821	7	547	-	-
Kraichgau	185	59,6	11 023	23	2 527	54	5 940	22	2 396	1	160	-	-
Pfinz-, Enz- und Albta	60	55,9	3 352	3	115	27	907	30	1 006	40	1 324	-	-
Nordbaden	409	59,8	24 445	22	5 317	43	10 556	26	6 408	9	2 164	-	-
Seegegend	63	60,9	3 837	66	2 523	19	725	15	589	-	-	-	-
Oberes Rheintal	22	78,5	1 726	-	-	90	1 553	10	173	-	-	-	-
Markgräflerland	96	68,1	6 534	4	259	60	3 907	33	2 158	3	210	-	-
Kaiserstuhl	742	65,0	48 239	34	16 177	31	14 889	28	13 617	4	2 072	3	1 484
Breisgau	512	66,2	33 916	28	9 432	57	19 300	15	5 098	0	86	-	-
Ortenau und Bühlergegend	478	63,3	30 272	24	7 358	47	14 114	25	7 613	4	1 187	-	-
Südbaden	1 913	65,1	124 524	29	35 749	44	54 488	23	29 248	3	3 555	1	1 484
Oberes Neckartal	12	63,0	756	11	87	49	369	27	205	13	95	-	-
Enztal	4	11,3	45	2	1	96	43	2	1	-	-	-	-
Südwestfalen-Hohenz. 3)	16	50,9	815	11	88	52	426	25	206	12	95	-	-
Baden - Württemberg	5 845	65,4	381 988	25	95 752	53	203 418	19	71 400	3	9 866	0	1 552
Endgültig 1968 4)	5 736	90,9	521 228	2	10 425	27	140 731	55	286 675	14	72 972	2	10 425

1) Gemeinden mit einer im Ertrag stehenden Rebfläche von einem Hektar und mehr. - 2) Vorläufig (aus der Fortschreibung des Weinbausekatasters abgeleitet; mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar. - 3) Einschl. Tettnang. - 4) Berichtigt (vgl. Erläuterungen im Agrardienst 57/1969. - 5) Einschl. Weinmost aus gemischten Beständen.

1) Vorläufig (aus der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitet; mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar. - 2) Einschl. Tettnang. - 3) Z.T. berichtigt.

Mostgewicht und Durchschnittssäuregehalt

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Mostgewicht nach Oechsle		Durchschnittssäuregehalt in vom Tausend	
	Weißmost	Rotmost	bei	
			Weißmost	Rotmost
Oberes Neckartal	75	78	9,0	9,2
Unteres Neckartal	72	73	11,3	10,8
Remstal	75	76	10,2	11,2
Enztal	75	75	9,0	9,8
Zabergäu	69	70	11,3	9,9
Kocher- und Jagsttal	75	76	8,9	8,9
Taubergergend	76	77	8,6	10,5
Nordwürttemberg	73	73	10,6	10,6
Tauber- und Maintal	74	71	9,6	10,5
Neckar- und Jagsttal	72	71	10,2	10,0
Bergstraße	74	71	9,9	11,2
Kraichgau	75	73	9,9	10,5
Pfinz-, Enz- und Albtal	72	74	9,7	11,5
Nordbaden	74	72	9,8	10,8
Seegegend	79	84	9,6	11,0
Oberes Rheintal	74	81	8,5	.
Markgräflerland	69	80	10,4	11,0
Kaiserstuhl	79	84	9,4	10,3
Breisgau	75	81	10,3	11,2
Ortenau und Bühlergergend	76	82	9,8	9,9
Südbaden	75	82	9,9	10,5
Oberes Neckartal	69	71	11,0	11,8
Enztal	70	65	10,0	11,0
Südwestfalen-Hohenz. ²⁾	70	71	11,0	11,8
Baden - Württemberg	74	76	10,1	10,6
Endgültig 1968	65	65	10,6	11,6