

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 45

* C II 1

9. Oktober 1963

Ernteschätzung von Feldfrüchten Anfang September 1963

Die Ernteschätzung Anfang September erstreckte sich auf die endgültige Ernteschätzung von Getreide, Körnermais, Frühkartoffeln und Ölfrüchten, auf die Erntevorschätzung für mittelfrühe und Spätkartoffeln, Hülsenfrüchte, Tabak und Raufutter sowie auf den Wachstumsstand von Rüben und Futterpflanzen.

Statt der endgültigen Ernteschätzung für Getreide wurden die vorläufigen Ergebnisse der objektiven Erntemessung bekanntgegeben (Agrardienst Nr. 40/1963), bei der die Ergebnisse der endgültigen Schätzung für Getreide verwendet wurden.

Bei den mittelfrühen und Spätkartoffeln wird nach den Schätzungen der landwirtschaftlichen Berichterstatter und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der objektiven Erntermittlung ein Ertrag erwartet, der noch über dem bisher höchsten Hektarertrag der Nachkriegszeit (1962 = 256,4 dz/ha) liegt. Andererseits ist, bedingt durch den Arbeitskräftemangel, die Anbaufläche für mittelfrühe und Spätkartoffeln von 113 000 ha im Jahr 1962 auf 107 000 ha im Jahr 1963 verringert worden. Dank dem höheren Hektarertrag steht jedoch eine Gesamternte in Aussicht, die mit 29 Mill. dz, unter Einschluß der ebenfalls sehr guten Frühkartoffelernte mit 30 Mill. dz, das ausgezeichnete Ergebnis des Vorjahres erreichen dürfte.

Die endgültige Schätzung der Ölfruchternte, bei der dem Raps das weit überwiegende Gewicht zufällt, ergab eine Gesamternte von 41 000 dz. Damit wird das endgültige Ergebnis des Jahres 1962 um 4% und das sechsjährige Mittel der Ernten 1957/62 um 12% übertroffen.

Die Hülsenfruchternte schätzen die Berichterstatter auf 194 000 dz, das sind 33% mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Steigerung geht zum größeren Teil auf die Ausweitung der Anbaufläche und zum kleineren Teil auf den besseren Hektarertrag zurück.

Die zu erwartende Tabakernte beläuft sich auf 58 000 dz und entspricht damit etwa dem Ergebnis des Jahres 1962. Erstmals seit dem Auftreten des Blauschimmels wurde in diesem Jahr die Tabakanbaufläche gegenüber dem Vorjahr wieder erhöht.

Die Heuernte wird auf 60,3 Mill. dz geschätzt, das sind 22% mehr als im Jahr 1962 und etwa so viel wie im Mittel der Jahre 1957/62.

Der Wachstumsstand von Zuckerrüben, Futter- und Kohlrüben sowie von Klee, Luzerne, Wiesen und Viehweiden wird wesentlich besser beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang September 1963

| Kreis Regierungsbezirk Land | Zuckerrüben | Futterrüben | Kohlrüben | Klee, auch im Gemisch mit Gräsern | Luzerne | Wiesen | Viehweiden |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------|--|---------|--------|------------|
| | Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | |
| Stuttgart | 1,9 | 2,2 | . | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Heilbronn | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | . |
| Ulm | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Landkreise | | | | | | | |
| Aalen | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Backnang | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Böblingen | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| Crailsheim | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| EBlingen | 3,1 | 2,9 | . | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| Göppingen | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Heidenheim | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Heilbronn | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
| Künzelsau | 2,1 | 2,4 | . | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,2 |
| Leonberg | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ludwigsburg | 1,9 | 2,1 | . | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,1 |
| Mergentheim | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| Nürtingen | 2,2 | 2,3 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
| Öhringen | 2,0 | 2,1 | . | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| Schwäb. Gmünd | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
| Schwäb. Hall | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Ulm | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Vaihingen | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Waiblingen | 2,2 | 2,4 | . | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| Nordwürttemberg | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Stadtkreise | | | | | | | |
| Karlsruhe | 3,0 | 3,0 | . | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Heidelberg | 2,7 | 2,8 | . | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Mannheim | 2,5 | 2,4 | . | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Pforzheim | . | 2,0 | . | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Landkreise | | | | | | | |
| Bruchsal | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 2,6 |
| Buchen | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Heidelberg | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Karlsruhe | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
| Mannheim | 2,6 | 2,9 | . | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 3,8 |
| Mosbach | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
| Pforzheim | 2,0 | 2,3 | . | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Sinsheim | 2,5 | 2,4 | . | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 |
| Tauberbischofsheim | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
| Nordbaden | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang September 1963

| Kreis Regierungsbezirk Land | Zuckerrüben | Futterrüben | Kohlrüben | Klee, auch im Gemisch mit Gräsern | Luzerne | Wiesen | Viehweiden |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------|--|---------|--------|------------|
| | Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | |
| Freiburg | 2,4 | 3,0 | . | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,6 |
| Baden - Baden | . | 2,0 | 1,7 | 2,0 | . | 2,0 | . |
| Landkreise | | | | | | | |
| Bühl | . | 2,3 | 3,8 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
| Donaueschingen | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Emmendingen | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| Freiburg | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Hochschwarzwald | . | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kehl | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,0 |
| Konstanz | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Lahr | 2,0 | 2,3 | . | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,0 |
| Lörrach | 2,3 | 2,3 | . | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Müllheim | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| Offenburg | . | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
| Rastatt | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| Säckingen | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| Stockach | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| Überlingen | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Villingen | . | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| Waldshut | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
| Wolfach | . | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,5 |
| Südbaden | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| Landkreise | | | | | | | |
| Balingen | . | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 |
| Biberach | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
| Calw | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 |
| Ehingen | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |
| Freudenstadt | . | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
| Hechingen | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| Horb | 2,4 | 2,3 | . | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
| Münsingen | . | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Ravensburg | . | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
| Reutlingen | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| Rottweil | 2,0 | 2,2 | . | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Saulgau | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Sigmaringen | . | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| Tettnang | . | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| Tübingen | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,5 |
| Tuttlingen | . | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 |
| Wangen | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,2 |
| Südwürttemberg-Hohenz. | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Baden - Württemberg | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Vormonat | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Anfang September 1962 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |

Erntevorschätzung von Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Hopfen, Tabak und Rohfutter Anfang September 1963

| Fruchtart | Mittel 1957 / 62 | | | Endgültig 1962 | | | 1963 | | |
|---|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz |
| Hülsenfrüchte | 5 382 | 21,2 | 113 864 | 6 566 | 24,0 | 157 330 | 8 037 | 24,1 | 193 567 |
| Speiseerbsen | 423 | 19,5 | 8 262 | 839 | 21,0 | 17 608 | 1 018 | 21,6 | 21 983 |
| Futtererbsen | 1 982 | 20,2 | 39 973 | 1 859 | 23,1 | 42 907 | 2 310 | 22,4 | 51 632 |
| Speisebohnen | 195 | 19,1 | 3 733 | 306 | 19,1 | 5 835 | 388 | 22,0 | 8 535 |
| Ackerbohnen | 2 130 | 23,1 | 49 238 | 2 981 | 26,2 | 78 157 | 3 620 | 26,4 | 95 524 |
| Wicken | 363 | 17,7 | 6 410 | 264 | 19,7 | 5 205 | 313 | 19,9 | 6 232 |
| Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht | 289 | 21,6 | 6 248 | 317 | 24,0 | 7 618 | 388 | 24,9 | 9 661 |
| Mittelfrühe und Spätkartoffeln | 120 392 | 233,5 | 28 113 513 | 113 206 | 256,4 | 29 028 282 | 107 213 | 269,5 ²⁾ | 28 893 904 ²⁾ |
| Frühkartoffeln | 4 832 | 172,4 | 832 858 | 4 456 | 163,1 | 726 862 | 4 786 | 206,7 ²⁾ | 989 266 ²⁾ |
| Hopfen | 915 | 17,1 | 15 691 | 826 | 16,5 ³⁾ | 13 639 ³⁾ | . | . | . |
| Tabak | 3 094 | 27,0 | 83 494 | 1 858 | 28,9 | 53 782 | 2 057 ⁴⁾ | 28,1 ⁵⁾ | 57 802 ⁵⁾ |
| Rohfutter ¹⁾ | 928 099 | 66,2 | 61 457 332 | 912 659 | 62,0 | 56 571 182 | 919 633 | 65,6 | 60 288 859 |
| Klee, auch im Gemisch mit Gräsern ¹⁾ | 92 059 | 74,1 | 6 822 167 | 85 001 | 66,1 | 5 622 007 | 90 662 | 76,9 | 6 969 721 |
| Luzerne ¹⁾ | 51 564 | 78,7 | 4 059 370 | 39 345 | 73,2 | 2 878 865 | 44 135 | 80,7 | 3 561 898 |
| Wiesen ¹⁾ | 716 154 | 64,5 | 46 178 251 | 712 462 | 61,3 | 43 697 694 | 710 701 | 63,2 | 44 951 390 |
| Ackerwiesen ¹⁾ | 68 322 | 64,4 | 4 397 544 | 75 851 | 57,6 | 4 372 616 | 74 135 | 64,8 | 4 805 850 |

1) Ertrag als Heu gerechnet. - 2) Erste Ergebnisse der objektiven Erntemessung. - 3) Bereinigte Zahlen. - 4) Angaben: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Weinbau und Forsten (vorläufige Zahlen). - 5) Auf Grund der bisherigen Unterschätzungen hochgerechnet.

Endgültige Schätzung der Ölfruchternte Anfang September 1963

| Fruchtart | Mittel 1957 / 62 | | | 1 9 6 2 | | | 1 9 6 3 | | | Veränderung des Gesamtertrages 1963 gegen 1962 in % | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|---|------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | | |
| | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz | | |
| Raps | 1 735 | 18,2 | 31 567 | 1 917 | 19,7 | 37 811 | 1 938 | 20,3 | 39 270 | + | 3,9 |
| Winterraps | 1 243 | 18,7 | 23 265 | 1 312 | 20,4 | 26 706 | 1 331 | 20,9 | 27 807 | + | 4,1 |
| Sommerraps | 492 | 16,9 | 8 302 | 605 | 18,4 | 11 105 | 607 | 18,9 | 11 463 | + | 3,2 |
| Winter- und Sommerrüben | 83 | 14,5 | 1 202 | 24 | 14,7 | 353 | 23 | 18,1 | 417 | + | 18,1 |
| Mohn | 297 | 12,6 | 3 746 | 94 | 12,5 | 1 173 | 95 | 13,6 | 1 290 | + | 10,0 |
| Ölfrüchte | 2 115 | 17,3 | 36 515 | 2 035 | 19,3 | 39 337 | 2 056 | 19,9 | 40 977 | + | 4,2 |