

Sta. Amt Wiesbaden  
STATISTISCHE  
BERICHTE




EG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/51

Erschienen am 29. September 1959



Die Tuberkulose im Jahre 1958

## Inhalt

	Seite
A. Text	
Die Tuberkulose im Jahr 1958	4
B. Tabellen	
1. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten	5
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12. für die Jahre 1957 und 1958 nach Altersgruppen und Geschlecht	6
C. Schaubild	
Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten auf 100 der jeweiligen Altersgruppen	7

## Die Tuberkulose im Jahr 1958

An Unterlagen zur Beurteilung der Erkrankungshäufigkeit im Bundesgebiet stehen die Statistiken der Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter und der Todesursachen zur Verfügung.

### Erkrankungen an Tuberkulose

Die an ansteckender und nichtansteckender (aktiver) Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe Erkrankten werden auf Grund der Verordnungen über die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben des Tuberkulose-Registers dienen auch u. a. der Auszählung der Neuzugänge und des Bestandes an Erkrankten<sup>1)</sup>. Da eine vollständige Erfassung aller an Tuberkulose erkrankten und darüber hinaus aller wegen dieser Krankheit überwachungsbedürftigen und gefährdeten Personen kaum möglich ist und — wie regionale Ergebnisse erkennen lassen — der Erfassungsgrad sogar bei der ansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane erhebliche Unterschiede aufweist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Tabelle 1: Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)

Berichtsjahr	Tuberkulose der Atmungsorgane			anderer Organe
	insgesamt	ansteckend (offen)	nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	
Grundzahlen				
1958 <sup>2)</sup>	77 424	20 638	45 273	11 513
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung				
1958 <sup>2)</sup>	151,4	40,4	88,5	22,5
1957	158,8	41,9	94,2	22,7
1956	171,3	44,0	102,2	25,1
1955	186,3	49,6	108,5	28,1
1954	197,3	52,0	116,9	28,4
1953	223,2	60,9	131,4	30,9
1952 <sup>3)</sup>	234,4	64,1	137,9	32,4
1951 <sup>3)</sup>	250,9	69,3	146,9	34,7
1950 <sup>3)</sup>	268,0	72,2	153,4	34,0
1949 <sup>3)</sup>	311,0	76,7	209,3	45,0
1948 <sup>3)</sup>	451,3	90,0	303,4	57,5

<sup>1)</sup> Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — <sup>2)</sup> Vorläufiges Ergebnis. — <sup>3)</sup> Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. — <sup>4)</sup> Ohne Rheinland-Pfalz, Reg.-Bez. Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern.

Im Jahre 1958 belief sich die Zahl der erfaßten Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin) auf rund 77 000, im Saarland auf rund 1 700 und in Berlin (West) auf rund 5 600. Bei den Neuzugängen hat sich der bisherige laufende Rückgang der Erkrankungsziffer auch 1958 fortgesetzt und betrug auf 100 000 der Bevölkerung im Bundesgebiet 151, dagegen im Saarland 170 und sogar 250 in Berlin (West). In den Bundesländern schwankten die Erkrankungsziffern der Neuzugänge erheblich. Der Höchstwert mit 295 wurde in Hamburg und der niedrigste in Hessen mit 110 beobachtet. Da aber die Zahl der Neuzugänge stark von äußeren Einflüssen abhängig ist — u. a. Anstieg bei Reihenuntersuchungen und bei intensiv durchgeführter Gesundheitsbelehrung der Bevölkerung —, sind für die Beurteilung der Tuberkulosehäufigkeit die Angaben über den Bestand der in den Tuberkuloseregistern der Fürsorgestellen erfaßten Erkrankten aufschlußreicher, obwohl sich auch hier die gleichen Einflüsse aus den verschiedenen Zugangsjahren auswirken.

Am Jahresende 1958 waren im Bundesgebiet rund 99 000 Personen, im Saarland rund 2 100 und in Berlin (West) rund 8 900 mit ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, rund 212 000 bzw. rund 3 600 bzw. rund 21 000 mit nichtansteckender (aktiver) Tuberkulose der Atmungsorgane und rund 52 000 bzw. 900 bzw. 2 200 mit Tuberkulose anderer Organe in den Tuberkulose-Fürsorgestellen registriert.

Tabelle 2: Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)

Berichtsjahr	Tuberkulose der Atmungsorgane			anderer Organe
	insgesamt	ansteckend (offen)	nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	
Grundzahlen				
1958 <sup>1)</sup>	363 142	98 669	212 179	52 294
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung				
1958 <sup>1)</sup>	705,8	191,8	412,4	101,6
1957	759,3	205,0	444,5	109,8
1956	816,9	222,8	476,0	118,1
1955	869,7	242,4	502,6	124,7
1954	926,9	262,6	532,4	132,0
1953	972,8	285,8	547,7	139,3
1952	974,6	289,9	544,2	140,4
1951	1 008,8	291,9	565,6	151,4
1950	1 039,7	286,5	597,7	155,5
1949 <sup>2)</sup>	1 131,0	283,0	685,0	162,0
1948 <sup>2)</sup>	1 139,0	288,0	717,0	154,0

<sup>1)</sup> Vorläufiges Ergebnis. — <sup>2)</sup> Ohne Rheinland-Pfalz, Reg.-Bez. Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern.

Bei der ansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane, der epidemiologisch wichtigsten und gegenüber den anderen Tuberkulosearten — vielleicht mit Ausnahme der Hauttuberkulose — wohl am vollständigsten erfaßten Gruppe der Erkrankten betrug die Bestandsziffer im Berichtsjahr auf 100 000 der Bevölkerung im Bundesgebiet 192, im Saarland 207 und in Berlin (West) 399. Auch hier sind erhebliche Schwankungen in den Bundesländern zwischen 315 in Hamburg und 147 in Hessen festzustellen. Der laufende Rückgang dieser Bestandsziffer im Bundesgebiet — seit 1948 um 28,5 vH — ist aus Tabelle 2 deutlich zu erkennen. Hervorzuheben ist, daß der Rückgang des Bestandes im gleichen Zeitraum von 1948 auf 1958 an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane um 42,5 vH auf 412 und an Tuberkulose anderer Organe um 34 vH auf 102 noch höher war.

Da die Angaben über den Bestand der Tuberkulösen für die Beurteilung des Tuberkulosegeschehens von besonderer Bedeutung sind, erfolgen seit einigen Jahren, zunächst nur von einigen Ländern, auch Auszählungen mit einer Gliederung nach Geschlecht und 5-jährigen Altersgruppen, die seit dem Vorjahr von allen Ländern aufgestellt werden. Diese im Schaubild dargestellten Ergebnisse lassen bei der ansteckenden und der nichtansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane deutlich die höhere Beteiligung des männlichen Geschlechts erkennen, während bei der Tuberkulose anderer Organe die Bestandsziffern der Männer und Frauen eine wesentlichen Unterschiede aufweisen.

Die wichtigste Kurve, die der Bestandsziffern an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, lag bei Männern und Frauen 1958 im allgemeinen niedriger als in den Vorjahren. Bei den 40 bis unter 45-jährigen Männern zeigte diese Kurve einen ersten angedeuteten Gipfel. Nach einem geringen Absinken — die Ursache könnte vielleicht auf eine Erfassungslücke zurückzuführen sein — erfolgte im Verlauf der Kurve ein Anstieg zu einem zweiten Gipfel etwa in der Höhe der Vorjahre bei den 60 bis unter 65-jährigen. Dieser zweite Gipfel überrascht nicht, da insbesondere auf Grund der Röntgentreihenuntersuchungen immer deutlicher wird, daß gerade die Häufigkeit der Alterstuberkulose der Männer ansteigt. Es dürfte aber anzunehmen sein, daß das starke Absinken der Kurve des Bestandes an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane bei den 65 Jahre und älteren Männern in erster Linie — wie Teilergebnisse vermuten lassen — durch die schlechte Erfassung dieses Personenkreises bedingt ist. Die entsprechenden Erkrankungsziffern der Frauen liegen deutlich tiefer mit einem höchsten Wert bei den 30 bis unter 35-jährigen. Diese Kurve liegt für alle Altersgruppen ab 45 bis unter 50 etwa in gleicher Höhe und weist jenseits des 65. Lebensjahres keinen Abfall, wie er bei den Männern erkennbar ist, auf.

Tabelle 3: Sterbefälle an Tuberkulose im Bundesgebiet  
(ohne Saarland und Berlin)  
Standesamtliche Meldungen

Gebiet Jahr	Tuberkulose		
	insgesamt	der Atmungsorgane	anderer Organe
<b>Grundzahlen</b>			
Bundesgebiet 1958 <sup>1)</sup>	8 731	7 926	805
<b>Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung</b>			
1958 <sup>1)</sup>	17,1	15,5	1,6
1957	18,8	17,1	1,7
1956	19,4	17,3	2,1
1955	20,4	18,1	2,3
1954	20,8	18,2	2,6
1953	22,0	18,9	3,0
1952	27,8	23,4	4,4
1951	37,8	31,7	5,9
1950	40,1	33,3	6,8
1949	50,5	42,3	8,2
1948	68,5	57,8	10,7
<b>Reichsgebiet</b>			
1958	62,1	53,0	9,0
1953	73,1	61,8	11,3

<sup>1)</sup> Vorläufiges Ergebnis.

### Sterbefälle an Tuberkulose

Die Kriegsergebnisse verursachten, wie zu erwarten, einen deutlichen Anstieg der Tuberkulosesterblichkeit. Aber bereits 1949 lagen die Tuberkulosesterbeziffern unter denen des letzten Vorkriegsjahres 1938. Seither erfolgte ein Abfall der Tuberkulosesterblichkeit bis auf 15,5 auf 100 000 der Bevölkerung bei der Tuberkulose der Atmungsorgane und auf 1,6 bei der Tuberkulose anderer Organe im Jahre 1958. Hervorzuheben ist aber, daß nach der seit 1953 beobachteten Verlangsamung der Senkung der Sterblichkeit an Tuberkulose der Atmungsorgane von 1957 auf 1958 wieder eine stärkere Abnahme um rund 9 vH eintrat.

### Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Zeit Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose		Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose		
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend 1)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insges.	ansteckend (offen)			nicht an- steckend 1)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insges.	
	mit Basillennachweis	ohne Basillennachweis	ins- gesamt					mit Basillennachweis	ohne Basillennachweis	ins- gesamt					
Erkrankte an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)															
Neuzugänge <sup>2)</sup>															
Bestand <sup>4)</sup>															
1954	19 898	5 475	25 373	56 927	82 260	13 843	96 103	97 753	30 795	128 548	260 614	289 162	64 600	453 762	
1955	18 906	5 488	24 394	53 414	77 808	13 847	91 655	92 425	27 575	120 001	248 824	368 825	61 736	430 561	
1956	17 047	4 920	21 967	51 050	73 017	12 545	85 562	87 702	23 920	111 622	238 542	350 164	59 172	409 336	
1957	16 413	4 723	21 136	47 554	68 690	11 438	80 128	82 572	21 601	104 173	225 862	330 035	55 802	385 837	
1958 <sup>3)</sup>	16 050	4 588	20 638	45 273	65 911	11 513	77 424	78 707	19 952	98 659	212 179	310 848	52 294	363 142	
nach Ländern (1958)															
Schlesw.-Holst.	730	332	1 062	2 723	3 785	540	4 425	3 352	2 030	5 382	14 495	19 877	2 815	22 692	
Hamburg	843	321	1 164	3 737	4 901	407	5 308	3 972	1 717	5 689	16 965	22 684	2 035	24 719	
Niedersachsen	1 523	532	2 055	5 319	7 774	1 401	9 175	10 639	1 586	12 225	25 158	37 383	6 370	43 753	
Bremen 3)	175	71	246	535	781	176	957	1 154	591	1 845	4 638	6 483	991	7 474	
Nordrh.-Westf. 3)	5 529	1 101	6 630	12 275	18 905	3 025	21 930	24 611	5 422	30 033	66 558	96 391	18 688	115 079	
Hessen	1 097	295	1 392	2 556	3 948	1 140	5 088	6 016	822	6 838	12 950	19 788	4 499	24 287	
Rheinl.-Pfalz	1 016	375	1 391	2 561	3 952	1 151	5 103	5 116	2 550	7 666	14 582	22 248	4 515	28 763	
Baden-Württbg.	1 942	463	2 405	7 378	9 783	1 955	11 738	9 703	1 544	11 247	26 450	37 697	6 493	44 190	
Bayern	2 795	1 098	3 893	8 389	12 082	1 618	13 700	14 144	3 600	17 744	30 583	48 327	5 888	54 215	
Saarland															
1957	406	114	520	1 135	1 655	234	1 889	1 320	819	2 139	3 687	5 626	899	6 525	
1958	355	116	471	1 087	1 458	294	1 752	1 372	778	2 150	3 578	5 728	932	6 660	
Berlin (West)															
1957	1 163	495	1 658	3 540	5 198	504	5 702	8 356	722	9 078	21 418	30 436	2 293	32 789	
1958	1 178	466	1 644	3 507	5 151	477	5 628	8 182	689	8 871	21 041	29 912	2 172	32 084	
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung															
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)															
1954	40,9	11,2	52,0	116,9	168,9	28,4	197,3	199,7	62,9	262,6	532,4	795,0	132,0	926,9	
1955	38,4	11,2	49,6	108,6	158,1	28,1	186,3	186,7	55,7	242,4	502,6	745,0	124,7	869,7	
1956	34,1	9,9	44,0	102,2	146,2	25,1	171,3	175,0	47,7	222,8	476,0	698,8	118,1	816,9	
1957 <sup>3)</sup>	32,5	9,4	41,9	94,2	136,1	22,7	158,8	162,5	42,5	205,0	444,5	649,5	109,8	759,3	
1958 <sup>1)</sup>	31,4	9,0	40,4	88,5	128,9	22,5	151,4	155,0	38,8	191,8	412,4	604,1	101,6	705,8	
nach Ländern (1958) <sup>3)</sup>															
Schlesw.-Holst.	32,2	14,6	46,8	120,0	166,8	28,2	195,0	147,3	89,2	236,5	676,9	673,4	123,7	997,1	
Hamburg	46,9	17,9	64,8	207,9	272,7	22,6	295,4	219,7	95,0	314,7	938,5	1 253,3	112,6	1 365,8	
Niedersachsen	29,6	8,2	37,7	81,8	119,5	21,5	141,1	163,3	24,3	187,6	386,1	575,7	97,8	673,5	
Bremen 3)	26,1	10,6	36,7	79,8	116,4	26,2	142,7	170,3	102,0	272,3	684,6	956,9	146,3	1 103,2	
Nordrh.-Westf. 3)	36,1	7,2	43,3	80,1	123,4	19,7	143,1	159,2	35,1	194,3	429,3	623,5	120,9	744,4	
Hessen	23,7	6,4	30,1	55,3	85,4	24,7	110,0	129,3	17,7	147,0	278,4	425,4	96,7	522,1	
Rheinl.-Pfalz	30,5	11,2	41,7	76,6	118,5	34,5	153,0	152,5	76,0	228,5	434,7	663,2	134,6	797,8	
Baden-Württbg.	28,4	6,3	32,6	100,1	132,8	26,5	159,3	130,5	26,8	151,3	355,8	507,2	87,4	594,5	
Bayern	30,3	11,9	42,2	88,7	130,8	17,5	148,4	152,4	38,8	191,2	329,6	520,9	63,5	584,3	
Saarland															
1957 <sup>3)</sup>	40,1	11,3	51,4	112,1	163,5	23,1	186,6	129,5	80,4	209,9	351,8	571,7	88,2	659,9	
1958 <sup>1)</sup>	34,5	11,3	45,7	95,8	141,5	28,5	170,7	131,9	74,8	206,7	344,0	550,7	89,6	640,3	
Berlin (West)															
1957 <sup>3)</sup>	52,3	22,2	74,5	159,1	233,6	22,7	256,3	375,0	32,4	407,4	361,1	1 368,5	102,9	1 471,3	
1958 <sup>1)</sup>	52,9	20,9	73,9	157,6	231,4	18,7	250,1	367,6	37,0	358,5	345,7	1 343,8	97,6	1 441,3	

1) Aktiv geschlossen. - 2) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 3) Vorläufiges Ergebnis. - 4) Bestand am Ende des Jahres.

## Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. für die Jahre 1957 und 1958

## nach Altersgruppen und Geschlecht

(Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin)


Altersgruppen von ..... bis unter ..... Jahren	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	unsteckende		nicht ansteckende						ansteckende		nicht ansteckende					
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
31. 12. 1957																
0 - 4	12	6	267	248	52	32	331	286	2,8	1,5	62,5	61,5	12,2	7,9	77,5	71,0
1 - 5	103	79	6 081	5 675	760	691	6 364	6 445	6,6	5,3	390,6	383,7	50,1	46,7	447,3	435,8
5 - 10	145	132	10 189	8 874	1 632	1 565	11 966	10 571	7,7	7,4	542,0	496,0	86,8	87,6	636,5	591,9
10 - 15	249	346	5 772	5 338	1 804	1 903	7 305	7 589	15,0	21,8	348,1	354,0	113,6	119,1	476,8	474,9
15 - 20	1 952	1 851	6 310	6 918	2 146	2 351	10 408	11 120	86,8	85,2	280,6	318,5	95,4	108,3	462,8	512,0
20 - 25	3 915	3 005	9 029	9 934	2 109	2 752	15 053	15 691	198,9	156,7	458,8	517,9	107,2	143,5	764,9	818,1
25 - 30	5 481	3 640	11 202	10 819	2 321	3 049	19 004	17 506	310,7	211,5	635,0	628,6	131,6	177,2	1 077,3	1 017,3
30 - 35	6 425	3 978	11 927	10 771	2 423	3 084	20 775	17 833	412,7	208,6	766,0	564,8	155,6	161,7	1 334,3	935,1
35 - 40	5 983	3 407	9 960	8 834	2 049	2 587	17 992	14 828	438,3	182,0	729,7	471,9	150,1	138,2	1 318,1	792,1
40 - 45	5 928	2 817	9 351	6 738	1 846	2 273	17 125	11 828	487,5	171,8	769,0	410,9	151,8	138,6	1 408,3	721,2
45 - 50	8 215	2 716	15 064	6 509	1 975	2 306	21 254	11 531	487,8	126,5	657,0	303,2	117,3	107,4	1 262,1	537,1
50 - 55	9 240	2 437	11 578	5 178	1 767	2 103	22 585	9 718	553,2	121,8	668,1	258,7	102,0	105,1	1 303,2	485,7
55 - 60	8 924	2 202	10 056	4 079	1 559	1 908	20 509	8 189	581,7	123,1	655,5	228,0	99,7	106,7	1 337,0	457,7
60 - 65	6 371	1 911	6 809	3 149	1 002	1 521	14 182	6 581	594,2	127,2	634,0	209,7	93,3	101,3	1 320,5	438,1
65 - 70	4 209	1 563	4 106	2 229	677	1 102	8 952	4 894	505,9	131,9	493,5	188,1	81,4	93,0	1 080,8	413,0
70 und älter	4 616	2 313	4 212	2 656	881	1 502	9 709	6 471	338,9	125,9	309,3	144,6	64,7	81,8	712,8	352,3
Insgesamt	71 766	32 405	127 913	97 949	25 073	30 729	224 754	181 083	300,8	120,2	536,1	363,4	105,1	114,0	942,0	597,6
31. 12. 1958																
0 - 4	8	9	278	227	29	27	315	263	1,8	2,2	64,2	55,6	6,7	6,6	72,8	64,4
1 - 5	101	71	5 536	5 002	620	577	6 257	5 730	6,3	4,6	343,3	332,2	38,4	37,7	388,0	374,6
5 - 10	136	113	9 303	8 265	1 403	1 377	10 842	9 755	7,1	6,2	489,0	456,8	73,8	76,1	569,9	539,2
10 - 15	242	336	5 371	4 889	1 689	1 662	7 302	6 887	14,6	21,1	323,4	306,4	101,7	104,2	439,6	431,6
15 - 20	1 706	1 588	5 901	6 259	1 865	2 115	9 472	9 962	78,3	75,8	270,9	298,6	85,6	100,9	434,8	475,2
20 - 25	3 661	2 640	8 586	9 218	1 911	2 181	14 158	14 439	171,6	127,9	402,4	445,6	89,6	125,1	663,6	699,6
25 - 30	4 648	3 147	9 591	9 411	2 055	2 833	16 254	15 391	261,5	187,5	556,1	560,7	119,1	168,8	944,7	917,1
30 - 35	5 830	3 540	11 090	9 668	2 327	2 903	19 247	16 111	352,4	187,7	670,3	512,6	140,6	153,9	1 163,2	854,2
35 - 40	5 966	3 235	9 930	9 791	2 159	2 672	18 055	14 698	401,0	158,4	667,4	430,4	145,1	130,8	1 213,5	719,7
40 - 45	5 070	2 424	8 012	5 793	1 697	2 075	14 779	10 292	475,6	166,8	751,6	398,6	159,2	142,8	1 386,4	708,2
45 - 50	7 725	2 967	10 466	6 223	1 868	2 225	20 059	11 045	465,6	121,2	636,7	290,4	112,6	103,8	1 208,9	515,4
50 - 55	8 998	2 236	11 171	5 029	1 782	1 963	21 931	9 226	518,2	108,6	643,3	244,3	102,6	95,4	1 264,2	448,4
55 - 60	9 076	2 074	10 302	3 960	1 491	1 796	20 674	7 930	572,4	113,8	650,1	217,2	94,0	89,5	1 316,6	429,5
60 - 65	6 727	1 824	7 163	3 184	1 034	1 454	14 924	6 462	596,9	117,6	635,6	205,3	91,7	93,7	1 324,2	416,6
65 - 70	4 227	1 581	4 108	2 206	686	1 041	9 082	4 908	501,8	128,9	495,0	186,4	81,4	84,9	1 078,2	400,2
70 und älter	4 845	2 277	4 319	2 647	904	1 469	10 068	6 393	350,9	119,6	312,8	139,1	65,5	77,2	729,2	335,9
Insgesamt	68 966	29 632	121 193	90 332	23 570	28 770	213 679	145 394	285,2	108,9	501,1	333,5	97,3	105,5	883,5	547,9

# BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN


Auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe

— 1955 — 1956 - - - 1957 — 1958

## MÄNNLICH



## WEIBLICH



STAT. BUNDESAMT 1958

Altersgruppen in Jahren