

STATISTISCHE BERICHTE



ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/22

Erschienen am 21. März 1956

Signatur ZS 1
3 A 7 IV c

Die Sterbefälle im Jahre 1954
nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Seite

A. Text

B. Tabellen

1. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1954 nach Todesursachen und Altersgruppen (kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B) 3
2. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen 10
3. Die Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet von 1950 bis 1954 nach wichtigsten Todesursachen 13
4. Die Sterbefälle der Säuglinge im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen 14
5. Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet von 1949 bis 1954 nach Todesursachen 14
6. Die Sterbefälle an Tuberkulose im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954 nach Altersgruppen und Geschlecht 15
7. Die Unfallsterbefälle im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954 nach Altersgruppen und Geschlecht 15

C. Schaubilder

1. Die Sterbefälle an Grippe und Tuberkulose 1953 und 1954 16
2. Die Sterbefälle bei den alten Leuten 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen 16

Die Sterbefälle im Jahr 1954 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Im Jahre 1954 starben in der Bundesrepublik Deutschland 515 564 Personen gegenüber 539 134 im Jahre 1953. Die Gesamtsterbeziffer betrug 104,1 auf 10 000 der Bevölkerung und lag damit im Vergleich zum Vorjahr (110,1) deutlich niedriger. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war bei Männern und Frauen annähernd gleich.

Die allgemeine Sterbeziffer der wichtigsten Todesursachen

Die allgemeinen Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen im Jahre 1954 zeigten gegenüber 1953 einige erwähnenswerte Veränderungen. Der deutliche Rückgang der Sterbeziffern an Grippe (1953: 3,3; 1954: 0,5), Lungenentzündung (1953: 5,0; 1954: 3,7) und den übrigen Erkrankungen der Atmungsorgane (1953: 3,6; 1954: 2,8) verursachte in erster Linie den niedrigeren Stand der Gesamtsterbeziffer des Jahres 1954 gegenüber 1953. Die leichte Zunahme der Sterbeziffern an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten und Krebs dürfte statistisch in gewissem Umfang in Wechselwirkung mit dem Rückgang der Sterbeziffer an Altersschwäche stehen. Während die Unfall-Sterbeziffer in beiden Jahren mit 5,4 auf gleicher Höhe lag, zeigte die Tuberkulose-Sterbeziffer des Jahres 1954 (2,0) gegenüber 1953 (2,2) einen leichten Rückgang.

Die standardisierten Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen

Bei diesem Überblick über die Sterblichkeitsveränderungen im Jahre 1954 gegenüber 1953 ist von den allgemeinen Sterbeziffern ausgegangen worden. Da die Höhe dieser allgemeinen Sterbeziffern aber wesentlich von der Geschlechts- und Alterszusammensetzung der Bevölkerung in den jeweili-


Sterbefälle 1954 und 1953 nach wichtigsten Todesursachen

Todesursachen und Nummern des deutschen ausführlichen Verzeichnisses 1950	1954		1953	
	Anzahl	auf 10 000 d. Bev.	Anzahl	auf 10 000 d. Bev.
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 421—498)	197 856	40,0	192 227	39,3
davon:				
Herzkrankheiten (421—462)	99 776	20,2	98 052	20,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (Gehirnblutung) (371)	71 627	14,5	68 878	14,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 463 bis 498)	26 453	5,3	25 297	5,2
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201—249)	38 076	17,8	36 110	17,6
Altersschwäche (891, T.v. 892)	32 642	6,8	35 897	7,3
Unfälle insgesamt (901—969)	26 497	5,4	26 260	5,4
darunter:				
Kraftfahrzeugunfälle (901)	10 410	2,1	9 635	2,0
Lungenentzündung (531—539, 844)	18 320	3,7	24 524	5,0
Grippe (521, 522)	2 247	0,5	16 131	3,3
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501—503, 511, 541, 549, 551—553, 561, 571—579)	14 030	2,8	11 511	3,6
Tuberkulose insgesamt (000—039)	10 110	2,0	10 594	2,2
darunter:				
der Atmungsorgane (000,010)	8 843	1,8	9 127	1,9
Selbstmord (970—979)	9 562	1,9	8 930	1,8
Alle übrigen Todesursachen	116 230	23,4	121 180	24,6
Sterbefälle insgesamt	515 564	104,1	539 134	110,1


gen Jahren beeinflusst wird, ist es ohne weiteres verständlich, daß eine Beurteilung des Sterblichkeitsverlaufs auf Grund dieser Sterbeziffern nur für kurze Zeitabschnitte vertretbar ist. Wird es aber erforderlich, die Sterbeziffern über einen längeren Zeitraum hinaus vergleichend zu betrachten, muß man dazu die Sterbeziffern der einzelnen Altersgruppen für Männer und Frauen getrennt heranziehen. Für einen schnellen Überblick kann man daraus zunächst Sterbeziffern berech-

STERBEZIFFERN IN DEUTSCHLAND* NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN Auf 10 000 der Bevölkerung

Bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres



Bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1952



Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen

Todesursachen und Nummern des deutschen ausführlichen Verzeichnisses 1950	1938 ¹⁾	1950	1951	1952	1953	1954	1938 ¹⁾	1950	1951	1952	1953	1954
	Allgemeine Sterbeziffern bezogen auf 10 000 der Bevölkerung						Standardisierte Sterbeziffern bezogen auf 10 000 und den Altersaufbau der Bevölkerung 1952					
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371, 372, 421-498)	31,0	33,8	35,8	37,8	39,3	40,0	37,1	35,3	36,6	37,8	38,5	37,7
davon:												
Herzkrankheiten (421-482)	16,1	16,8	17,6	18,7	20,0	20,2	18,9	17,5	18,0	18,7	19,7	18,1
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (Gehirnblutung) (371)	10,1	12,2	12,9	13,5	14,1	14,5	12,2	12,8	13,2	13,5	13,8	13,6
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 483-498)	4,8	4,8	5,3	5,6	5,2	5,3	6,0	5,0	5,4	5,5	5,0	6,0
Krebs und andere bösartigen Neubildungen (201-249)	14,7	17,0	17,3	17,7	17,6	17,8	17,0	17,5	17,6	17,7	17,4	17,0
Altersschwäche (891, T.v. 892)	9,9	7,5	7,1	7,4	7,3	6,6	12,8	8,1	7,3	7,4	7,0	6,0
Unfälle insgesamt (901-969)	5,5	4,5	4,9	4,9	5,4	5,4	5,1	4,5	4,8	4,9	5,3	5,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)		1,2	1,5	1,5	2,0	2,1		1,2	1,5	1,5	2,0	2,0
Lungenentzündung (531-539, 844)	8,4	4,8	4,9	4,2	5,0	3,7	9,0	4,9	4,9	4,2	4,9	3,5
Tuberkulose insgesamt (000-039)	6,2	3,9	3,7	2,7	2,2	2,0	6,2	4,0	3,7	2,7	2,1	2,0
darunter:												
der Atmungsorgane (000,010)	5,3	3,3	3,1	2,3	1,9	1,8	5,3	3,3	3,1	2,3	1,9	1,7
Selbstmord (970-979)	2,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	2,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9
Sterbefälle insgesamt	116,6	103,5	105,5	104,6	110,1	104,1	129,6	107,0	107,3	104,8	108,5	98,9

¹⁾ Reichsgebiet.


nen, bei denen die nach Alter und Geschlecht unterschiedenen Ziffern der Vergleichsjahre auf eine Bevölkerung mit gleicher Alters- und Geschlechtsgliederung (Standardbevölkerung) umgerechnet und zu einer „standardisierten“ Sterbeziffer zusammengelaßt sind. In der obigen Tabelle sind die allgemeinen Sterbeziffern von 1938 und von 5 Nachkriegsjahren (1950-1954) den standardisierten Sterbeziffern dieser Jahre gegenübergestellt, wobei als Standardbevölkerung die des mittleren Nachkriegsjahres 1952 gewählt wurde.

Es zeigt sich deutlich, daß die Sterblichkeitsabnahme in diesem Zeitraum noch erheblich größer war, als es durch den Rückgang der unbereinigten allgemeinen Gesamtsterbeziffer zum Ausdruck kommt. Auch nach den standardisierten Sterbeziffern ist ein erheblicher Rückgang in der Sterblichkeit an Tuberkulose, Lungenentzündung und Altersschwäche festzustellen. Während nach den allgemeinen Sterbeziffern die Sterblichkeit an Krebs, Gehirnblutung und Herzkrankheiten einen deutlichen Anstieg aufweist, ist nach den standardisierten Sterbeziffern eine andere Entwicklung erkennbar. Die Sterblichkeit an Krebs ist nahezu gleich geblieben, die an Herzkrankheiten leicht und die an Gehirnblutung nur geringfügig angestiegen. Die Sterblichkeit an Unfällen stieg nach beiden Ergebnissen leicht an, die an den übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates läßt weder eine steigende noch fallende Tendenz erkennen. Die in den Jahren 1950 bis 1954 nach beiden Ergebnissen praktisch gleich hohen Selbstmord-Sterbeziffern lagen gegenüber 1938 deutlich niedriger.

Die Säuglingssterblichkeit

Die Sterbeziffer der Säuglinge (Kinder unter 1 Jahr) betrug 1954 427,7 auf 10 000 Lebendgeborene gegenüber 461,9 im Vorjahre. Damit hat sich der seit Kriegsende zu beobachtende Rückgang der Säuglingssterblichkeit auch weiterhin fortgesetzt. Aus dem nebenstehenden Schaubild ist deutlich die hohe Sterblichkeit der Folgen an Frühgeburt zu erkennen. Zunächst scheint es überraschend, daß diese Sterbeziffer 1938 niedriger als 1953 und 1954 lag. Ein umgekehrtes Bild zeigt aber die Sterblichkeit an angeborener Lebensschwäche, die

1938 gegenüber 1953 und 1954 fast doppelt so hoch war. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß die Diagnose angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2500 g) und Frühgeburt (Geburtsgewicht unter 2500 g) häufig in der



Die Sterbefälle der Säuglinge 1954 nach wichtigsten Todesursachen

Todesursachen und Nummern des deutschen ausführlichen Verzeichnisses 1950	Gestorbene Säuglinge							
	unter 1 Jahr		davon					
	Anzahl	vH	unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		unter 1 Jahr auf 10 000 Lebendgeborene	davon unter 7 Tage bis unter 1 Jahr
Frühgeburt (852)	8 842	29,5	9 085	47,0	777	5,5	126,2	116,2
Angeborene Lebensschwäche (851)	2 647	7,9	2 291	11,9	358	2,5	33,9	29,4
Angeborene Mißbildungen (831-839)	3 839	11,5	1 673	8,7	2 166	15,4	49,2	21,5
Entbindungsfolgen (841)	2 915	8,7	2 639	13,7	276	2,0	37,4	33,8
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	3 814	11,4	295	1,5	3 519	25,9	48,9	3,8
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	659	2,0	21	0,1	638	4,5	8,4	0,3
Magen- und Darmkatarrh (861, 843)	555	1,7	11	0,1	544	3,9	7,1	0,1
Alle übrigen Todesursachen	9 082	27,2	3 306	17,1	5 776	41,1	116,5	42,4
Gestorbene insgesamt	33 353	100	19 301	100	14 052	100	427,7	247,5
dagegen:								
1953	35 094	—	19 459	—	15 625	—	461,9	256,2
1952	36 787	—	20 808	—	15 959	—	482,3	272,9

Praxis nicht streng getrennt wird und diese Todesursachen zusammen betrachtet werden müssen¹⁾. Wird in dieser Weise vorgegangen, ist der wesentlich niedrigere Stand der Sterblichkeit in den Jahren 1953 und 1954 im Vergleich zu 1938 erkennbar. Eine günstige Entwicklung weisen ebenfalls die Sterbeziffern an Lungenentzündung, Infektionskrankheiten und Magen-Darmkatarrh auf. Während die Sterblichkeit durch Entbindungsfolgen in den 3 Beobachtungsjahren praktisch keine wesentlichen Änderungen aufwies, ist die Sterblichkeit an angeborenen Mißbildungen in den Nachkriegsjahren im Vergleich zu 1938 leicht angestiegen. Die Säuglingssterblichkeit in der 1. Lebenswoche betrug 1954 ebenso wie 1953 fast 60 vH aller Säuglingssterbefälle.

Die häufigsten Todesursachen in der 1. Lebenswoche sind Frühgeburten, angeborene Lebensschwäche und Entbindungsfolgen. Ihr Anteil betrug 1954 über 80 vH aller Sterbefälle dieses Zeitraums. Mit steigendem Lebensalter der Säuglinge gewinnen aber andere Todesursachen, vor allem Lungenentzündung, Infektionskrankheiten und Magen-Darmkatarrhe, immer mehr an Bedeutung. Die Säuglingssterblichkeit liegt in anderen Staaten allerdings noch erheblich niedriger — sie betrug 1954 in Holland 216 auf 10 000 Lebendgeborene. Eine weitere Senkung der Säuglingssterblichkeit müßte daher auch in der Bundesrepublik Deutschland möglich sein.

Die Müttersterblichkeit


Als Ende 1954 die Weltgesundheitsorganisation einen umfassenden Bericht über die Müttersterblichkeit²⁾ in den verschiedenen Staaten der Welt veröffentlichte, war es nahe-

liegend, die deutschen Ergebnisse mit denen der übrigen Staaten zu vergleichen. Bevor nun auf diese Ergebnisse eingegangen wird, ist es erforderlich, einige grundsätzliche Erläuterungen zu geben. Als Sterbefälle der Mütter werden in der internationalen Todesursachenstatistik alle Sterbefälle an Komplikationen in Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Geburt bezeichnet. Es sei besonders darauf hingewiesen, daß hierzu auch die Komplikationen in Verbindung mit einer Fehlgeburt gezählt werden. Da im allgemeinen die Zahl der Fehlgeburten nicht bekannt ist, wäre es jedoch sachlich besser, alle mit Fehlgeburt zusammenhängenden Sterbefälle in den Begriff Müttersterblichkeit nicht einzubeziehen. Bei der Berechnung der Müttersterblichkeit wäre es nun folgerichtig, die Zahl der Sterbefälle an Komplikationen in Verbindung mit einer Schwangerschaft oder Geburt auf die Zahl der entbundenen Frauen, die der Zahl der Lebendgeborenen und Totgeborenen abzüglich der Mehrlingskinder entspricht, zu beziehen. Für internationale Vergleiche hat es sich aber eingebürgert, die Zahl der an Komplikationen in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt (einschließlich Fehlgeburt) gestorbenen Mütter auf 10 000 Lebendgeborene zu beziehen, da in einigen Staaten die Zahl der Totgeburten nicht registriert wird und außerdem die Häufigkeit der Totgeburten in den verschiedenen Ländern etwa gleich hoch ist (rd. 2 vH). Allerdings weist die Definition für „Lebendgeborene“ in den verschiedenen Staaten geringfügige Unterschiede auf. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz wird nur ein Kind, das geatmet hat, als „lebendgeboren“ bezeichnet, während in anderen Staaten die Definition „lebendgeboren“ weiter gefaßt ist und auch andere Lebenszeichen u. a. Herz- und Muskelzuckungen einschließt. Aus diesem Grunde ist die Zahl der Lebendgeborenen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz relativ etwas niedriger als in den übrigen Staaten; im Hinblick auf die Müttersterblichkeit muß diese daher in den 3 genannten Ländern auf Grund der enger gefaßten Definition „lebendgeboren“ geringfügig höher liegen.


In nebenst. Schaubild ist die Reihenfolge der Müttersterblichkeit in einer Reihe von Staaten in der Vor- und in der Nachkriegszeit dargestellt worden. Der Vergleich der Ergebnisse zeigt den deutlichen Rückgang der Müttersterblichkeit in allen Staaten in diesem Zeitraum. In der Bundesrepublik Deutschland ist nun auch ein Rückgang der Müttersterblichkeit zu verzeichnen, der aber im Vergleich zu den übrigen Staaten wesentlich geringer ist. Eine eindeutige Erklärung für die im Vergleich zum Ausland hohe deutsche Müttersterblichkeit ist auf Grund der statistischen Unterlagen allein nicht zu geben. Während die gegenüber den übrigen Staaten relativ niedrigere Zahl der Lebendgeborenen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz keine wesentliche Rolle spielen dürfte, könnten aber uneinheitliche Signierrichtlinien gerade bei den Müttersterbefällen in den verschiedenen Ländern Unterschiede verursachen. So werden z. B. in der Bundesrepublik Deutschland die in den Leichenschaucheinen vermerkten Angaben über die Todesursachen bei Schwangeren oder Wöchnerinnen, abgesehen von wenigen Ausnahme-

DIE MÜTTERSTERBLICHKEIT VOR UND NACH DEM 2. WELTKRIEG IN AUSGEWÄHLTEN STAATEN

Auf 10 000 Lebendgeborene



VOR DEM
2. WELTKRIEG




NACH DEM
2. WELTKRIEG

STAT. BUNDESAMT 56 - 1110

1) „Wirtschaft und Statistik“, 7. Jg. N. F., Heft 10, Oktober 1953, Seite 481 ff. — 2) Epidemiological and Vital Statistics Report 1954, 7, 37—84; Herausgeber Weltgesundheitsorganisation, Genf.

DIE MÜTTERSTERBLICHKEIT IN DEUTSCHLAND 1892-1954

Auf 10 000 Lebendgeborene




STAT. BUNDESAMT 56 - 1477

Ab 1945 ohne Platz

fällen, im allgemeinen als Komplikation in Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Geburt signiert, während in anderen Staaten die Müttersterbefälle danach unterschieden werden, ob das zum Tode führende Leiden ursächlich mit der Schwangerschaft in Zusammenhang stand oder nicht. Um die Müttersterbefälle in dieser Weise aufgliedern zu können, soll — wie es bereits in England und Dänemark seit längerer Zeit durchgeführt wird — zunächst probeweise in einigen Bundesländern bei jeder gestorbenen Frau außer dem zum Tode führenden Grundleiden das Vorliegen einer Schwangerschaft oder Geburt zusätzlich erfaßt werden.

Der Verlauf der Müttersterblichkeit im Deutschen Reich bzw. in der Bundesrepublik ist aus dem untenst. Schaubild für die Jahre 1892 bis 1954 zu ersehen. Vor dem 1. Weltkrieg lagen die Sterbeziffern verhältnismäßig niedrig. Sie stiegen aber bereits im 1. Weltkrieg steil an und blieben von Kriegsende bis etwa 1929 — in diesem Jahr betrug die Müttersterblichkeit 55,3 auf 10 000 Lebendgeborene und war damit die höchste, die bisher in Deutschland beobachtet wurde — ungefähr auf gleicher Höhe. Seit 1930 hat sich die Müttersterblichkeit im Deutschen Reich rückläufig entwickelt. Diese Rückläufigkeit setzte sich nach dem Kriege in der Bundesrepublik Deutschland fort und erreichte mit rund 15 Sterbefällen auf 10 000 Lebendgeborene im Jahre 1954 ihren bisher niedrigsten Stand. Aber auch hier liegen die Auslandsergebnisse wesentlich günstiger — die Müttersterblichkeit betrug 1954 in Holland 6,8 auf 10 000 Lebendgeborene.

Für die Beurteilung der Müttersterblichkeit stehen noch weitere Aufgliederungen, u. a. nach Todesursachen, Alter der Mütter, zur Verfügung. Das folgende Schaubild zeigt eine Aufgliederung nach Todesursachen.



Die zeichnerische Darstellung läßt erkennen, daß die durch Fehlgeburt verursachten Sterbefälle — 1954 rund 14 vH der Müttersterblichkeit — die Gesamthöhe der Müttersterblichkeit nicht entscheidend beeinflussen. Überraschend hoch — auch im Vergleich mit ausländischen Ergebnissen — liegen aber die Sterbeziffern an sonstigen Zufällen bei Entbindung und Wochenbett. Es werden daher bei der oben erwähnten zusätzlichen Erfassung des Vorliegens einer Schwangerschaft oder Geburt bei jeder gestorbenen Frau diese Sterbefälle besonders untersucht werden müssen, da gerade das Einordnen von Sterbefällen in diese Gruppe in den verschiedenen Staaten uneinheitlich erfolgt sein dürfte.

Die Tuberkulosesterblichkeit

Wie bereits mehrfach in dieser Zeitschrift hervorgehoben⁴⁾, hat sich gerade in den letzten 20 Jahren eine deutliche Verschiebung in der Häufigkeit einiger Todesursachen, insbesondere in den jüngeren und mittleren Lebensaltern, entwickelt. Besonders deutlich ist diese Verschiebung zwischen Tuberkulose- und Unfallsterblichkeit aus dem untenstehenden Schaubild zu erkennen.

Die Kurven der Tuberkulosesterblichkeit für die Jahre 1953 und 1954 liegen insgesamt und insbesondere im mittleren Lebensalter erheblich niedriger als die der Jahre 1933, 1938 und 1949. Während in den Vorkriegsjahren und auch noch 1949 die Kurve der Tuberkulosesterbeziffer der Männer vom 15. bis etwa zum 30. Lebensjahr steil und dann langsam anstieg, erfolgte 1953 und 1954 anfangs ein langsamer und etwa ab dem 45. Lebensjahr ein steilerer Anstieg. Auch bei den Frauen verlaufen die Kurven der Tuberkulosesterblichkeit der Jahre 1953 und 1954 wesentlich niedriger als die der Jahre 1933, 1938 und 1949. Der Anstieg der Kurve der Tuberkulosesterblichkeit der Frauen beginnt in der Vorkriegszeit und auch noch 1949 etwas früher als die der Männer und erreicht bei den 20- bis 25jährigen ihren ersten Höhepunkt. Nach einem Absinken erfolgt dann ab dem 55. Lebensjahr erneut ein Anstieg. Die Tbc-Sterblichkeitskurven der Frauen in den Jahren 1953 und 1954 zeigen noch deutlicher als die der Männer den Rückgang der Sterblichkeit, insbesondere in den jungen und mittleren Lebensaltern.

Die Unfallsterblichkeit

Diese erfreuliche Entwicklung der Tbc-Sterblichkeit bei beiden Geschlechtern wird aber bei den Männern durch die entgegengesetzte Entwicklung der Unfallsterblichkeit praktisch wieder aufgehoben. Sehr deutlich zeigen die Kurven der Unfallsterblichkeit in den Jahren 1938, 1953 und 1954 — also Jahre einer guten Wirtschaftskonjunktur — den steilen Anstieg der Sterblichkeit vom 10. Lebensjahr ab mit einem Gipfel bei den 20- bis 25jährigen Männern. Wenn auch vor dem Kriege die Tuberkulosesterblichkeit der Männer in diesen Lebensjahren fast eine ähnliche Höhe erreichte, handelt es sich doch um Sterbefälle, denen fast immer eine längere Krankheit mit einer eingeschränkten oder aufgehobenen Erwerbstätigkeit vorausgegangen war, während die tödlichen Unfälle fast ausschließlich junge, im Erwerbsleben stehende Menschen plötzlich dahinfließen. Die Kurve der Unfallsterbeziffern der Frauen zeigt im Vergleich zu der der Männer eine angedeutete Gipfelbildung bei den 15- bis 25jährigen. Die Frauen sind aber in diesen Lebensaltern durch andere Todesursachen, nämlich die Komplikation in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt, gefährdet. Allerdings erreichen diese Sterbeziffern keine derart alarmierende Höhe wie die Unfallsterbeziffer der Männer.

Gegenüberstellung von Ergebnissen der Todesursachenstatistik und Straßenverkehrsunfallstatistik

	1954			1953		
	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.
Todesursachenstatistik						
Unfalltote (Pos.-Nr. 901—969) ...	18 845	7 652	26 497	18 843	7 417	26 260
darunter:						
Straßenverkehrsunfälle (Pos.-Nr. 901, 912, 919) ...	9 433	2 297	11 730	8 873	2 232	11 105
Straßenverkehrsunfallstatistik						
Getötete (einschl. d. innerhalb 30 Tagen an der Unfallfolge Gestorb.)	9 420	2 235	11 655	8 807	2 218	11 025



⁴⁾ „Wirtschaft und Statistik“, 5. Jg. N. F., Heft 3, März 1953; Heft 11, November 1953, 6. Jg. N. F., Heft 12, Dezember 1954

TUBERKULOSE- UND UNFALLSTERBLICHKEIT IN DEUTSCHLAND*



Auf 10000 der jeweiligen Altersgruppe

— 1933 — 1938 — 1949 — 1953 — 1954

TUBERKULOSESTERBLICHKEIT (ALLE FORMEN)



UNFALLSTERBLICHKEIT



STAT. BUNDESAMT 50-1112

* 1933 u. 1938 Reichsgebiet, jetziger Gebietsstand; seit 1949 Bundesgebiet.

Bei den tödlichen Unfällen spielen insbesondere bei den Männern die Straßenverkehrsunfälle eine überragende Rolle.

In unseitiger Tabelle sind die Ergebnisse der Todesursachen- und der Verkehrsunfallstatistik, die trotz der verschiedenartigen Meldewege praktisch übereinstimmen, für die Jahre 1954 und 1953 gegenübergestellt. Die tödlichen Straßenverkehrsunfälle betragen bei den Männern rund 50 vH und bei den Frauen rund 30 vH aller tödlichen Unfälle.

Als Ergänzung der Angaben über die Unfallsterblichkeit werden seit 1954 im Hessischen Statistischen Landesamt einige zusätzliche Auszählungen bei der hessischen Todesursachenstatistik vorgenommen. Diese Ergebnisse⁴⁾ sind insbesondere für die Ärzte von großem Erkenntniswert, da sie eine Aufgliederung der Unfalldaten nach dem Ort des Unfalls und auch nach der Art der Verletzung geben. Auf Grund der hessischen Ermittlungen verteilt sich die Gesamtzahl der tödlichen Unfälle im Jahre 1954 in Hessen wie folgt:

Verkehrsunfälle insgesamt	43,1 vH
darunter:	
Straßenverkehrsunfälle	33,2 vH
Unfälle im Hause	27,5 vH
Berufs- und Betriebsunfälle	13,5 vH
sonstige Unfälle	16,0 vH

insgesamt 100

Die Gliederung der tödlichen Straßenverkehrsunfälle nach der Art der Verletzung

Verletzungen von Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule und Rückenmark	79,2 vH
Knochenbrüche ausschließlich Schädelbruch und Bruch der Wirbelsäule	7,0 vH
Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	11,1 vH
Verletzungen oder Schädigungen anderer Art und ohne nähere Angaben	2,7 vH

insgesamt 100

zeigt erwartungsgemäß, daß der Anteil der Kopfverletzungen mit über 79,2 vH an der Spitze aller tödlichen Straßenverkehrsunfälle steht.

⁴⁾ Staat- und Wirtschaft in Hessen, Statistische Mitteilungen, Heft 6, 1954, und Heft 8, 1955.

Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1954 nach Todesursachen und Altersgruppen

Nr.	Todesursache Nr. der internationalen Liste B	insgesamt	Gestorbene						
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
männlich									
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01)	6 071	-	17	26	4	10	25	63
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	635	-	28	75	19	16	26	21
B 3	Syphilis und Folgeerkrankungen (05)	482	7	32	1	1	1	2	3
B 4	Typhus (071)	42	-	1	3	1	2	3	3
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	10	-	3	3	-	-	-	-
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09,137)	35	-	3	12	5	3	2	2
B 8	Diphtherie (11)	99	-	8	46	25	-	3	-
B 9	Keuchhusten (132)	186	1	146	40	1	-	-	-
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	69	1	21	21	8	1	2	-
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	149	-	5	37	23	15	15	15
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	Masern (162)	123	-	34	67	19	3	-	-
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	1	-	-	-	-	-	-	-
B 16	Malaria (18)	14	-	-	-	-	-	-	-
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06,072,073, 082,084,10,131,134-136,139,14,152-154,163-167,169,19)	663	5	53	49	33	27	21	18
B 18	Wichtige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	45 023	1	17	154	122	140	173	181
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26,27)	2 038	4	23	28	31	25	27	23
B 20	Diabetes mellitus (33)	1 696	-	-	11	7	11	13	5
B 21	Anämien (641,645)	397	4	7	7	1	4	4	3
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	35 176	-	-	7	5	10	10	28
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	518	6	159	58	18	15	12	13
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40,41)	122	-	-	2	2	19	10	5
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	247	-	-	-	2	1	2	4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451,452,455,456)	42 062	-	14	14	15	24	68	80
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43,44,459)	6 258	-	20	19	14	21	30	44
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461,462)	2 320	-	-	-	-	-	-	-
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463,464)	612	-	-	-	-	-	1	2
B 30	Grippe (52)	1 028	1	98	40	9	4	6	2
B 31	Lungenentzündung (53)	8 942	1	721	309	38	26	40	15
B 32	Bronchitis (54)	3 737	1	100	34	4	3	4	2
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	2 620	-	-	1	1	-	1	23
B 34	Blinddarmentzündung (63)	1 171	-	8	74	36	35	64	34
B 35	Darmerkrankungen und Hernien (64,65)	2 482	5	114	46	22	12	25	10
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünn- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621,661,662)	823	-	249	95	8	7	6	8
B 37	Leberzirrhose (672)	3 723	-	5	1	2	2	4	5
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	2 506	-	4	16	10	23	35	56
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 099	-	-	-	-	-	-	-
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	2 399	897	1 180	156	38	22	31	12
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841,842)	2 415	2 192	223	-	-	-	-	-
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	680	215	465	-	-	-	-	-
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846,847,849,85)	9 555	7 588	1 967	-	-	-	-	-
B 45	Altersschwäche ohne Gelstesstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891,896-899)	19 340	81	358	105	14	30	36	51
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32,34-36,382-389,39,47-51,55-60,629,663, 669,671,679,68,69,71,728,729,73,74,78-82,868,869,87,88,892)	28 807	23	720	363	128	152	190	204
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	8 390	1	3	209	276	179	738	1 389
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	10 455	5	195	604	282	305	638	754
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	6 191	-	-	-	2	42	295	462
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98,99)	281	37	8	12	11	7	5	15
BE-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00 - 99)	265 665	11 075	6 009	2 740	1 258	1 193	2 571	3 587
weiblich									
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01)	2 772	-	14	24	3	10	41	97
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	632	-	25	65	22	20	28	31
B 3	Syphilis und Folgeerkrankungen (05)	385	4	25	3	1	1	-	1
B 4	Typhus (071)	70	-	2	1	2	2	2	4
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	7	-	3	2	1	-	-	-
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09,137)	93	-	2	14	7	2	1	1
B 8	Diphtherie (11)	202	-	3	43	19	3	-	-
B 9	Keuchhusten (132)	54	-	159	59	-	2	-	1
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	81	-	14	21	2	1	2	1
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	-	-	4	20	11	10	7	6
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	Masern (162)	87	-	25	44	10	7	-	-
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	1	-	-	-	-	-	-	-
B 16	Malaria (18)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06,072,073, 082,084,10,131,134-136,139,14,152-154,163-167,169,19)	653	3	31	51	17	32	10	13
B 18	Wichtige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	47 327	-	15	117	91	81	123	115
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26,27)	2 573	-	13	22	21	19	27	18
B 20	Diabetes mellitus (33)	3 276	-	-	3	4	13	18	12
B 21	Anämien (641,645)	750	-	1	9	4	3	4	8
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	44 489	-	2	6	3	4	20	13
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	346	3	121	40	15	6	8	4
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40,41)	188	-	-	2	2	11	3	4
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	122	-	-	-	-	3	5	4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451,452,455,456)	38 613	-	12	3	11	24	52	69
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43,44,459)	5 992	-	16	10	8	12	32	35
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461,462)	3 892	-	-	-	1	-	-	-
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463,464)	801	-	-	-	-	-	-	-
B 30	Grippe (52)	1 213	-	65	29	-	6	8	-
B 31	Lungenentzündung (53)	8 654	-	1 369	209	27	20	22	15
B 32	Bronchitis (54)	2 398	-	87	20	2	1	5	1
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	651	-	-	1	1	-	6	4
B 34	Blinddarmentzündung (63)	848	-	2	39	25	29	33	37
B 35	Darmerkrankungen und Hernien (64,65)	2 470	4	44	21	7	12	17	19
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünn- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621,661,662)	846	-	194	74	5	4	4	4
B 37	Leberzirrhose (672)	2 037	-	2	1	2	-	2	2
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	2 320	-	4	8	13	37	53	43
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 184	-	-	-	-	-	-	-
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	2 073	776	986	158	32	22	30	12
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841,842)	1 592	1 447	145	-	-	-	-	-
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	485	136	349	-	-	-	-	-
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846,847,849,85)	7 183	5 743	1 440	-	-	-	-	-
B 45	Altersschwäche ohne Gelstesstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891,896-899)	22 465	40	253	90	19	16	26	20
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32,34-36,382-389,39,47-51,55-60,629, 663,669,671,679,68,69,71,728,729,73,74,78-82,868, 869,87,88,892)	28 541	14	460	285	77	132	198	209
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	2 020	-	2	145	161	74	153	134
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	5 632	12	164	347	77	70	74	70
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	3 371	-	-	-	-	12	186	176
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98,99)	201	44	10	17	10	9	13	10
BE-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00 - 99)	249 899	8 226	6 043	1 983	712	690	1 245	1 340

noch: Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1954 nach Todesursachen und Altersgruppen

gestorben																Nr.
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und älter	mit unbekanntem Alter		
männlich																
206	237	169	388	565	864	677	775	659	601	411	125	27	2	-	B 1	
23	29	15	31	55	57	41	46	55	47	37	11	5	-	-	B 2	
4	3	11	17	21	75	50	75	75	59	30	6	2	-	-	B 3	
2	2	2	1	5	2	5	2	1	3	1	3	-	-	-	B 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16	
2	2	1	3	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	B 17	
20	18	18	59	98	51	47	41	53	38	45	34	10	5	-	B 18	
205	289	334	889	1 993	3 699	5 145	5 768	7 093	7 634	6 767	3 358	942	121	-	B 19	
28	35	31	69	158	222	211	244	255	257	196	134	29	9	-	B 20	
13	18	11	24	67	94	117	191	312	369	278	125	25	2	-	B 21	
3	2	6	7	10	18	18	37	52	85	72	47	10	-	-	B 22	
30	46	55	153	399	926	1 691	2 721	4 765	7 218	8 768	5 683	2 241	420	-	B 23	
6	20	12	27	9	33	19	34	25	11	8	3	2	-	-	B 24	
8	2	4	4	18	21	26	21	24	37	31	23	7	1	-	B 25	
133	157	227	643	1 469	2 846	3 974	4 680	5 947	7 126	7 628	4 769	1 856	392	-	B 26	
70	67	74	179	239	453	482	635	901	1 027	1 013	670	246	34	-	B 27	
1	3	3	24	53	133	186	293	416	479	431	226	60	12	-	B 28	
2	1	4	17	32	47	60	89	85	104	90	55	20	3	-	B 29	
5	7	5	12	18	26	40	61	88	114	218	167	87	20	-	B 30	
26	40	24	63	146	235	346	471	742	1 115	1 549	1 284	600	152	-	B 31	
-	5	5	15	51	103	268	314	394	523	781	603	237	91	-	B 32	
41	57	62	162	318	392	375	353	268	258	167	101	20	4	-	B 33	
25	35	25	57	84	105	97	112	119	101	85	50	10	5	-	B 34	
22	14	27	49	70	168	165	222	285	346	428	310	117	23	-	B 35	
5	11	7	9	34	32	34	32	42	69	84	68	16	7	-	B 36	
11	44	45	151	284	392	534	543	612	541	354	148	43	2	-	B 37	
81	99	71	161	241	295	286	251	211	289	235	125	30	9	-	B 38	
-	-	-	-	6	20	60	188	491	1 006	1 519	1 192	505	112	-	B 39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44	
66	70	63	173	341	552	623	692	1 037	1 810	3 594	4 732	3 530	1 381	1	B 45	
240	286	253	593	1 165	1 953	2 444	2 701	3 416	4 039	4 651	3 449	1 488	349	-	B 46	
850	596	553	576	593	616	401	397	362	357	273	157	49	4	1	B 47	
608	454	302	581	702	761	665	560	592	684	738	617	303	97	8	B 48	
412	348	307	544	727	820	590	474	390	311	277	121	51	15	3	B 49	
16	28	13	19	35	21	18	8	10	7	4	3	1	1	2	B 50	
5 218	5 057	2 571	5 715	9 996	16 129	13 934	22 995	29 791	36 666	40 797	28 405	12 690	3 273	15	B 50	
weiblich																
188	255	140	223	202	177	186	230	272	333	256	98	22	1	-	B 1	
23	10	24	24	31	42	42	43	53	61	50	29	8	1	-	B 2	
5	4	7	16	23	49	68	63	64	29	16	4	-	-	-	B 3	
2	2	3	3	5	9	5	5	7	9	3	4	2	-	-	B 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16	
20	30	17	25	29	49	44	55	66	60	56	37	24	4	-	B 17	
264	627	751	1 933	2 892	4 103	4 996	5 915	6 693	7 381	6 512	3 378	1 127	212	1	B 18	
37	79	76	216	310	299	215	250	251	273	230	156	66	13	-	B 19	
19	18	18	20	66	125	264	408	623	723	610	287	57	8	-	B 20	
4	6	7	19	32	38	77	95	151	172	68	25	7	-	-	B 21	
30	54	57	209	519	1 050	1 806	3 399	6 059	9 097	10 885	7 421	3 115	742	-	B 22	
6	3	9	13	24	19	20	12	13	8	3	3	-	-	-	B 23	
6	3	2	12	7	16	17	22	25	23	12	2	-	-	-	B 24	
6	3	6	11	12	31	36	43	51	78	72	44	14	3	-	B 25	
98	204	187	473	245	4 268	1 985	3 205	5 226	7 562	8 531	5 862	2 449	649	-	B 26	
49	77	49	129	158	255	360	537	808	1 127	1 273	724	272	51	-	B 27	
2	3	6	21	62	134	219	393	622	844	952	484	128	21	-	B 28	
1	3	5	14	20	46	48	96	105	152	180	97	29	4	-	B 29	
6	11	4	10	15	27	35	54	109	180	262	238	125	42	-	B 30	
27	40	37	85	105	154	233	372	701	1 195	1 639	1 433	753	237	-	B 31	
2	2	4	5	9	29	45	113	221	354	543	511	332	112	-	B 32	
3	10	8	25	44	61	75	89	80	103	101	30	9	1	-	B 33	
27	26	18	39	53	68	86	74	84	90	75	40	7	2	-	B 34	
21	37	28	74	90	126	170	225	285	392	462	285	119	32	-	B 35	
10	10	4	18	21	21	31	33	63	80	114	304	37	15	-	B 36	
7	22	23	57	87	145	229	316	359	339	271	129	38	5	-	B 37	
48	73	61	124	189	208	258	263	289	266	250	107	37	4	-	B 38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44	
38	43	40	83</													

6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1953			1954			1953			1954		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					
im Alter von 0 bis unter 1 Jahr ¹⁾												
Frühgeburt (852)	10 278	5 823	4 455	9 842	5 563	4 279	135,3	148,8	120,9	126,2	138,3	113,3
Angeborene Mißbildungen (831-839)	3 798	1 983	1 815	3 839	2 077	1 762	50,0	50,7	49,3	49,2	51,6	46,7
Angeborene Lebensschwäche (831)	2 860	1 652	1 208	2 647	1 511	1 136	37,6	42,2	32,8	33,9	37,6	30,1
Entbindungsfolgen (841)	2 595	1 599	996	2 915	1 783	1 132	34,2	40,9	27,0	37,4	44,3	30,1
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	4 469	2 495	2 014	3 814	2 138	1 676	58,8	62,7	54,7	48,9	53,2	44,4
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	906	467	439	659	365	294	11,9	11,9	11,9	8,4	9,1	7,8
darunter:												
Tuberkulose insgesamt (000-099)	99	53	46	84	45	39	1,3	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
Syphilis (051)	89	47	42	66	37	29	1,2	1,2	1,1	0,8	0,9	0,8
Keuchhusten (132)	402	200	202	286	147	139	5,3	5,1	5,5	3,7	3,7	3,7
Masern (162)	115	59	56	59	34	25	1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,7
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	768	451	317	555	311	244	10,1	11,5	8,6	7,1	7,7	6,5
Grippe (521, 522)	291	175	116	164	99	65	3,8	4,5	3,1	2,1	2,5	1,7
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	482	277	205	507	283	224	6,3	7,1	5,6	6,5	7,0	5,9
Alle übrigen Todesursachen	8 647	5 179	3 468	8 411	4 954	3 457	113,8	132,3	94,1	107,8	123,2	91,6
Gestorbene insgesamt (000-999)	35 094	20 061	15 033	33 353	19 084	14 269	461,9	512,5	408,1	427,7	474,5	377,9
im Alter von 1 bis unter 5 Jahren												
Unfälle insgesamt (901-969)	1 459	939	520	1 305	813	492	5,0	6,3	3,7	4,5	5,4	3,5
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	338	214	124	354	209	145	1,2	1,4	0,9	1,2	1,4	1,0
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	719	368	351	537	279	258	2,5	2,5	2,5	1,8	1,9	1,8
darunter:												
Diphtherie (111)	137	83	54	89	46	43	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
Keuchhusten (132)	179	75	104	99	40	59	0,6	0,5	0,7	0,3	0,3	0,4
Kinderlähmung (151, 152)	42	22	20	61	38	23	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2
Lungenentzündung (532, 534, 539)	549	285	264	518	309	209	1,9	1,9	1,9	1,8	2,1	1,5
Tuberkulose insgesamt (000-099)	236	119	117	190	101	89	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
Angeborene Mißbildungen (831-839)	268	141	127	294	156	138	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
Grippe (521, 522)	140	74	66	69	40	29	0,5	0,5	0,5	0,2	0,3	0,2
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	203	122	81	224	134	90	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,6
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	112	53	59	117	69	48	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3
Herzkrankheiten (421-462)	43	16	27	46	33	13	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbe- teiligung (411)	1	-	1	4	2	2	0,00	-	0,01	0,00	0,01	0,01
Alle übrigen Todesursachen	1 594	894	700	1 419	804	615	5,5	6,0	5,0	4,9	5,4	4,3
Gestorbene insgesamt (000-999)	5 324	3 011	2 313	4 723	2 740	1 983	18,4	20,3	16,4	16,2	18,3	14,0
im Alter von 5 bis unter 15 Jahren												
Unfälle insgesamt (901-969)	1 518	1 100	418	1 424	1 042	382	2,0	2,9	1,2	2,0	2,8	1,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	602	404	198	690	455	235	0,8	1,1	0,5	0,9	1,2	0,7
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	299	160	139	275	165	110	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
darunter:												
Diphtherie (111)	74	39	35	45	23	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tetanus (135)	30	24	6	34	27	7	0,04	0,1	0,02	0,05	0,1	0,02
Kinderlähmung (151, 152)	45	25	20	62	39	23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	226	126	100	201	117	84	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
darunter:												
Herzkrankheiten (421-462)	152	80	72	136	77	59	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems (371, 372)	32	24	8	22	15	7	0,04	0,1	0,02	0,05	0,04	0,02
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzeteiligung (411)	23	15	8	28	17	11	0,03	0,04	0,02	0,04	0,05	0,03
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	19	7	12	15	8	7	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Tuberkulose insgesamt (000-099)	114	64	50	104	49	55	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	183	92	91	197	102	95	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Lungenentzündung (532, 534, 539)	118	53	65	111	64	47	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Angeborene Mißbildungen (831-839)	103	47	56	114	60	54	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Grippe (521, 522)	66	28	38	19	13	6	0,1	0,1	0,1	0,03	0,04	0,02
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	53	25	28	71	46	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Selbstmord (970-979)	53	41	12	56	44	12	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,03
Alle übrigen Todesursachen	1 364	745	619	1 261	729	532	1,8	2,0	1,7	1,7	2,0	1,5
Gestorbene insgesamt (000-999)	4 097	2 481	1 616	3 833	2 431	1 402	5,5	6,6	4,4	5,3	6,5	3,9

1) Verhältniszahlen bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

noch: 6. Die Seerbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1953			1954			1953			1954		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren												
Unfälle insgesamt (901-969)	4 036	3 539	497	3 950	3 519	431	5,4	9,2	1,4	5,1	8,9	1,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 283	1 985	298	2 414	2 127	287	3,0	5,2	0,8	3,1	5,4	0,8
Selbstmord (970-979)	902	622	280	1 119	757	362	1,2	1,6	0,8	1,4	1,9	1,0
Tuberkulose insgesamt (000-039)	406	190	216	352	155	197	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankheiten (371, 372, 401-498)	548	305	243	554	298	256	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	426	234	192	425	228	197	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	66	39	27	71	38	33	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	40	23	17	37	18	19	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05	0,1
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	16	9	7	21	14	7	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02
Krebs- und andere bösartige Neubildungen (201-249)	325	183	142	323	185	138	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	181	90	91	140	91	49	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Lungenentzündung (532, 534, 539)	131	68	63	92	55	37	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Grippe (521, 522)	74	29	45	16	8	8	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	107	58	49	83	42	41	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Todesursachen	2 241	1 111	1 130	2 114	1 048	1 066	3,0	2,9	3,1	2,7	2,7	2,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	8 951	6 195	2 756	8 743	6 158	2 585	17,9	16,2	7,5	11,3	15,6	6,8
im Alter von 25 bis unter 45 Jahren												
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	4 626	1 332	3 294	4 588	1 333	3 255	3,5	2,3	4,4	3,4	2,2	4,4
Unfälle insgesamt (901-969)	5 062	4 352	710	4 997	4 330	667	3,8	7,4	0,9	3,7	7,3	0,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 610	2 227	383	2 748	2 385	363	1,9	3,8	0,5	2,7	4,0	0,5
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankheiten (371, 372, 401-498)	3 832	1 961	1 871	3 926	2 033	1 893	2,9	3,3	2,5	2,9	3,4	2,5
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	2 763	1 498	1 265	2 934	1 610	1 324	2,1	2,5	1,7	2,2	2,7	1,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	665	294	371	634	284	350	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	374	153	221	325	125	200	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	30	16	14	33	14	19	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Selbstmord (970-979)	2 225	1 389	836	2 570	1 611	959	1,7	2,4	1,1	1,9	2,7	1,3
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2 064	1 198	866	2 005	1 118	887	1,5	2,0	1,2	1,5	1,9	1,2
Lungenentzündung (532, 534, 539)	431	191	240	342	153	189	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	390	159	231	359	187	172	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Grippe (521, 522)	256	101	155	59	29	30	0,2	0,2	0,2	0,04	0,05	0,04
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	376	231	145	265	167	98	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1
Alle übrigen Todesursachen	8 811	3 784	5 027	8 284	3 600	4 684	6,6	6,4	6,7	6,2	6,1	6,3
Gestorbene insgesamt (000-999)	28 073	14 689	13 375	27 395	14 561	12 834	21,0	25,0	17,8	20,4	24,5	17,2
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren												
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankheiten (371, 372, 401-498)	38 738	21 252	17 486	40 122	22 592	17 530	31,4	38,2	23,9	31,8	39,6	23,3
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	23 772	14 348	9 424	24 972	15 529	9 443	19,3	25,8	14,0	19,8	27,3	13,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	12 272	5 576	6 696	12 511	5 737	6 774	10,0	10,0	9,9	9,9	10,1	9,8
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	2 637	1 309	1 328	2 556	1 293	1 263	2,1	2,4	2,0	2,0	2,3	1,8
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	57	19	38	83	33	50	0,05	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	31 758	14 801	16 957	32 879	15 687	17 192	25,8	26,6	25,1	26,0	27,5	24,8
Unfälle insgesamt (901-969)	5 734	4 563	1 171	5 843	4 695	1 148	4,7	8,2	1,7	4,6	8,2	1,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 199	1 778	421	2 456	2 007	449	1,8	3,2	0,6	1,9	3,5	0,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	4 181	3 131	1 050	4 211	3 258	953	3,4	5,6	1,6	3,3	5,7	1,4
Selbstmord (970-979)	3 962	2 594	1 368	4 084	2 611	1 473	3,2	4,7	2,0	3,2	4,6	2,1
Lungenentzündung (532, 534, 539)	2 972	1 701	1 271	2 062	1 198	864	2,4	3,1	1,9	1,6	2,1	1,2
Grippe (521, 522)	2 036	1 045	991	274	145	129	1,7	1,9	1,5	0,2	0,3	0,2
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	4 096	3 302	794	3 576	2 935	641	3,3	5,9	1,2	2,8	5,2	0,9
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	1 093	612	481	860	431	429	0,9	1,1	0,7	0,7	0,8	0,6
Alle übrigen Todesursachen	28 727	15 799	12 928	27 842	15 502	12 340	23,3	28,4	19,1	22,0	27,2	17,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	123 297	68 800	54 497	121 753	69 054	52 699	100,1	123,6	80,7	96,4	121,2	76,0

noch: 6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1953			1954			1953			1954		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					
Im Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	63 868	30 398	33 470	64 051	30 121	33 930	195,3	211,3	182,8	192,6	208,0	180,6
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	32 498	16 033	16 465	32 383	15 957	16 426	99,4	111,4	89,9	97,4	110,2	87,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	26 677	12 047	14 630	27 139	11 983	15 156	81,6	83,7	79,9	81,6	82,8	80,7
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	4 649	2 297	2 352	4 479	2 171	2 308	14,2	16,0	12,8	13,5	15,0	12,3
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	44	21	23	50	10	40	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	27 878	14 028	13 850	27 905	14 234	13 671	85,3	97,5	75,6	83,9	98,3	72,8
Lungenentzündung (532, 534, 539)	5 594	2 768	2 826	3 754	1 857	1 897	17,1	19,2	15,4	11,3	12,8	10,1
Grippe (521, 522)	4 649	2 083	2 566	491	202	289	14,2	14,5	14,0	1,5	1,4	1,5
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) ..	4 701	3 039	1 662	3 682	2 416	1 266	14,4	21,1	9,1	11,1	16,7	6,7
Alterschwäche (891, 892)	3 895	1 616	2 279	3 351	1 381	1 970	11,9	11,2	12,4	10,1	9,5	10,5
darunter:												
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen (892)	325	142	183	239	101	138	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
Unfälle insgesamt (901-969)	3 129	1 900	1 229	3 288	1 995	1 293	9,6	13,2	6,7	9,9	13,8	6,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	877	618	259	1 024	719	305	2,7	4,3	1,4	3,1	5,0	1,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2 327	1 475	852	2 081	1 362	719	7,1	10,3	4,7	6,3	9,4	3,8
Selbstmord (970-979)	1 134	758	376	1 083	701	382	3,5	5,3	2,1	3,3	4,8	2,0
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	549	279	270	491	249	242	1,7	1,9	1,5	1,5	1,7	1,3
Alle übrigen Todesursachen	23 468	12 446	11 022	22 242	11 939	10 303	71,8	86,5	60,2	66,9	82,5	54,9
Gesamtbese insgesamt (000-999)	141 192	70 790	70 402	132 419	66 457	65 962	431,8	492,1	384,5	398,1	459,0	351,2

Im Alter von 75 Jahren und älteren Personen

Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	85 120	38 013	47 107	89 180	39 563	49 617	579,2	582,3	576,9	584,1	586,4	582,3
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	38 341	17 168	21 173	38 818	17 399	21 419	260,9	263,0	259,3	254,3	257,9	251,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	36 620	16 132	20 488	39 273	17 112	22 161	245,2	247,4	250,6	257,2	253,6	260,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	10 136	4 688	5 448	11 042	5 038	6 004	69,0	71,8	66,7	72,3	74,7	70,5
Akut. tieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	23	5	18	47	14	33	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4
Alterschwäche (891, 892)	31 780	13 197	18 583	29 261	12 116	17 145	216,3	202,2	227,6	191,7	179,6	201,2
darunter:												
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen (892)	1 016	407	609	761	299	462	6,9	6,2	7,5	5,0	4,4	5,4
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	21 207	10 604	10 603	22 051	10 977	11 074	144,3	162,4	129,8	144,4	162,7	130,0
Lungenentzündung (532, 534, 539)	10 260	4 954	5 306	7 627	3 385	4 042	69,8	75,9	65,0	50,0	53,1	47,4
Grippe (521, 522)	8 619	3 877	4 742	1 149	492	657	58,7	59,4	58,1	7,5	7,3	7,7
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) ..	7 493	3 943	3 550	5 622	3 098	2 524	51,0	60,4	43,5	36,8	45,9	29,6
Unfälle insgesamt (901-969)	4 908	2 200	2 708	5 308	2 247	3 061	33,4	33,7	33,2	34,8	33,3	35,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	714	504	210	718	484	234	4,9	7,7	2,6	4,7	7,2	2,7
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 167	674	493	1 083	618	465	7,9	10,3	6,0	7,1	9,2	5,5
Selbstmord (970-979)	654	500	154	650	467	183	4,5	7,7	1,9	4,3	6,9	2,1
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	250	152	138	298	141	157	2,0	2,3	1,7	2,0	2,1	1,8
Alle übrigen Todesursachen	21 608	12 220	9 388	21 116	11 876	9 240	147,0	187,2	115,0	138,3	176,0	108,4
Gesamtbese insgesamt (000-999)	193 106	90 334	102 772	183 345	85 180	98 165	1 314,1	1 383,8	1 258,5	1 200,9	1 262,5	1 152,0

**Die Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet
von 1950 bis 1954 nach wichtigsten Todesursachen**

Todesursache u. Nummern des deutschen ausführli- chen Verzeichnisses 1950	1953	1954	1938 ¹⁾	1950	1951	1952	1953	1954	1938 ¹⁾	1950	1951	1952	1953	1954
	Grundzahlen		Sterbeziffern bezogen auf 10 000 der Bevölkerung						Standardisierte Sterbeziffern bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung 1952					
männlich														
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- krankheiten (371, 372, 421-498)	92 016	94 680	29,6	33,8	36,3	38,4	38,1	40,6	37,1	35,1	36,9	38,4	39,4	39,7
davon:														
Herzkrankheiten (421-462)	43 408	50 867	15,0	17,5	18,6	20,1	21,5	21,8	18,8	18,1	18,9	20,1	21,2	21,4
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (Gehirnblutung) (371)	30 592	31 418	9,8	11,6	12,4	12,8	13,3	13,5	12,0	12,0	12,6	12,8	13,1	13,2
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 463-498)	12 016	12 395	4,8	4,7	5,3	5,5	5,2	5,3	6,3	5,5	5,4	5,5	5,1	5,1
Krebs und andere bösartige Neu- bildungen (201-249)	41 104	42 594	13,8	16,8	17,5	17,8	17,9	18,3	16,0	17,2	17,7	17,8	17,7	18,0
Alterschwäche (891, IV.892)	14 813	13 497	8,2	6,5	6,1	6,4	6,4	5,8	11,4	7,0	6,3	6,4	6,2	5,4
Unfälle insgesamt (901-969)	18 843	18 845	7,5	6,9	7,5	7,4	8,2	8,1	7,7	7,0	7,5	7,4	8,1	8,0
darunter:														
Kraftfahrzeugunfälle (901)	7 739	8 390	.	2,1	2,6	2,5	3,4	3,6	.	2,1	2,7	2,5	3,4	3,6
Lungenentzündung (531-539,844)	11 992	9 359	9,5	5,1	5,3	4,5	5,4	4,0	10,3	5,3	5,4	4,5	5,4	3,9
Tuberkulose insgesamt (000-039)	6 904	6 706	7,0	5,2	4,9	3,6	3,0	2,9	7,0	5,2	4,9	3,6	3,0	2,8
darunter:														
der Atmungsorgane (000-010)	6 173	6 071	6,1	4,5	4,3	3,2	2,7	2,6	6,1	4,5	4,3	3,2	2,7	2,6
Selbstmord (970-979)	5 904	6 191	4,0	2,7	2,5	2,4	2,6	2,7	4,2	2,8	2,5	2,4	2,6	2,6
Alle übrigen Todesursachen	84 794	73 793	42,9	34,9	34,9	33,5	38,5	31,7	43,4	35,2	35,4	33,5	36,6	31,4
Sterbefälle insgesamt	276 370	265 665	122,5	111,9	115,0	114,0	120,1	114,1	137,1	114,8	116,6	114,0	119,0	111,8
weiblich														
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- krankheiten (371, 372, 421-498)	100 211	103 176	31,4	34,8	35,4	36,9	38,5	39,3	37,4	35,6	36,4	36,9	37,7	37,5
davon:														
Herzkrankheiten (421-462)	48 644	48 909	16,3	16,3	16,8	17,3	18,7	18,6	19,1	17,1	17,2	17,3	18,3	17,8
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (Gehirnblutung) (371)	38 286	40 209	10,4	12,7	13,4	14,1	14,7	15,3	12,5	13,4	13,8	14,1	14,4	14,6
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 463-498)	13 281	14 058	4,7	5,8	5,2	5,5	5,1	5,4	5,8	5,1	5,4	5,5	5,0	5,1
Krebs und andere bösartige Neu- bildungen (201-249)	45 006	45 482	15,5	17,1	17,2	17,5	17,3	17,3	17,8	17,8	17,5	17,5	17,0	16,8
Alterschwäche (891, IV.892)	20 862	19 115	11,5	8,5	7,9	8,1	8,0	7,3	14,1	9,1	8,2	8,1	7,7	6,8
Unfälle insgesamt (901-969)	7 417	7 652	2,6	2,3	2,6	2,6	2,9	2,9	2,8	2,4	2,6	2,6	2,8	2,8
darunter:														
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 896	2 020	.	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	.	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
Lungenentzündung (531-539,844)	12 049	8 961	7,3	4,5	4,5	3,8	4,6	3,4	7,8	4,6	4,6	3,8	4,6	3,3
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3 690	3 404	5,5	2,9	2,7	1,9	1,4	1,3	5,5	2,9	2,7	1,9	1,4	1,3
darunter:														
der Atmungsorgane (000-010)	2 954	2 772	4,6	2,2	2,1	1,5	1,1	1,1	4,6	2,2	2,1	1,5	1,1	1,0
Selbstmord (970-979)	3 026	3 371	1,7	1,2	1,2	1,1	1,2	1,3	1,8	1,2	1,2	1,1	1,2	1,3
Alle übrigen Todesursachen	70 503	58 738	38,5	24,8	25,6	24,2	27,3	22,5	35,8	26,5	19,0	27,3	26,8	21,7
Sterbefälle insgesamt	262 764	249 899	114,0	96,1	97,1	96,1	101,2	95,3	123,0	100,1	92,2	96,1	99,2	91,5
insgesamt														
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- krankheiten (371, 372, 421-498)	192 227	197 856	31,0	35,8	35,8	37,8	39,3	40,0	37,1	35,3	36,6	37,8	38,5	37,7
davon:														
Herzkrankheiten (421-462)	98 052	99 776	16,1	16,8	17,6	18,7	20,0	20,2	18,9	17,5	18,0	18,7	19,7	19,1
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (Gehirnblutung) (371)	68 878	71 627	10,1	12,2	12,9	13,5	14,1	14,5	12,2	12,8	13,2	13,5	13,8	13,6
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 463-498)	25 297	26 453	4,8	4,8	5,3	5,6	5,2	5,3	6,0	5,0	5,4	5,5	5,0	5,0
Krebs und andere bösartige Neu- bildungen (201-249)	86 110	88 076	14,7	17,0	17,3	17,7	17,6	17,8	17,0	17,5	17,6	17,7	17,4	17,0
Alterschwäche (891, IV.892)	35 697	32 642	9,9	7,5	7,1	7,4	7,3	6,6	12,8	8,1	7,3	7,4	7,0	6,0
Unfälle insgesamt (901-969)	26 260	26 497	5,0	4,5	4,9	4,9	5,4	5,4	5,1	4,5	4,9	4,9	5,3	5,1
darunter:														
Kraftfahrzeugunfälle (901)	9 635	10 410	.	1,2	1,5	1,5	2,0	2,1	.	1,2	1,5	1,5	2,0	2,0
Lungenentzündung (531-539,844)	24 524	18 320	8,4	4,8	4,9	4,2	5,0	3,7	9,0	4,9	4,9	4,2	4,9	3,5
Tuberkulose insgesamt (000-039)	10 594	10 110	6,2	3,9	3,7	2,7	2,2	2,0	6,2	4,0	3,7	2,7	2,1	2,0
darunter:														
der Atmungsorgane (000-010)	9 127	8 843	5,3	3,3	3,1	2,3	1,9	1,8	5,3	3,3	3,1	2,3	1,9	1,7
Selbstmord (970-979)	8 930	9 562	2,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	2,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9
Alle übrigen Todesursachen	154 792	132 501	38,6	30,1	30,0	28,3	31,5	26,7	39,5	30,8	30,5	28,3	31,5	25,7
Sterbefälle insgesamt	539 134	515 564	116,6	103,5	105,5	104,8	110,1	104,1	129,6	107,0	107,3	104,8	108,5	98,9

1) Reichsgebiet.

**Die Sterblichkeit der Säuglinge im Reichsgebiet 1938 *) und im Bundesgebiet 1953 und 1954
nach wichtigsten Todesursachen**

Todesursache und Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	1954										1953		1938			
	Alter der gestorbenen Säuglinge															
	davon										unter 1 Jahr					
	unter 1 Jahr		unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		unter 1 Jahr		unter 7 Tage bis unter 1 Jahr		Anzahl	vH	auf 10 000 Lebend- geborene	Anzahl	vH	auf 10 000 Lebend- geborene
	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH	auf 10 000 Lebendgeborene									

männlich

Frühgeburt (852)	5 563	29,2	5 151	46,5	412	5,1	138,3	128,1	10,2	5 823	29,0	148,8	9 101	19,4	130,7
Angeborene Lebensschwäche (851)	1 511	7,9	1 315	11,9	196	2,4	37,6	32,7	4,9	1 652	8,2	42,2	7 488	16,0	107,6
Angeborene Mißbildungen (831-839)	2 077	10,9	897	8,1	1 180	14,7	51,6	22,3	29,3	1 983	9,9	50,7	2 655	5,7	38,1
Entbindungsfolgen (841)	1 783	9,3	1 619	14,6	164	2,0	44,3	40,3	4,1	1 599	8,0	40,9	3 125	6,7	44,9
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	2 138	11,2	180	1,6	1 958	24,4	53,2	4,5	48,7	2 455	12,2	62,7	6 602	14,1	94,8
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	365	1,9	14	0,1	351	4,4	9,1	0,3	8,7	467	2,3	11,9	2 565	5,5	36,8
Magen- und Darmkrankh. (661, 843)	311	1,6	7	0,1	304	3,8	7,7	0,2	7,6	451	2,2	11,5	5 548	11,8	79,7
Alle übrigen Todesursachen	5 336	28,0	1 892	17,1	3 444	43,0	132,7	47,0	85,6	5 631	28,1	143,9	9 765	20,8	140,3
Gestorbene insgesamt	19 084	100	11 075	100	8 009	100	474,5	275,4	199,1	20 061	100	512,5	46 849	100	673,0

weiblich

Frühgeburt (852)	4 279	30,0	3 914	47,6	365	6,0	113,3	103,7	9,7	4 455	29,6	120,9	7 042	20,9	107,9
Angeborene Lebensschwäche (851)	1 136	8,0	976	11,9	160	2,6	30,1	25,8	4,2	1 208	8,0	32,8	5 488	16,3	84,1
Angeborene Mißbildungen (831-839)	1 762	12,3	776	9,4	986	16,3	46,7	20,6	26,1	1 815	12,1	49,3	2 083	6,2	31,9
Entbindungsfolgen (841)	1 132	7,9	1 020	12,4	112	1,9	30,0	27,0	3,0	996	6,6	27,0	1 938	5,7	29,7
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	1 676	11,7	115	1,4	1 561	25,8	44,4	3,0	41,3	2 014	13,4	54,7	4 652	13,8	71,1
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	294	2,1	7	0,1	287	4,7	7,8	0,2	7,6	439	2,9	11,9	2 220	6,6	34,8
Magen- und Darmkrankh. (661, 843)	244	1,7	4	0,05	240	4,0	6,5	0,1	6,4	317	2,1	8,6	3 635	10,8	55,7
Alle übrigen Todesursachen	3 746	26,3	1 414	17,2	2 332	38,6	99,2	37,4	61,8	3 789	25,2	102,9	6 709	19,9	102,8
Gestorbene insgesamt	14 269	100	8 226	100	6 043	100	377,9	277,8	160,0	15 033	100	406,1	33 767	100	577,4

insgesamt

Frühgeburt (852)	9 842	29,5	9 065	47,0	777	5,5	126,2	116,2	10,0	10 278	29,3	135,3	16 143	20,0	119,7
Angeborene Lebensschwäche (851)	2 647	7,9	2 291	11,9	356	2,5	33,9	29,4	4,6	2 860	8,1	37,6	12 976	16,1	96,2
Angeborene Mißbildungen (831-839)	3 839	11,5	1 673	8,7	2 166	15,4	49,2	21,5	27,8	3 798	10,8	50,0	4 738	5,9	35,1
Entbindungsfolgen (841)	2 915	8,7	2 639	13,7	276	2,0	37,4	33,8	3,5	2 595	7,4	34,2	5 063	6,3	37,5
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	3 814	14,4	295	1,5	3 519	25,0	48,9	3,8	45,1	4 469	12,7	58,8	11 254	14,0	83,5
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	659	2,0	21	0,1	638	4,5	8,4	0,3	8,2	906	2,6	11,9	4 785	5,9	35,5
Magen- und Darmkrankh. (661, 843)	555	1,7	11	0,1	544	3,9	7,1	0,1	7,0	768	2,2	10,1	9 183	11,4	68,1
Alle übrigen Todesursachen	9 082	27,2	3 306	17,1	5 776	41,1	116,5	42,4	74,1	9 420	26,8	124,0	16 474	20,4	122,2
Gestorbene insgesamt	33 353	100	19 301	100	14 052	100	427,7	247,5	180,2	35 094	100	461,9	80 616	100	597,8

*) Gebietsstand 31. 12. 1937.

**Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet 1949 - 1954
nach Todesursachen**

Todesursache	Pos. Nr. inter- nationales Ver- zeichnis 1938	Pos. Nr. deutsches ausführl. Ver- zeichnis 1950	1949		1950		1951		1952		1953		1954	
			Anzahl	auf 10 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 10 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 10 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 10 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 10 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 10 000 Lebend- geborene
Fehlgeburt ohne Infektion	141	761, 763	155	2,0	131	1,7	111	1,5	109	1,4	90	1,2	71	0,9
Fehlgeburt mit Infektion	140	762	318	4,0	204	2,6	156	2,1	110	1,4	101	1,3	99	1,3
Schwangerschaft am unrechten Ort	142	755	135	1,7	112	1,4	103	1,4	104	1,4	97	1,3	99	1,3
Schwangerschaftsintoxikosen	144	752, 753	161	2,0	197	2,5	166	2,2	174	2,3	179	2,4	114	1,5
Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	143, 145	754, 759	41	0,5	67	0,9	62	0,8	100	1,3	97	1,3	88	1,1
Blutungen bei Entbindung und im Wochenbett	146	774, 775	147	1,9	144	1,9	131	1,7	167	2,2	160	2,1	166	2,1
Kindbettfieber (einschl. Infektion während der Schwangerschaft)	147	751, 770, 771, 777	227	2,9	222	2,9	231	3,0	217	2,8	186	2,4	164	2,1
Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	148	772, 773	107	1,3	118	1,5	123	1,6	107	1,4	88	1,2	93	1,2
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	149, 150	776, 778, 779	312	3,9	399	5,2	315	4,2	352	4,6	280	3,7	290	3,7
insgesamt	140-150	751-779	1 603	20,2	1 594	20,6	1 398	18,4	1 440	18,9	1 278	16,8	1 184	15,2

Die Sterbefälle an Tuberkulose im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954 nach Altersgruppen und Geschlecht

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren	Grundzahlen										Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung									
	männlich					weiblich					männlich					weiblich				
	1933	1938	1949	1953	1954	1933	1938	1949	1953	1954	1933	1938	1949	1953	1954	1933	1938	1949	1953	1954
0 - 1	419	382	146	53	45	371	271	123	46	39	8,5	5,5	3,6	1,4	1,1	8,0	4,2	3,2	1,2	1,0
1 - 5	929	842	360	119	101	863	702	310	117	89	4,7	3,5	2,8	0,8	0,7	4,6	3,1	2,5	0,8	0,6
5 - 10	497	382	171	36	23	501	366	186	22	25	1,8	1,6	0,8	0,2	0,1	1,9	1,6	1,0	0,1	0,2
10 - 15	335	305	140	28	26	578	486	185	28	30	1,2	1,1	0,7	0,1	0,1	2,1	1,8	0,9	0,1	0,2
15 - 20	1 014	1 019	371	54	51	1 449	1 390	489	73	69	4,9	3,3	2,1	0,3	0,2	7,2	4,5	2,9	0,4	0,3
20 - 25	2 447	1 515	1 045	136	104	2 983	1 734	843	143	128	8,0	7,6	6,3	0,8	0,6	9,7	9,0	4,6	0,8	0,8
25 - 30	2 790	2 344	1 120	244	229	2 995	2 637	912	216	211	9,1	7,5	7,6	1,5	1,3	9,7	8,6	4,5	1,1	1,1
30 - 35	2 833	2 372	614	273	266	2 484	2 137	529	233	265	9,9	7,5	6,1	1,9	1,8	8,5	6,9	3,8	1,2	1,3
35 - 40	2 164	2 542	1 024	266	204	2 062	1 770	727	165	164	9,8	8,8	6,3	2,3	2,0	7,7	6,1	3,5	1,1	1,2
40 - 45	1 899	2 051	1 175	415	419	1 428	1 370	654	252	247	9,9	9,2	6,7	2,5	2,5	6,0	5,1	3,1	1,2	1,2
45 - 50	1 938	1 783	1 473	642	638	1 225	1 082	587	253	233	10,6	9,5	8,6	3,6	3,6	5,7	4,6	3,1	1,2	1,1
50 - 55	2 075	1 754	1 400	980	921	1 120	898	582	221	219	12,2	9,9	10,7	5,4	5,5	5,9	4,3	3,5	1,2	1,2
55 - 60	1 961	1 914	1 228	790	918	1 188	990	573	255	228	12,0	12,0	11,7	6,6	7,2	6,8	5,5	4,1	1,6	1,4
60 - 65	1 557	1 804	1 197	819	781	1 086	1 101	656	321	273	12,2	12,1	12,9	8,5	8,0	8,0	6,7	5,6	2,5	2,0
65 - 70	1 154	1 229	1 086	827	714	957	948	686	426	325	12,1	11,2	13,8	10,2	8,7	9,0	7,8	7,3	4,1	3,0
70 und älter unbekannt	1 137	1 270	1 492	1 322	1 266	1 236	1 315	1 233	919	859	9,9	9,2	13,0	10,3	9,7	8,4	7,7	8,9	5,7	5,2
insgesamt	25 150	23 509	14 044	6 904	6 706	22 526	19 188	9 280	3 690	3 404	7,9	6,9	6,4	3,0	2,9	6,7	5,4	3,7	1,4	1,3
Tuberkulose der Atmungsorgane	21 446	20 336	12 125	6 173	6 071	18 830	16 140	7 424	2 954	2 772	6,8	6,0	5,5	2,7	2,6	5,6	4,6	3,0	1,1	1,1

1) Deutsches Verzeichnis 1950 Sterbefälle an Tuberkulose insgesamt Pos.Nr. 000 - 039; Tuberkulose der Atmungsorgane Pos.Nr. 000 - 010.

Die Unfallsterbefälle im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954 nach Altersgruppen und Geschlecht

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren	Grundzahlen										Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung									
	männlich					weiblich					männlich					weiblich				
	1933	1938	1949	1953	1954	1933	1938	1949	1953	1954	1933	1938	1949	1953	1954	1933	1938	1949	1953	1954
0 - 1	177	391	290	250	204	146	237	217	164	178	3,6	5,5	7,1	6,4	5,1	3,1	3,6	5,7	4,5	4,7
1 - 5	1 177	1 487	1 017	939	813	759	900	703	520	492	6,0	6,2	7,9	6,3	5,4	4,0	3,9	5,7	3,7	3,5
5 - 10	800	777	838	562	558	350	330	366	262	238	3,0	3,2	4,1	3,4	3,4	1,3	1,4	1,9	1,7	1,5
10 - 15	654	664	582	538	484	154	184	211	156	144	2,2	2,4	3,2	2,5	2,7	0,9	0,7	1,0	0,8	0,7
15 - 20	968	1 446	1 020	1 385	1 376	176	246	171	266	227	4,7	4,7	5,9	6,8	6,4	0,9	0,8	1,0	1,4	1,1
20 - 25	1 575	2 283	1 128	2 154	2 143	232	225	183	231	204	5,1	11,5	6,7	12,0	12,0	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2
25 - 30	1 496	2 573	893	1 434	1 468	198	226	178	158	161	4,9	8,2	6,1	8,8	8,5	0,6	0,7	0,9	0,8	0,9
30 - 35	1 287	2 125	616	980	1 050	189	241	122	164	167	4,5	6,7	6,1	6,8	6,9	0,6	0,8	0,9	0,9	0,8
35 - 40	917	1 804	944	770	655	155	210	161	150	105	4,2	6,2	5,8	6,8	6,3	0,6	0,7	0,8	1,0	0,7
40 - 45	897	1 333	1 134	1 168	1 157	162	262	195	238	234	4,7	6,0	6,5	7,0	7,0	0,7	1,0	0,9	1,1	1,1
45 - 50	871	1 280	1 240	1 294	1 295	205	217	209	244	240	4,7	6,8	7,3	7,3	7,3	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2
50 - 55	890	1 314	886	1 278	1 377	231	289	218	278	246	5,2	7,4	6,7	7,9	8,2	1,2	1,4	1,3	1,5	1,3
55 - 60	1 032	1 418	827	982	1 066	277	369	215	302	290	6,3	8,9	7,9	8,2	8,4	1,6	2,0	1,5	1,9	1,8
60 - 65	890	1 367	843	1 009	957	317	510	283	347	372	7,0	9,2	9,1	10,5	9,8	2,3	3,1	2,4	2,7	2,6
65 - 70	732	1 219	805	883	954	401	589	346	474	560	7,7	11,1	10,3	10,9	11,7	3,8	4,9	3,6	4,5	5,2
70 und älter unbekannt	1 616	2 924	2 145	3 199	3 279	2 273	3 764	2 287	3 460	3 791	14,0	21,1	18,7	25,0	25,1	15,5	22,1	16,5	21,6	29,1
insgesamt	15 966	24 415	15 343	18 843	18 845	6 226	8 803	6 075	7 417	7 652	5,0	7,2	7,0	8,2	8,1	1,9	2,5	2,4	2,9	2,9
Strassenverkehrs-unfälle	5 301	4 486	8 873	9 433	1 292	1 420	2 232	2 297	1,7	2,0	3,9	4,1	0,4	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

1) Deutsches Verzeichnis 1950 Unfälle insgesamt Pos.Nr. 901-969; Strassenverkehrs-unfälle Pos.Nr. 901, 912, 919

