


STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/91

Erschienen am 18. Juli 1957



Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse
J u n i 1 9 5 7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über Gemüseberichterstattung unter Nr. C/II/2

(6369)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

27. FEB. 1957



2643

In der Berichtszeit vom 20. Mai bis 20. Juni war die Witterung anfänglich durch Kälte, im weiteren Verlauf durch verbreitete Trockenheit und in ihrer letzten Woche durch eine Hitzeperiode gekennzeichnet. Etwas mehr als die Hälfte der Berichterstatter bezeichnete die Niederschläge als zu gering. Ein ungefähr gleicher Anteil hatte im selben Monat des Vorjahres die Niederschläge als zu hoch beurteilt. In den einzelnen Teilen des Bundesgebietes treten recht erhebliche Unterschiede auf. Beim Temperaturverlauf ist der Anteil der Beurteilung "normal" etwas größer, hält sich aber auch nur etwas über der Hälfte. Ein Viertel bis ein Fünftel der Berichterstatter bezeichneten die Witterung als zu kalt bzw. zu warm. Danach sind diese Wachstumsfaktoren viel günstiger wie vor einem Jahr, als drei Viertel der Berichterstatter den Temperaturverlauf als zu kalt und das restliche Viertel ihn als normal bezeichneten.

Beurteilung der Witterung von Ende Juni 1957
in vH der Meldungen

L a n d	Niederschläge				Temperaturverlauf			
	Zahl der Mel- dungen	zu gering	aus- rei- chend	zu hoch	Zahl der Mel- dungen	zu warm	nor- mal	zu kalt
		vH				vH		
Schleswig-Holstein	94	24	70	6	91	10	61	29
Hamburg	30	50	50	-	30	27	57	16
Niedersachsen	546	57	43	-	537	30	57	13
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	259	54	46	-	256	29	71	-
Hessen	167	87	13	-	167	31	42	27
Rheinland-Pfalz	203	79	20	1	196	29	43	28
Baden-Württemberg	294	33	62	5	286	10	62	28
Bayern	189	35	55	10	189	18	60	22
Bundesgebiet 1957	1 782	54	44	2	1 752	24	57	19
" 1956	1 827	7	42	51	1 823	1	25	74

Von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen sind auch nach der Juniberichterstattung wie nach der Maimeldung die Blattläuse in größerem Umfange aufgetreten als irgend ein anderer Schädling. Sie wurden von 28 vH der Berichterstatter hervorgehoben. Auch für die Wühlmäuse liegt der Anteil mit fast einem Fünftel sehr hoch. Außerdem wurde von 10 und mehr vH der Berichterstatter ein stärkeres Auftreten von Bohnenblattläusen, Kohlfliegen und Erdflöhen gemeldet.

Besonders starkes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen

L a n d	Zahl der Meldungen	Blatt- läuse	Wühl- mäuse	Bohnen- blatt- läuse	Kohl- fliegen	Erd- flöhe	Rüben- blatt- wespen	Zwiebel- fliegen	Mehl- tau
		vH							
Schleswig-Holstein	99	10	5	2	14	14	2	2	5
Hamburg	30	43	23	23	27	33	13	23	17
Niedersachsen	585	15	12	4	10	6	8	5	3
Nordrhein-Westfalen	282	55	14	36	17	14	18	11	8
Hessen	294	18	12	7	6	6	6	4	4
Rheinland-Pfalz	219	35	28	16	9	9	12	10	8
Baden-Württemberg	321	31	22	14	14	10	1	2	4
Bayern	201	37	36	12	29	23	4	11	9
<u>Bundesgebiet</u>	2 031	28	18	13	13	10	8	6	5

Nach der Berichterstattung von Ende Juni ist der Wachstumsstand bei Blumenkohl und Kopfsalat, Späten Möhren, Gurken und Tomaten für das Bundesgebiet mit Noten zwischen 2,5 und 2,8 mit großer Einheitlichkeit beurteilt. Die gebietlichen Unterschiede sind verhältnismäßig gering. Ebenso sind die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr meist wenig erheblich. Die beste Bewertung fand der Kopfsalat mit 2,5. Die verhältnismäßig ungünstigste Beurteilung zeigen die Gurken mit 2,8 im **Durchschnitt** des Bundesgebietes. Noch ungünstiger wird der Stand in Rheinland-Pfalz mit 3,3 und Saarland mit 3,2 beurteilt.

Die endgültigen Schätzungen der Hektarerträge ergeben beim Frühlkohlrabi mit 164,7 dz und beim Frühjahrskopfsalat mit 153,4 dz sehr beachtliche Zunahmen gegenüber den vorläufigen Schätzungen vom Mai mit 150,8 dz bzw. 143,1 dz. Damit werden nicht nur die Ergebnisse von 1956 sondern auch die Durchschnitte 1951/55 mit 156,9 bzw. 151,5 übertroffen. Bei Spargel und Rhabarber sind keine nennenswerten Änderungen im Vergleich mit den Vorschätzungen eingetreten. Somit bestätigt sich für den Spargel die günstige, für den Rhabarber die unterdurchschnittliche Ertragslage.

Die Angaben über die Erntemengen sind noch als vorläufig anzusehen, da die tatsächlichen Anbauflächen noch nicht bekannt sind. Jedoch kann nach den neuen Ertragsschätzungen beim Frühblumenkohl, Frühjahrskopfsalat und Spargel eine überdurchschnittliche und das vorjährige Ergebnis übertreffende Erntemenge als sicher angenommen werden. Ebenso ist beim Rhabarber 1957 eine geringere Erntemenge als im Vorjahr und als im fünfjährigen Durchschnitt anzunehmen.

Wachstumstand des

(Begutachtung

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit (Juni)	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1957	2,4	2,5	2,4
2	" "	1956	2,6	2,5	2,7
3	Hamburg	1957	2,8	2,6	2,8
4	"	1956	2,9	2,8	3,0
5	Niedersachsen	1957	2,8	2,5	2,8
6	"	1956	2,7	2,5	2,7
7	Bremen	1957	.	.	.
8	"	1956	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1957	2,6	2,6	2,6
10	" "	1956	2,3	2,4	2,4
11	Hessen	1957	2,8	2,5	2,6
12	"	1956	2,4	2,4	2,5
13	Rheinland-Pfalz	1957	2,6	2,7	2,6
14	" "	1956	2,6	2,4	2,5
15	Baden-Württemberg	1957	2,4	2,4	2,4
16	" "	1956	2,4	2,3	2,4
17	Bayern	1957	2,7	2,5	2,5
18	"	1956	2,6	2,4	2,7
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	2,6	2,5	2,6
20	"	1956	2,5	2,4	2,6
21	Saarland	1957	2,9	2,4	2,3
22	"	1956	.	.	.
23	Berlin (West)	1957	3,2	2,9	3,1
24	" "	1956	2,8	2,8	2,8

Gemüses im Juni 1957

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Steckzwiebeln	Stangenbohnen	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
4	5	6	7	8	
2,3	2,4	2,7	2,8	3,1	1
2,9	2,3	2,6	2,7	2,5	2
3,0	2,6	3,0	3,0	2,9	3
2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	4
2,7	2,6	2,7	2,9	2,8	5
2,8	2,6	3,0	3,2	3,0	6
.	7
.	8
2,5	2,4	2,7	2,8	2,5	9
2,4	2,5	3,0	3,4	2,9	10
2,6	2,3	2,7	2,9	2,5	11
2,7	2,5	2,6	3,1	2,6	12
2,8	3,0	2,7	3,3	2,8	13
2,8	2,4	2,5	3,0	2,7	14
2,4	2,3	2,7	2,9	2,6	15
2,5	2,3	2,6	2,8	2,6	16
2,6	2,5	3,0	2,2	2,9	17
2,6	2,4	2,9	3,2	3,0	18
2,6	2,6	2,7	2,8	2,7	19
2,6	2,4	2,9	3,1	2,8	20
2,8	2,4	2,8	3,2	2,7	21
.	22
2,5	2,5	2,3	3,5	2,9	23
2,3	2,7	3,4	3,9	3,1	24

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1957	14	126,1	1 766	18	132,1	2 378
2	"	1956	17	147,0	2 493	19	112,4	2 138
3	Hamburg	1957	68	179,1	12 182	111	164,8	18 295
4	"	1956	57	182,1	10 380	98	151,7	14 867
5	Niedersachsen	1957	119	151,6	18 050	108	137,2	14 779
6	"	1956	82	131,7	10 812	83	124,5	10 343
7	Bremen	1957	6	128,0	768	6	147,4	884
8	"	1956	6	184,8	1 109	6	219,4	1 316
9	Nordrhein-Westf.	1957	437	178,2	77 881	492	153,4	75 466
10	"	1956	315	166,8	52 548	503	158,1	79 514
11	Hessen	1957	46	214,7	9 874	104	183,6	19 094
12	"	1956	36	178 0	6 407	87	160,2	13 936
13	Rheinland-Pfalz	1957	43	121,0	5 202	81	107,4	8 701
14	"	1956	29	100,2	2 907	68	98,1	6 668
15	Baden-Württembg.	1957	86	193,0	16 502	222	182,9	40 648
16	"	1956	74	189,9	13 993	189	195,4	37 024
17	Bayern	1957	165	120,4	19 870	277	135,1	37 415
18	"	1956	145	114,5	16 596	238	120,9	28 780
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	984	164,7	162 095	1 419	153,4	217 660
20	"	1956	761	154,1	117 245	1 291	150,7	194 586
21	" ∅	1951/55	668	156,9	104 807	1 319	151,5	199 826
22	Saarland	1957	8	86,8	705	10	98,4	951
23	"	1956	8	125,4	1 045	10	99,7	963
24	Berlin (West)	1957	47	55,8	7 308	28	117,1	3 265
25	"	1956	38	163,2	6 157	22	154,5	3 371

1) 1957 vorläufige Flächenangaben;

Gemüse im Juni 1957

Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	
88	22,3	1 951	55	185,3	10 162	1
88	22,4	1 963	55	228,8	12 547	2
3	23,0	69	127	225,0	28 571	3
3	18,8	56	127	246,4	31 293	4
1 152	29,6	34 121	57	210,1	11 976	5
1 024	27,7	28 352	57	226,1	12 885	6
0	.	.	4	273,2	1 093	7
0	.	.	4	270,9	1 084	8
175	28,6	5 000	129	233,9	30 175	9
227	30,0	6 801	138	263,1	36 302	10
1 117	28,2	31 529	23	277,3	6 378	11
1 067	30,4	32 402	21	280,0	5 881	12
361	36,7	13 262	19	179,4	3 409	13
338	33,8	11 425	19	151,4	2 876	14
727	32,6	23 724	72	267,3	19 190	15
757	29,8	22 532	72	277,1	19 893	16
103	30,7	3 165	51	207,0	12 626	17
144	29,9	4 308	61	224,7	13 706	18
3 726	30,3	112 821	547	225,9	123 580	19
3 648	29,6	107 839	554	246,3	136 467	20
2 693	27,5	74 145	638	261,3	166 720	21
7	28,0	196	1	215,0	288	22
.	.	.	1	252,1	338	23
4	19,6	75	8	225,3	1 728	24
2	26,0	60	8	229,5	1 758	25

Ernteschätzungen von Gemüse in den Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Früh- kohl- rabi	Früh- jahrs- kopf- salat	Spar- gel	Rha- bar- ber
		dz je ha			
KrfSt. Düsseldorf	(NrhW)	205,0	172,5	-	-
Landkr. Bonn	"	189,4	148,7	-	232,9
" Geldern	"	161,7	176,7	28,9	-
" Kempen-Krefeld	"	-	-	21,1	-
" Recklinghausen	"	-	-	-	282,1
" Siegkreis	"	-	-	-	269,6
KrfSt. Frankfurt	(Hess.)	296,0	259,0	-	397,0
" Wiesbaden	"	145,0	150,0	-	-
Landkr. Groß-Gerau	"	-	-	-	92,0
" Bergstraße	"	-	-	27,0	-
" Darmstadt	"	-	-	30,0	-
Landkr. u. KrfSt. Mainz	(RhPf)	131,7	97,6	35,7	210,0
" " Koblenz	"	112,0	122,5	-	-
" " Worms	"	-	-	36,6	-
" " Speyer	"	-	103,6	35,3	-
" " Neustadt	"	-	-	34,4	180,0
" " Frankenthal	"	112,9	101,3	31,4	-
" " Ludwigshafen	"	143,8	100,8	-	-
Landkr. Germersheim	"	-	117,0	36,4	-
" Bingen	"	-	-	42,6	-
Oberes Neckartal und Remstal	(BaWü)	-	180,1	-	298,9
Unteres Rheintal	"	-	152,1	32,6	-
Konstanz m. Insel Reichenau	"	-	261,1	-	-
KrfSt. München	(Bay)	119,0	109,0	-	-
" Bamberg	"	-	250,0	-	-
" Augsburg	"	-	-	-	190,0
Landkr. Kitzingen	"	152,0	-	30,0	-
" Schrobenhausen	"	-	-	29,0	-