

STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

ZG 43

Arb. Nr. III/5/123

Erschienen am 17. Juli 1959



Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse

Juni 1959

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über Gemüseberichterstattung unter Nr. C/II/2

In der Zeit von 21. Mai bis 20. Juni 1959 bot die Witterung infolge der allgemeinen Trockenheit der Entwicklung der Gemüsekulturen keine günstigen Voraussetzungen. Im Durchschnitt des Bundesgebietes (ohne Saarland und Berlin) beurteilten 50 vH der Berichterstatter die Niederschläge als zu gering und 39 vH die Temperaturen als zu hoch.

Besonders in Schleswig-Holstein und Hamburg, aber auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wurden stellenweise Dürreschäden von einer großen Zahl von Berichterstattern gemeldet.

Beurteilung der Witterung Juni 1959
in vH der Meldungen

L a n d	Niederschläge				Temperaturverlauf			
	Zahl der Mel- dungen	zu gering	aus- rei- chend	zu hoch	Zahl der Mel- dungen	zu warm	nor- mal	zu kalt
		vH				vH		
Schleswig-Holstein.	105	99	1	-	103	24	62	14
Hamburg	31	100	-	-	31	49	45	6
Niedersachsen	588	98	2	-	540	37	43	20
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	251	99	1	-	232	47	41	12
Hessen	151	91	9	-	151	50	40	10
Rheinland-Pfalz	242	93	7	-	242	52	34	14
Baden-Württemberg	325	78	22	-	308	31	53	16
Bayern	167	58	37	5	167	21	63	16
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 1959	1 860	90	10	0	1 774	39	46	15
" 1958	1 745	15	77	8	1 743	2	74	24
Saarland	20	100	-	-	20	50	50	-
Berlin (West)	17	100	-	-	17	82	18	-

¹⁾ Ohne Saarland und Berlin

Unter diesen Umständen erreichte der Wachstumsstand nicht die guten Beurteilungen wie im Vorjahre. Der Stand der Gemüsekulturen wurde im allgemeinen als mittel bewertet. Als günstiger wurden die Zwiebeln und etwas unter mittel der Blumenkohl (mittelfrüher) begutachtet.

Für Frühlkohlrabi und frühen Kopfsalat, Spargel und Rhabarber wurden die Hektarerträge als endgültige Schätzungen festgestellt. Bis auf Rhabarber liegen die diesjährigen Erträge um ein geringes über denen des Vorjahres. Verhältnismäßig am günstigsten wurde der Hektarertrag von Frühlkohlrabi mit 164 dz gegen 159 dz im Vorjahre und 157 dz im Durchschnitt der Jahre 1953/58 beurteilt. Auch der Frühjahrskopfsalat liegt mit 154 dz je ha über dem Vorjahr und über dem sechsjährigen Durchschnitt 1953/58.

Der Spargelertrag brachte mit 33,5 dz den höchsten seit 1950 geschätzten Ertrag. Besonders empfindlich gegen die Trockenheit zeigt sich der Rhabarber, der mit 237 dz weder das Vorjahr noch den sechsjährigen Durchschnitt erreichte.

Bei den Gesamterntemengen ist zu berücksichtigen, daß diese mit den geschätzten Hektarerträgen und zunächst noch mit den beabsichtigten Anbauflächen bzw.

den vorjährigen Flächen (Spargel und Rhabarber) errechnet werden. Die beabsichtigten Anbauflächen liegen bei Kohlrabi und Kopfsalat in den vergangenen sechs Jahren stets über den endgültig ermittelten Flächen und zwar bei Kohlrabi um 15 vH und bei Kopfsalat um 11 vH. Diese Entwicklung bei Anbauflächen, die sich erfahrungsgemäß bei diesen Gemüsearten ergibt, muß man daher bei der Berechnung der voraussichtlichen Gesamternte berücksichtigen. In der Zahlenübersicht ist daher in Zeile 20 die Fläche bei diesen beiden Gemüsearten entsprechend gekürzt. Daraus errechnet sich für den Frühen Kohlrabi eine Gesamternte von 12 972 t gegen 12 200 t im Jahre 1958 und bei Frühjahrskopfsalat eine Erntemenge von 19 078 t gegen 19 883 t im Vorjahre.

Bei Spargel und Rhabarber lassen sich Umrechnungen der Flächen nicht durchführen, weil diese bei der Erhebung über die Anbauabsichten im Februar 1959 nicht einbezogen sind, da es sich hier um Dauerkulturen handelt, bei denen die Flächenänderungen von Jahr zu Jahr nur gering sind.

Die Spargelernte erbrachte in diesem Jahr rd. 14 739 t oder rd. 2 000 t mehr als im Vorjahr und fast 5 000 t mehr als im Durchschnitt der letzten sechs Jahre.

Die Rhabarberernte erreichte trotz der geringen Hektarerträge noch etwa den Durchschnitt 1953/58.

Von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen, die in besonders starkem Umfange auftraten, sind nur Blattläuse besonders in Bayern und Nordrhein-Westfalen, sowie Bohnenblattläuse, Wühlmäuse, Erdflöhe und Kohlfliegen zu erwähnen.

Noten: 1 = sehr gut
 2 = gut
 3 = mittel
 4 = gering
 5 = sehr gering

Wachstumsstand des
 (Begutachtung)

Lfd. Nr.	L a n d	Juni	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1959	3,0	2,8	3,1
2	" "	1958	2,8	2,6	2,4
3	Hamburg	1959	3,2	2,9	3,0
4	"	1958	2,7	2,7	2,7
5	Niedersachsen	1959	3,4	3,2	3,1
6	"	1958	2,7	2,5	2,6
7	Bremen	1959	.	.	.
8	"	1958	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1959	3,1	3,0	3,0
10	" "	1958	2,6	2,2	2,4
11	Hessen	1959	3,0	2,6	2,7
12	"	1958	2,5	2,4	2,4
13	Rheinland-Pfalz	1959	3,0	2,8	2,8
14	" "	1958	2,7	2,5	2,5
15	Baden-Württemberg	1959	2,7	2,7	2,6
16	" "	1958	2,4	2,4	2,4
17	Bayern	1959	2,6	2,5	2,6
18	"	1958	2,5	2,3	2,3
19	<u>Bundesgebiet</u> ohne Saarland und Berlin	1959	3,1	2,8	2,9
20	"	1958	2,6	2,3	2,4
21	Saarland	1959	2,9	2,4	2,0
22	"	1958	2,5	2,3	2,3
23	Berlin (West)	1959	3,1	3,0	3,3
24	"	1958	2,4	2,3	2,6

Gemüses im Juni 1959

nach Noten)

Steckzwiebeln	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Stangenbohnen	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
4	5	6	7	8	
2,8	2,5	2,7	2,9	2,6	1
2,6	2,8	2,8	3,0	2,3	2
2,6	2,7	2,8	3,0	2,8	3
2,2	2,9	2,9	2,9	2,1	4
2,9	3,1	3,0	3,2	2,9	5
2,6	2,7	2,7	3,2	3,0	6
:	:	:	:	:	7
:	:	:	:	:	8
2,6	2,6	2,9	3,1	2,6	9
2,3	2,4	2,7	3,0	2,6	10
2,3	2,5	2,7	2,8	2,5	11
2,2	2,6	2,6	2,7	2,7	12
2,7	2,9	2,7	3,0	2,8	13
2,4	2,6	2,4	2,6	2,5	14
2,4	2,7	2,7	2,9	2,5	15
2,2	2,2	2,4	2,4	2,5	16
2,4	2,6	2,7	3,1	2,8	17
2,3	2,5	2,6	2,7	2,6	18
2,6	2,7	2,8	3,0	2,7	19
2,3	2,5	2,6	2,7	2,5	20
2,3	2,0	2,8	2,9	2,4	21
2,4	2,5	2,7	2,5	2,4	22
2,2	2,6	2,7	2,9	2,7	23
2,5	2,9	3,0	3,3	2,6	24

Ernteschätzungen von

Nr.	L a n d	1) Jahr	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1959	13	150,4	1 955	13	137,4	1 786
2	"	1958	16	131,3	2 170	18	136,1	2 382
3	Hamburg	1959	61	190,1	11 597	96	164,9	15 828
4	"	1958	61	185,2	11 297	96	167,8	16 109
5	Niedersachsen	1959	101	137,3	13 835	96	136,3	13 033
6	"	1958	76	137,1	10 449	82	137,3	11 206
7	Bremen	1959	6	157,1	943	6	104,6	628
8	"	1958	4	162,1	648	5	150,5	753
9	Nordrhein-Westfalen	1959	414	175,4	72 622	514	165,5	85 074
10	"	1958	315	169,8	53 474	495	156,4	77 441
11	Hessen	1959	44	266,3	11 717	94	218,0	20 492
12	"	1958	38	189,9	7 217	92	180,3	16 588
13	Rheinland-Pfalz	1959	65	129,7	8 428	74	114,9	8 499
14	"	1958	47	121,1	5 690	72	109,2	7 865
15	Baden-Württemberg	1959	88	176,6	15 541	206	177,2	36 485
16	"	1958	74	183,7	13 575	187	180,2	33 688
17	Bayern	1959	138	115,1	15 884	261	106,5	27 797
18	"	1958	139	126,6	17 600	252	130,1	32 794
19	Bundesgebiet ohne							
20	Saarland u. Berlin	1959	930	164,0	152 522	1 360	154,1	209 622
21	" ergänzt Juni	1959	791	164,0	129 724	1 238	154,1	190 775
22	"	1958	770	158,6	122 120	1 299	153,1	198 826
23	" ø 1953/58		755	157,0	118 524	1 306	151,1	197 334
24	Saarland	1959	8	92,7	701	8	82,5	637
25	"	1958	6	120,9	725	8	93,8	750
26	Berlin (West)	1959	27	158,5	4 312	18	117,3	2 088
27	"	1958	27	162,5	4 421	18	135,6	2 414

1) 1958 Endg. Ergebnisse.- 2) Für 1959 neue Ermittlungen in Niedersachsen und Hessen, übrige Länder voraussichtliche Flächen nach Erhebung vom Juli 1958.-

3) Für 1959 neue Ermittlung in Hessen, übrige Länder Fläche nach Erhebung vom Juli 1958.

Gemüse im Juni 1959

Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche ²⁾	Ertrag		Fläche ³⁾	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	
103	26,5	2 730	50	215,5	10 775	1
104	21,9	2 275	50	204,0	10 069	2
3	23,4	70	134	236,7	31 721	3
3	22,1	66	134	234,9	31 477	4
1 322 ²⁾	30,7	40 539	54	208,6	11 245	5
1 211	24,6	29 753	54	241,4	13 013	6
0	.	.	4	275,2	1 101	7
0	.	.	4	285,5	1 142	8
236	32,8	7 751	149	243,2	36 231	9
218	35,3	7 696	149	261,3	38 935	10
1 187 ²⁾	33,5	39 765	22 ³⁾	288,2	6 340	11
1 203	30,2	36 307	24	197,9	4 750	12
468	43,2	20 219	27	188,1	5 078	13
485	38,0	18 422	27	181,4	4 897	14
872	34,0	29 658	83	293,1	24 445	15
842	32,5	27 398	83	264,1	22 022	16
203	32,8	6 658	71	194,9	13 838	17
190	33,3	6 326	71	235,2	16 701	18
4 394 ²⁾	33,5	147 390	594 ³⁾	237,0	140 774	19
4 256	30,1	128 243	596	239,9	143 006	20
3 563	28,8	102 447	561	242,3	135 908	21
2	32,5	78	1	242,0	237	22
4	33,0	132	1	291,3	291	23
7	31,4	220	10	200,9	1 953	24
7	22,8	166	10	244,6	2 378	25
						26

Ertragseschätzungen für Gemüse in Hauptanbaugebieten
im Juni 1959

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet			Früh- kohl- rabi	Früh- jahrs- kopf- salat	Spar- gel	Rha- bar- ber
			dz je ha			
Landkreis Hannover	Ndsa		133,6	117,9	.	.
" Wolfenbüttel	"		116,7	139,4	.	158,5
" Friesland	"		193,2	.	.	.
" Harburg	"		.	186,7	.	304,3
" Peine	"		.	.	25,3	.
" Burgdorf	"		.	.	30,4	.
" Gifhorn	"		.	.	35,4	.
" Braunschweig	"		.	.	29,6	.
" Bonn	NrhW		176,4	171,1	.	230,5
" Geldern	"		170,9	158,2	32,0	.
" Recklinghausen	"		.	147,8	.	270,0
" Kempen-Krefeld	"		.	.	29,9	.
" Siegkreis	"		.	.	.	169,6
" Grevenbroich	"		.	.	.	272,9
KrfSt Düsseldorf	"		193,8	217,5	.	.
Landkr. u. krfSt Koblenz	RhPf		117,0	111,9	.	199,4
" " " Mainz	"		153,4	136,3	38,4	207,9
" " " Frankenthal	"		145,0	114,3	.	173,3
" " " Ludwigshafen	"		131,0	113,6	.	.
" " " Neustadt a.d.W.	"		.	.	.	182,8
" " " Speyer	"		.	.	40,5	.
Landkreis Bingen	"		.	.	38,0	.
" Germersheim	"		.	120,4	.	.
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü		169,2	174,8	30,0	304,7
Unteres Neckartal u. Kraichgau	"		149,1	159,4	34,0	259,5
Unteres Rheintal	"		158,8	159,4	34,0	286,1
Breisgau und Kaiserstuhl	"		175,7	171,5	33,0	274,7
Konstanz mit Insel Reichenau	"		224,2	248,1	-	327,1
Oberes Gäugebiet	"		161,3	170,9	-	282,0
Nördl. Oberrh. u. Ob. Gäugebiet	"		177,8	169,6	32,0	244,0
KrfSt München	Bay		126,0	109,0	.	.
" Bamberg	"		.	145,0	.	.
" Nürnberg	"		.	.	38,0	.
Landkr. Kitzingen	"		150,0	.	.	.
" Schrobenhausen	"		.	.	28,0	.
" Würzburg	"		.	.	.	211,0