

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/21

Erschienen am 17. Mai 1952

Wachstumsstand Gemüse April 1952

und

Erntevorschätzung von Winterkopfsalat und Winterspinat

Der Wachstumsstand der Frühgemüsekulturen (auf dem Freiland) wurde Mitte April im Bundesgebiet durchweg besser als mittel beurteilt; Frühl Kohl und Möhren weisen mit 2,7 bis 2,6 einen schlechteren Wachstumsstand auf als Kohlrabi, Kopfsalat, Spinat und Rhabarber, bei denen der Stand mit 2,4 bis 2,3 verhältnismäßig günstig ausgewiesen wurde. Die Wachstumsstandsbeurteilungen liegen in diesem Jahr allgemein günstiger als im Vorjahr. In den norddeutschen Anbaugebieten Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wo z.T. ungünstige Witterungsverhältnisse die Aussaaten und Auspflanzungen beeinträchtigten, erreichte der Frühl Kohl nur einen mittleren Beurteilungsstand, während in den westlichen und südlichen Anbaugebieten der Wachstumsstand ein allgemein günstigeres Bild aufweist.

Bei den Erntevorschätzungen sind für 1952 die im Februar 1952 ermittelten Anbauflächen von Winterkopfsalat und Winterspinat eingesetzt. Die Vergleichszahlen für 1951 beziehen sich auf die Herbstanbauflächen 1950.

Die Erntevorschätzungen von Winterkopfsalat und Winterspinat weisen im Bundesdurchschnitt geringere Hektarerträge als im Vorjahr auf. Mit 122,6 dz je ha im Bundesdurchschnitt liegt der Hektarertrag des Winterkopfsalates um 19 vH unter dem Hektarertrag von 1951. Trotzdem ist mit einem höheren Ernteanfall zu rechnen, da der Anbau von 269 ha auf 447 ha ausgedehnt worden ist. Nach der Erntevorschätzung ergibt sich hiernach ein Anfall von 5 467 t gegen 4 097 t im Vorjahr.

Auch der Winterspinat weist nach der Vorschätzung bei geringerem Hektarertrag infolge der Ausdehnung des Anbaues einen höheren Gesamtertrag auf. Gegen 12 476 t im Vorjahr wird der Ertrag in diesem Jahr auf 23 398 t geschätzt.

Geringere Auswinterungsschäden an Winterkopfsalat und Winterzwiebeln (mit 1 bis 2 vH) und stärkere an Winterspinat (17,8 vH) wurden in Hamburg gemeldet. An Pflanzenschädlingen wurde aus fast allen Gebieten Auftreten von Feldmäusen, Erdflöhen, Ackerschnecken und Engerlingen gemeldet; außerdem werden Kohltrieb-
rüßler in Hamburg, Nordbaden, Baden und Bayern, Wildtauben in Nordrhein-Westfalen und Bremen genannt.

Erntevorschätzung April 1952

| Lfg. Nr. | L a n d | Jahr | Winterkopfsalat | | | Winterspinat | | |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|
| | | | Fläche | E r t r a g | | Fläche | E r t r a g | |
| | | | | vom | im | | vom | im |
| | | | ha | Hektar | ganzen | ha | Hektar | ganzen |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bundesgebiet | 1952 | 447 | 122,6 | 54 672 | 2 271 | 103,0 | 253 98 |
| 2 | " | 1951 ^{*)} | 269 | 152,3 | 40 965 | 1 103 | 113,1 | 124 761 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1952 | - | - | - | 2 | 98,0 | 196 |
| 4 | " " | 1951 | 0 | 87,9 | 40 | 11 | 132,3 | 1 455 |
| 5 | Hamburg | 1952 | 6 | 116,6 | 700 | 4 | 106,6 | 426 |
| 6 | " | 1951 | 4 | 142,3 | 569 | 16 | 118,5 | 1 393 |
| 7 | Niedersachsen | 1952 | 5 | 104,1 | 562 | 101 | 87,9 | 8 904 |
| 8 | " | 1951 | 5 | 92,0 | 423 | 71 | 91,8 | 6 484 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1952 | 85 | 104,3 | 8 869 | 1 006 | 123,4 | 124 167 |
| 10 | " " | 1951 | 79 | 128,2 | 10 127 | 506 | 130,5 | 66 047 |
| 11 | Bremen | 1952 | 0 | 120,0 | 0 | 1 | 100,0 | 100 |
| 12 | " | 1951 | 1 | 110,0 | 110 | 2 | 95,0 | 190 |
| 13 | Hessen | 1952 | 15 | 83,1 | 1 247 | 66 | 69,7 | 4 602 |
| 14 | " | 1951 | 13 | 122,5 | 1 592 | 70 | 62,3 | 4 363 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1952 | 61 | 153,8 | 9 384 | 122 | 114,6 | 13 986 |
| 16 | " " | 1951 | 28 | 154,8 | 4 334 | 93 | 116,5 | 10 834 |
| 17 | Bayern | 1952 | 39 | 81,2 | 3 200 | 359 | 78,2 | 28 067 |
| 18 | " | 1951 | 35 | 103,2 | 3 618 | 162 | 99,3 | 16 050 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1952 | 156 | 110,1 | 17 227 | 547 | 83,5 | 45 691 |
| 20 | " " | 1951 | 40 | 104,6 | 4 139 | 135 | 86,7 | 11 713 |
| 21 | Baden | 1952 | 77 | 172,5 | 13 234 | 49 | 133,5 | 6 542 |
| 22 | " | 1951 | 62 | 251,5 | 15 593 | 28 | 176,4 | 4 939 |
| 23 | Württbg.-Hohenzollern | 1952 | 2 | 93,4 | 199 | 14 | 94,4 | 1 300 |
| 24 | " " | 1951 | 2 | 157,5 | 389 | 9 | 87,5 | 765 |
| 25 | Lindau | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | " | 1951 | 0 | 120,0 | 31 | 0 | 75,0 | 28 |

*) Endgültige Ernteergebnisse 1951 mit Anbauflächen 1950.

Wachstumsstand des Gemüses im April 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

| Lfd. Nr. | L a n d | Jahr (April) | Früh- weißkohl | Früh- rotkohl | Früh- wirsingkohl | Früh- blumenkohl |
|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <u>Bundesgebiet</u> | 1952 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| 2 | " | 1951 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1952 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| 4 | " " | 1951 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 5 | Hamburg | 1952 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
| 6 | " | 1951 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Niedersachsen | 1952 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | " | 1951 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1952 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
| 10 | " " | 1951 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,7 |
| 11 | Bremen | 1952 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |
| 12 | " | 1951 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
| 13 | Hessen | 1952 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 14 | " | 1951 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1952 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| 16 | " " | 1951 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 17 | Bayern | 1952 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 18 | " | 1951 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1952 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| 20 | " " | 1951 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 |
| 21 | Baden | 1952 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| 22 | " | 1951 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 23 | Württbg.-Hohenzollern | 1952 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |
| 24 | " " | 1951 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |

noch:

Wachstumsstand des Gemüses im April 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

| Früh- kohl-rabi | Frühjahrs- kopfsalat | Frühjahrs- spinat | Winterzwiebeln (Herbstaussaat) | Frühe Mören (Karotten) | Rhabarber | Lfd. Nr. |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2,4 2,7 | 2,4 2,7 | 2,4 2,7 | 2,6 2,8 | 2,6 3,0 | 2,3 2,5 | 1 2 |
| 2,6 3,8 | 2,5 2,9 | 2,5 3,0 | 2,8 4,4 | 2,7 4,0 | 2,3 3,9 | 3 4 |
| 2,8 3,2 | 2,7 3,1 | 2,6 3,1 | 3,0 2,1 | 2,7 2,7 | 2,3 2,0 | 5 6 |
| 2,8 2,8 | 2,7 2,9 | 2,6 2,9 | 2,8 3,0 | 2,7 3,1 | 2,4 2,6 | 7 8 |
| 2,3 2,7 | 2,4 2,6 | 2,3 2,6 | 2,7 2,7 | 2,4 3,0 | 2,2 2,4 | 9 10 |
| 2,8 2,5 | 2,9 2,3 | 2,5 2,7 | 3,0 3,0 | 3,0 2,3 | 2,6 2,6 | 11 12 |
| 2,5 2,8 | 2,4 2,9 | 2,5 2,5 | 2,7 2,9 | 2,9 3,0 | 2,3 2,4 | 13 14 |
| 2,5 2,7 | 2,4 2,7 | 2,6 2,5 | 2,7 2,7 | 2,9 2,7 | 2,3 2,4 | 15 16 |
| 2,4 2,8 | 2,2 2,6 | 2,4 2,8 | 2,7 2,7 | 2,6 2,9 | 2,1 2,4 | 17 18 |
| 2,6 2,8 | 2,5 2,8 | 2,6 2,8 | 2,5 2,9 | 2,6 3,1 | 2,3 2,5 | 19 20 |
| 2,3 2,4 | 2,1 2,2 | 2,4 2,5 | 2,3 2,6 | 2,4 2,5 | 2,2 2,7 | 21 22 |
| 2,2 2,3 | 2,2 2,7 | 2,7 2,8 | 2,8 2,8 | 2,6 2,6 | 2,2 2,4 | 23 24 |