

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/13/23

Erschienen am 27. Juli 1953

Stand der Reben Ende Juni 1953

Um Mitte Juni setzte in den meisten Gebieten die Blüte ein, die sich über zwei bis drei Wochen erstreckte. Der Verlauf der Blüte wird in den rheinpfälzischen Weinbaugebieten überwiegend als gut bezeichnet, während man in den Gebieten von Baden-Württemberg über einen schlechten Verlauf klagte. Die Witterung im Juni mit ihren hohen Niederschlagsmengen verbunden mit örtlichen Gewitterschauern verursachte in einigen Ländern, so besonders in Baden-Württemberg, Hagelschäden und Erdabschwemmungen. In den Weinbaugebieten von Rheinland-Pfalz beurteilten 61 vH der Berichterstatter, in Baden-Württemberg dagegen nur 9 vH der Berichterstatter die Witterungsverhältnisse als günstig.

Im allgemeinen geben die Wachstumsstandsbeurteilungen vom Juni das gleiche Bild wie im Vormonat. Die Beurteilungen liegen in den rheinpfälzischen Gebieten günstiger (2,7) als in den Gebieten von Baden-Württemberg (3,9), wo infolge ungünstiger Witterungsbedingungen die Blüte nur schleppend verlief und vielfach zum Verrieseln führte. Im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres wird der Rebenstand im Durchschnitt des Bundesgebietes um 6/10 Noten schlechter beurteilt.

| L ä n d e r | 1953 | | 1952 |
|---------------------|------|-----|------|
| | Juni | Mai | Juni |
| Nordrhein-Westfalen | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
| Hessen | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Rheinland-Pfalz | 2,7 | 2,7 | 2,2 |
| Baden-Württemberg | 3,9 | 3,9 | 2,8 |
| Bayern | 2,7 | 2,8 | 2,4 |
| Bundesgebiet | 3,0 | 3,0 | 2,4 |

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering,
5 = sehr gering

Die Pflegearbeiten wurden nach den vorliegenden Berichten in Hessen und Bayern vollständig und Rheinland-Pfalz zu 80 vH und in Baden-Württemberg nur zum Teil durchgeführt. Hier sind insbesondere die Laub- und Bodenbearbeitungen, das Spritzen und die Unkrautbekämpfungsmaßnahmen noch im Rückstand.

Ein besonders starkes Auftreten von Kräuselmilbe und Peronospora wurde nur in Bayern gemeldet. In geringerem Umfang wurden Heuwurm, Oidium, Rote Spinne (Hessen), Roter Brenner, Milbenkräuselkrankheit, Blattgallmilbe in Rheinland-Pfalz und in stärkerem Umfang Peronospora, Heu- und Sauerwurm in Baden-Württemberg gemeldet.

Stand der Reben Juni 1953

Noten: 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst; 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst; 3 = mittel = 1/3 Herbst; 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst; 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | 1953 | |
|-------------|--|------|-----|
| | | Juni | Mai |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> | 2,0 | 2,4 |
| 2 | Rheingebiet | 2,0 | 2,4 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 2,2 | 2,1 |
| 4 | R.B. Darmstadt | 2,0 | 2,4 |
| 5 | R.B. Wiesbaden | 2,2 | 2,1 |
| 6 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 2,7 | 2,7 |
| 7 | Rheinland-Nassau | 2,7 | 2,6 |
| | davon: | | |
| 8 | Mittelrhein | 2,4 | 2,5 |
| 9 | Nahe (R.B. Koblenz) | 2,6 | 2,6 |
| 10 | Obermosel | 3,4 | 3,6 |
| 11 | Saar | 3,6 | 3,6 |
| 12 | Ruver | 2,8 | 2,8 |
| 13 | Mittelmosel | 2,6 | 2,4 |
| 14 | Untermosel | 2,4 | 2,3 |
| 15 | Ahr | 3,8 | 3,7 |
| 16 | Lahn | 2,3 | 2,5 |
| 17 | Rheinhessen | 2,7 | 2,7 |
| | davon: | | |
| 18 | Worms und Umgegend | 2,7 | 3,0 |
| 19 | Oppenheim und Umgegend | 3,1 | 3,0 |
| 20 | Mainz und Umgegend | 3,0 | 3,1 |
| 21 | Ingelheim und Umgegend | 2,7 | 2,7 |
| 22 | Wiesbach | 2,6 | 2,5 |
| 23 | Bingen und Umgegend | 2,0 | 2,0 |
| 24 | Nahe (Rheinhessen) | 3,0 | 3,0 |
| 25 | Alzey und Umgegend | 2,6 | 2,4 |
| 26 | Pfalz | 2,8 | 2,8 |
| | davon: | | |
| 27 | Mittelhaardt | 3,1 | 3,0 |
| 28 | Oberhaardt | 2,6 | 2,6 |
| 29 | Unterhaardt mit Zellertal | 2,8 | 2,8 |
| 30 | Nahe (Nordpfalz) | 2,8 | 3,0 |

noch: Stand der Reben Juni 1953

Noten: 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst; 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst; 3 = mittel = 1/3 Herbst; 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst; 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | 1953 | |
|-------------|--|------|-----|
| | | Juni | Mai |
| 31 | <u>Baden-Württemberg</u> | 3,9 | 3,9 |
| 32 | Nordwürttemberg | 4,1 | 4,1 |
| | davon: | | |
| 33 | Oberes Neckartal | 4,5 | 4,6 |
| 34 | Unteres Neckartal | 4,0 | 4,0 |
| 35 | Remstal | 3,8 | 3,6 |
| 36 | Enztal | 4,7 | 4,7 |
| 37 | Zabergäu | 4,2 | 4,3 |
| 38 | Kocher- und Jagsttal | 3,7 | 3,6 |
| 39 | Tauber- und Jagsttal | 4,9 | 5,0 |
| 40 | Nordbaden | 3,2 | 3,1 |
| | davon: | | |
| 41 | Tauber- und Maintal | 3,6 | 3,6 |
| 42 | Neckar- und Jagsttal | 3,9 | 3,7 |
| 43 | Bergstraße | 2,6 | 2,5 |
| 44 | Kraichgau | 3,5 | 3,4 |
| 45 | Pfinz-, Enz- und Albtal | 3,7 | 3,6 |
| 46 | Sonstige Gebiete | 3,0 | 5,0 |
| 47 | Südwestfalen | 4,4 | 4,4 |
| | davon: | | |
| 48 | Oberes Neckartal | 5,0 | 5,0 |
| 49 | Enztal | 3,5 | 3,3 |
| 50 | Bodenseegebiet ¹⁾ | 2,9 | 2,4 |
| 51 | Südbaden | 3,9 | 3,8 |
| | davon: | | |
| 52 | Bodenseegebiet ²⁾ | 3,2 | 3,1 |
| 53 | Oberes Rheintal | 4,9 | 4,0 |
| 54 | Markgräflerland | 4,5 | 4,5 |
| 55 | Kaiserstuhl | 4,0 | 3,8 |
| 56 | Breisgau | 4,0 | 4,1 |
| 57 | Ortenau und Bühler- und Jagsttal | 3,0 | 2,6 |
| 58 | <u>Bayern</u> | 2,7 | 2,8 |
| 59 | R.B. Unterfranken | 2,7 | 2,8 |
| 60 | R.B. Mittelfranken | 3,0 | 3,0 |
| 61 | R.B. Oberpfalz und übrige Landesteile | 3,0 | 3,0 |
| 62 | Kreis Lindau | 3,0 | 2,0 |
| 63 | <u>Bundesgebiet</u> | 3,0 | 3,0 |

¹⁾ Kreise Konstanz, Stockach, Überlingen. - ²⁾ Kreise Ravensburg, Tennang, Exklave Bruderhof-Hohentwiel.