

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

2. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/1 - vj 2/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1966	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1966	8
(Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 2. Vierteljahr nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber bei oder nach Geburt, Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer 4 veröffentlicht.



Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenresultaten. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 2. Vierteljahr 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle
							Grund
1	Schleswig-Holstein	-	50	-	3	-	-
2	Hamburg	-	100	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	115	7	1	-	-
3	RB Hannover	-	14	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	13	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	11	1	-	-	-
6	RB Stade	-	8	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	14	6	-	-	-
8	RB Aurich	-	11	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	9	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	35	-	-	-	-
11	Bremen	-	15	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	309	59	9	-	-
12	RB Düsseldorf	1	67	1	4	-	-
13	RB Köln	-	121	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	10	-	1	-	-
15	RB Münster	-	8	51	1	-	-
16	RB Detmold	-	5	2	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	98	5	2	-	-
18-20	Hessen	-	66	-	2	-	-
18	RB Darmstadt	-	15	-	2	-	-
19	RB Kassel	-	10	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	41	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	19	7	13	-	-
21	RB Koblenz	2	10	4	4	-	-
22	RB Trier	-	2	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	2	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	6	2	6	-	-
26-29	Baden-Württemberg	4	163	10	4	1	1
26	RB Nordwürttemberg	1	84	1	1	1	1
27	RB Nordbaden	-	27	1	-	-	-
28	RB Südbaden	1	29	5	3	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	23	3	-	-	-
30-36	Bayern	1	504	18	7	1	1
30	RB Oberbayern	1	148	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	20	1	4	-	-
32	RB Oberpfalz	2	177	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	9	2	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	15	6	1	-	-
35	RB Unterfranken	2	89	2	1	-	-
36	RB Schwaben	-	46	6	1	1	1
37	Saarland	-	9	-	2	-	-
38	Berlin (West)	-	106	7	1	1	-
	Bundesgebiet	21	1 456	108	43	3	2
	dagegen 2. Vj. 1965	33	819	38	46	8	8

1) Vorläufiges Ergebnis.

übertragbaren Krankheiten

(3. 4. - 2. 7. 1966)¹⁾

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Aus- satz	Nr.
Psittacose	Übrige Formen		Bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr				
3	-	7	4	-	7	-	-	1
1	-	6	5	-	4	-	-	2
-	-	19	1	-	23	2	-	3-10
-	-	5	-	-	9	-	-	3
-	-	-	1	-	2	-	-	4
-	-	-	-	-	3	1	-	5
-	-	1	-	-	2	1	-	6
-	-	3	-	-	6	-	-	7
-	-	1	-	-	1	-	-	8
-	-	2	-	-	-	-	-	9
-	-	7	-	-	-	-	-	10
-	-	5	2	-	3	-	-	11
4	8	33	31	2	66	-	1	12-17
1	-	12	20	1	13	-	-	12
1	1	5	4	-	14	-	1	13
-	1	1	5	-	3	-	-	14
1	1	7	1	-	7	-	-	15
-	-	1	1	-	10	-	-	16
1	5	7	-	1	19	-	-	17
-	-	12	35	4	23	-	-	18-20
-	-	4	32	-	7	-	-	18
-	-	2	-	-	5	-	-	19
-	-	6	3	4	11	-	-	20
2	-	13	6	-	12	-	-	21-25
2	1	15	1	-	5	-	-	21
-	-	1	1	-	4	-	-	22
-	-	2	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	2	-	-	24
-	-	-	4	-	1	-	-	25
3	3	52	93	-	41	-	-	26-29
2	1	11	8	-	20	-	-	26
1	1	7	3	-	7	-	-	27
-	-	20	58	-	3	-	-	28
-	1	14	24	-	11	-	-	29
5	8	37	129	-	22	4	-	30-36
1	1	2	11	-	7	-	-	30
4	-	19	2	-	2	-	-	31
-	-	2	15	-	3	-	-	32
-	4	-	-	-	1	-	-	33
-	1	6	7	-	4	-	-	34
-	2	2	1	-	2	-	-	35
-	-	6	93	-	3	4	-	36
-	-	6	1	-	2	-	-	37
2	11	2	6	-	11	-	-	38
20	30	197	313	6	214	6	1	
21	24	140	313	5	193	6	1	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Fehl- geburt	Grund
				Bang- sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken - Mening- itis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	1	380	3	-	20	18	119	-	
2	Hamburg	-	361	1	-	8	16	150	-	
3-10	Niedersachsen	2	778	3	-	30	33	330	1	
3	RB Hannover	-	147	-	-	8	9	73	-	
4	RB Hildesheim	-	97	-	-	6	1	49	-	
5	RB Lüneburg	-	152	3	-	4	6	51	-	
6	RB Stade	-	79	-	-	6	2	26	1	
7	RB Osnabrück	2	87	-	-	-	11	19	-	
8	RB Aurich	-	21	-	-	4	2	8	-	
9	VB Braunschweig	-	137	-	-	-	2	44	-	
10	VB Oldenburg	-	58	-	-	2	-	60	-	
11	Bremen	-	137	-	-	10	-	74	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	15	2 179	2	-	98	116	1 135	-	
12	RB Düsseldorf	2	633	1	-	28	27	373	-	
13	RB Köln	1	243	-	-	12	5	156	-	
14	RB Aachen	1	216	-	-	5	11	41	-	
15	RB Münster	6	297	-	-	14	19	185	-	
16	RB Detmold	1	226	-	-	6	13	113	-	
17	RB Arnsberg	4	564	1	-	33	41	267	-	
18-20	Hessen	-	684	2	-	17	21	484	-	
18	RB Darmstadt	-	214	1	-	4	6	180	-	
19	RB Kassel	-	154	1	-	4	5	76	-	
20	RB Wiesbaden	-	316	-	-	9	10	228	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	4	313	-	-	21	18	303	-	
21	RB Koblenz	-	102	-	-	6	4	71	-	
22	RB Trier	-	21	-	-	2	6	56	-	
23	RB Montabaur	2	29	-	-	3	3	6	-	
24	RB Rheinhessen	1	32	-	-	-	-	20	-	
25	RB Pfalz	1	129	-	-	10	5	150	-	
26-29	Baden-Württemberg	5	1 399	10	-	41	110	857	-	
26	RB Nordwürttemberg	1	601	4	-	10	14	260	-	
27	RB Nordbaden	3	475	-	-	8	4	292	-	
28	RB Südbaden	1	208	3	-	17	66	206	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	115	3	-	6	26	99	-	
30-36	Bayern	19	1 698	13	2	65	72	904	1	
30	RB Oberbayern	3	716	1	2	15	34	226	1	
31	RB Niederbayern	3	116	-	-	16	2	173	-	
32	RB Oberpfalz	8	93	2	-	7	3	59	-	
33	RB Oberfranken	3	247	8	-	13	19	65	-	
34	RB Mittelfranken	-	229	-	-	6	5	60	-	
35	RB Unterfranken	1	134	-	-	6	3	213	-	
36	RB Schwaben	1	163	2	-	2	6	108	-	
37	Saarland	-	169	1	-	4	2	137	-	
38	Berlin (West)	-	325	-	-	5	21	190	-	
	Bundesgebiet	46	8 423	35	2	319	427	4 683	2	
	dagegen 2. Vj. 1965	96	8 331	32	1	367	361	4 272	-	

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Ob es sich um eine Ersterkrankung oder einen Rückfall handelt, ist noch ungeklärt.

(3. 4. - 2. 7. 1966)¹⁾

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
zahlen										
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	-	-	-	1	1	2	5	1	11	3-10
1	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3
1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
3	-	-	-	-	-	1	4	-	8	12-17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16
3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	17
-	-	-	-	1 a)	1	1	2	-	19	18-20
-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19
-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	20
-	-	-	-	-	-	1	1	12	13	21-25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21
-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24
-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	25
1	-	-	-	-	-	-	1	-	11	26-29
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	-	-	-	-	-	-	1	-	7	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	4	1	1	2	-	-	8	3	22	30-36
-	1	1	1	2	-	-	1	1	7	30
-	3	-	-	-	-	-	4	1	5	31
-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	36
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	1	-	-	-	1	68	38
6	5	1	1	6	3	5	22	17	154	
1	-	1	1	7	1	1	28	8	187	

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
im 2. Vierteljahr 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle
Verhältniszahlen auf 100 000							
1	Schleswig-Holstein	-	8,2	-	(0,5)	-	-
2	Hamburg	-	21,6	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	6,7	(0,4)	(0,1)	-	-
11	Bremen	-	(8,1)	-	(0,5)	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	7,4	1,4	(0,2)	-	-
18-20	Hessen	-	5,1	-	(0,2)	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,2)	(2,1)	(0,8)	(1,5)	-	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,2)	7,7	(0,5)	(0,2)	(0,05)	(0,05)
30-36	Bayern	(0,6)	20,0	(0,7)	(0,3)	(0,04)	(0,04)
37	Saarland	-	(3,2)	-	(0,7)	-	-
38	Berlin (West)	-	19,4	(1,3)	(0,2)	(0,2)	-
	Bundesgebiet	(0,1)	9,8	0,7	(0,3)	(0,02)	(0,01)
	dagegen 2. Vj. 1965	(0,2)	5,6	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber ²⁾ bei oder nach Fehl- geburt
				Bang- sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken - Mening- itis	Übrige Formen		
Verhältniszahlen auf 100 000									
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	62,4	(0,5)	-	(3,3)	(3,0)	19,5	-
2	Hamburg	-	78,1	(0,2)	-	(1,7)	(3,5)	32,5	-
3-10	Niedersachsen	(0,1)	45,1	(0,2)	-	(1,7)	(1,9)	19,1	(0,3)
11	Bremen	-	73,9	-	-	(5,4)	-	39,9	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,4)	52,2	(0,05)	-	2,3	2,8	27,2	-
18-20	Hessen	-	52,9	(0,2)	-	(1,3)	(1,6)	37,5	-
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,4)	35,0	-	-	(2,3)	(2,0)	33,0	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,2)	66,4	(0,5)	-	(1,9)	5,2	40,7	-
30-36	Bayern	(0,8)	67,3	(0,5)	(0,1)	2,6	2,9	35,8	(0,2)
37	Saarland	-	60,1	(0,4)	-	(1,4)	(0,7)	48,7	-
38	Berlin (West)	-	59,4	-	-	(0,9)	(3,8)	34,7	-
	Bundesgebiet	(0,3)	56,9	(0,2)	(0,01)	2,2	2,9	31,6	(0,1)
	dagegen 2. Vj. 1965	0,7	56,9	(0,2)	(0,01)	2,5	2,5	29,2	-

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.-3) Ziffern, Aussagewert besitzen.

Übertragbaren Krankheiten
(3.4. - 2.7.1966) ¹⁾

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Aus- satz	Nr.
Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr				

Einwohner und 1 Jahr ³⁾

(0,5)	-	(1,1)	(0,7)	-	(1,1)	-	-	1
(0,2)	-	(1,3)	(1,1)	-	(0,9)	-	-	2
-	-	(1,1)	(0,1)	-	(1,3)	(0,1)	-	3-10
-	-	(2,7)	(1,1)	-	(1,6)	-	-	11
(0,1)	(0,2)	(0,8)	(0,7)	(0,05)	1,6	-	(0,02)	12-17
-	-	(0,9)	(2,7)	(0,3)	(1,8)	-	-	18-20
(0,2)	-	(2,0)	(0,7)	-	(1,3)	-	-	21-25
(0,1)	(0,1)	2,5	4,4	-	(1,9)	-	-	26-29
(0,2)	(0,3)	(1,5)	5,1	-	(0,9)	(0,2)	-	30-36
-	-	(2,1)	(0,4)	-	(0,7)	-	-	37
(0,4)	(2,0)	(0,4)	(1,1)	-	(2,0)	-	-	38
(0,1)	(0,2)	1,3	2,1	(0,04)	1,4	(0,04)	(0,01)	
(0,1)	(0,2)	1,0	2,1	(0,03)	1,3	(0,04)	(0,01)	

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Cani- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					

Einwohner und 1 Jahr ³⁾

-	-	-	-	-	(0,2)	-	(0,2)	-	(0,2)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(0,1)	-	-	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,1)	(0,6)	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,5)	11
(0,1)	-	-	-	-	-	(0,02)	(0,1)	-	(0,2)	12-17
-	-	-	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	-	(1,5)	18-20
-	-	-	-	-	-	(0,1)	(0,1)	(1,3)	(1,5)	21-25
(0,05)	(0,05)	-	-	-	-	-	(0,05)	-	(0,5)	26-29
-	(0,2)	(0,04)	(0,04)	(0,1)	-	-	(0,3)	(0,1)	(0,9)	30-36
-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	(0,2)	-	-	-	(0,2)	12,4	38
(0,04)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,04)	(0,02)	(0,03)	(0,1)	(0,1)	1,0	
(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,05)	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,1)	1,3	

denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen

3. Meldepflichtige Todesfälle

im 2. Vierteljahr 196

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach
			Sal- monel- lose	Übrige Formen				
								Grur
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	2	-	2	2	-	-
12	RB Düsseldorf	1	1	-	1	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	1	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	1	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	1	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	2	1	2	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	1	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	1	1	-	-
	Bundesgebiet	1	8	1	8	4	1	1
	dagegen 2. Vj. 1965	-	2	-	9	3	2	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

1) Vorläufiges Ergebnis.

an übertragbaren Krankheiten

(3.4. - 2.7.1966)¹⁾

Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectio- sa	Leptospirose	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern	Nr.
Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		Weil- sche Krank- heit						
zahlen									
-	2	1	-	-	-	-	-	1	1
-	2	3	-	-	-	-	-	-	2
2	1	1	1	2	-	-	-	5	3-10
-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
1	-	-	-	1	-	-	-	1	10
-	-	1	-	1	-	-	-	-	11
7	14	3	-	1	-	1	2	2	12-17
-	5	-	-	-	-	1	2	-	12
2	2	-	-	-	-	-	-	2	13
-	-	1	-	-	-	-	-	-	14
2	3	-	-	-	-	-	-	-	15
-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
3	3	2	-	1	-	-	-	-	17
3	3	1	-	-	2	-	-	-	18-20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	1	1	-	-	-	-	-	-	19
3	2	-	-	-	2	-	-	-	20
1	1	1	-	-	1	-	1	1	21-25
1	-	-	-	-	-	-	1	1	21
-	1	1	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	1	-	-	-	25
6	5	2	1	-	-	-	-	2	26-29
2	1	1	-	-	-	-	-	1	26
1	-	1	1	-	-	-	-	-	27
2	-	-	-	-	-	-	-	-	28
1	4	-	-	-	-	-	-	1	29
7	5	6	-	1	1	-	-	-	30-36
1	2	2	-	-	-	-	-	-	30
1	-	2	-	1	1	-	-	-	31
2	-	1	-	-	-	-	-	-	32
2	-	-	-	-	-	-	-	-	33
1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	1	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
2	-	-	-	-	2	-	-	2	38
28	32	19	2	5	6	1	3	13	
22	26	24	-	14	-	7	4	5	