

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

1967



Bestellnummer : 200720 - 67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Textteil	
Vorbemerkung	3
Bestandsabnahme um 8 %	3
16 000 neue offen Tuberkulöse	3
Tuberkulose-Sterblichkeit erreicht neuen Tiefstand	5
Krankenhausbetten für Tuberkulosekranke	5
Zusammenfassung	5
Tabellenteil	
1. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1967 nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Altersgruppen ..	6
2. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1967 nach Ländern und Altersgruppen	
a) Grundzahlen	7
b) Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden
in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter
mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose 1967

Vorbemerkung

Während bei den anderen nach den Bestimmungen des Bundesseuchengesetzes meldepflichtigen Krankheiten wö-
 chentlich die neuauftretenden Fälle erfaßt werden, werden
 bei der Tuberkulose die Zugänge vierteljährlich und jährlich,
 die Bestände jährlich registriert. Folgende Erscheinungsarten
 der aktiven Tuberkulose werden in allen Tuberkulosestati-
 stiken des Bundes und der Länder unterschieden:

Ia und Ib = aktive (offene) Tuberkulose der Atmungsorgane

a) mit Bakteriennachweis

b) ohne Bakteriennachweis

Ic = aktive (geschlossene) Tuberkulose der Atmungsorgane

Id = aktive Tuberkulose anderer Organe.

Der vorliegende Bericht beruht auf den von den Statisti-
 schen Landesämtern berichtigten Jahresmeldungen für 1967.
 Die Fälle inaktiver Tuberkulose (Gruppen II und III) werden
 von den Tuberkulosefürsorgestellten erfaßt, jedoch nicht in
 amtlichen Statistiken auf Bundesebene zusammengestellt¹⁾.

Über die Tuberkulosesterblichkeit im Jahre 1967 liegen vor-
 laufige Ergebnisse vor. Die Zahl der Tuberkulosebetten in
 Krankenhäusern 1966 und der in Tbk-Krankenhäusern behan-
 delten Patienten wird nach dem Stande vom 31. Dezember
 1966 mitgeteilt. Näheres hierüber enthält der in Heft 1, 1968,
 von Wirtschaft und Statistik erschienene Aufsatz „Kranken-
 häuser“.

Bestandsabnahme um 8 %

Ende 1967²⁾ waren bei den Gesundheitsämtern 221 090 aktiv
 Tuberkulose registriert; von ihnen waren 63 % männlichen

Tabelle 1: Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Jahresende	Tuberkulose				anderer Organe (extra- pulmonal) (Id)
	aller Formen (Ia—I d)	der Atmungsorgane			
		ansteckungs- fähig (offen) (Ia, Ib)	nicht an- steckungs- fähig (ge- schlossen) (Ic)		
Anzahl		auf 100 000 Einwohner gleichen Geschlechts			
Männlich					
1957	247 487	980,7	314,3	561,6	104,8
1960 ¹⁾	209 242	805,4	256,7	465,1	83,6
1964	169 135	609,2	191,2	351,9	66,0
1965	161 037	571,6	176,8	332,0	62,8
1966	151 118	532,1	164,6	307,5	59,9
1967 ²⁾	140 005	493,0	147,4	289,5	56,1
Weiblich					
1957	177 864	618,5	125,4	379,9	113,2
1960 ¹⁾	137 405	467,6	89,3	288,7	89,5
1964	102 433	332,3	60,0	202,0	70,4
1965	96 537	310,2	54,8	187,9	67,5
1966	88 872	283,1	50,1	169,3	63,7
1967 ²⁾	81 085	258,3	44,1	154,6	59,5
Insgesamt					
1957	425 351	787,8	213,7	464,8	109,3
1960 ¹⁾	346 647	621,4	166,6	368,7	86,1
1964	271 568	463,5	122,2	273,0	68,3
1965	257 574	434,4	112,8	256,4	65,3
1966	239 990	401,4	104,5	235,0	61,9
1967 ²⁾	221 090	369,8	93,2	218,7	57,9

¹⁾ Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal. — ²⁾ Vorläufiges Ergebnis.

¹⁾ Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 18 des Bundesseuchengesetzes ist jeder
 Fall einer tuberkulösen Erkrankung, des Verdachts einer solchen
 sowie des Todes infolge dieser Erkrankung zu melden.

In den Statistiken der Gesundheitsämter werden folgende wei-
 tere Formen der Tuberkulose unterschieden:

- II Überwachungsfälle
 - Iia Inaktive überwachungsbedürftige
 endothorakale Tuberkulose
 - Iib Inaktive Tuberkulose anderer Organe
 - Iic Exponierte und exponiert gewesene
 Personen
 - Iid Unentschiedene Diagnosen

III Beobachtungsfälle

IV Gesunde (bei der Untersuchung als gesund befunden)

V Morbus Boeck —

und 37 % weiblichen Geschlechts. Im Jahr 1967 ist damit die
 Zahl der aktiv Tuberkulösen absolut und relativ stärker ge-
 fallen als 1966. Der Rückgang betrug 18 900 bzw. 7,9 % (17 584
 bzw. 6,8 %); wie im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre
 war er auch im Berichtsjahr bei den Frauen relativ stärker
 (— 9 %) als bei den Männern (— 7 %).

Im Berichtsjahr litten an der häufigsten Form der Tuber-
 kulose, der nicht ansteckungsfähigen geschlossenen Tuber-
 kulose der Atmungsorgane, 59 % aller Tuberkulosekranken.
 Hier bestehen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede, wohl
 aber bei den anderen Formen der Tuberkulose. Während bei
 den Männern etwa 30 % aller Tuberkulösen an ansteckungs-
 fähiger offener Tuberkulose der Atmungsorgane litten, waren
 es bei den Frauen nur 17 %. An der Tuberkulose anderer Or-
 gane dagegen litten 23 % aller tuberkulösen Frauen, jedoch
 nur 11 % der Männer.

Die Häufigkeit des Vorkommens der Tuberkulose hängt nicht
 allein vom Geschlecht, sondern auch vom Alter ab. Bei den
 Männern steigt die Krankheitshäufigkeit stärker mit dem Alter
 an als bei den Frauen. Während beim männlichen Geschlecht
 65 % aller Tuberkulösen alter als 40 Jahre waren, waren es
 beim weiblichen nur 54 %. Am stärksten altersabhängig ist das
 Vorkommen der Tuberkulose der Atmungsorgane, am wenig-
 sten die Tuberkulose anderer Organe. Der Bestand an Per-
 sonen, die an der Tuberkulose anderer Organe litten, ist
 dagegen gleichmäßiger auf alle Altersgruppen — mit Aus-
 nahme der unter 15jährigen — verteilt. Deutliche Schwer-
 punkte bei der Häufigkeit des Auftretens Tuberkulöser sind
 die Männer im Alter von über 45 Jahren, besonders aber in
 den Altersgruppen der 60- bis 70jährigen. Die Tuberkulose
 anderer Organe kommt besonders häufig bei den Männern
 im Alter von 40 bis unter 50 Jahren und bei den Frauen im
 Alter von 35 bis unter 50 Jahren vor. Die Durchschnittswerte
 liegen hier um 100 bzw. 50 % über dem jeweiligen Durch-
 schnitt aller Altersgruppen.

Im letzten Jahrzehnt hat die Zahl der Tuberkulösen um
 53 % abgenommen (Männer: 50 %, Frauen: 58 %). Von den
 verschiedenen Formen der Tuberkulose ist die ansteckungs-
 fähige offene Tuberkulose der Atmungsorgane relativ am
 stärksten zurückgegangen — nämlich um 57 % —, am schwäch-
 sten — 47 % — die Tuberkulose anderer Organe. Der Rück-
 gang bei der nichtansteckungsfähigen geschlossenen Tuber-
 kulose der Atmungsorgane entspricht dem allgemeinen
 Durchschnitt.

16 000 neue offenen Tuberkulöse

Seit 1966 umfassen die Zugänge in der Statistik neben den
 zum ersten Mal Erkrankten auch die Wiedererkrankten und
 die Übergänge von den Gruppen Iic, Iid, III und V in die
 Gruppe I. Zu den Wiedererkrankten zählen auch die Reakti-
 vierten, das sind die Übergänge aus den Gruppen Iia und Iib
 nach I. Die rückläufige Entwicklung, die in früheren Jahren
 für die Neuzugänge festgestellt worden war, hat sich im Be-
 richtsjahr für die Zugänge fortgesetzt. Die Zugänge betrugen
 1967 54 671 und haben damit gegenüber dem Vorjahr um 9 %
 abgenommen. Im Berichtsjahr ist die Zahl der Zugänge erst-
 mals unter 1 % der Bevölkerung abgesunken.

Im Gegensatz zu den Beständen zeigen die Zugänge beider-
 lei Geschlechts eine wesentlich gleichmäßigere Verteilung
 auf alle Altersgruppen mit Ausnahme der Kinder, die bei der
 ansteckungsfähigen Tuberkulose der Atmungsorgane und bei
 der Tuberkulose anderer Organe wesentlich niedrigere Er-
 krankungsziffern aufweisen als die übrigen Altersgruppen.

Die Zusammensetzung der Zugänge nach den Formen der
 Tuberkulose ähnelt derjenigen des Bestands. (Nichtansteck-
 unfähige Tbk der Atmungsorgane: 57 %, ansteckungs-
 fähige Tbk der Atmungsorgane: 28 %, Tbk anderer Organe:
 15 %).

Erstmalig können 1967 für fast alle Länder (außer Nord-
 rhein-Westfalen und Hessen) die Angaben über die Zugänge

Tabelle 2: Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Jahr	Tuberkulose			
	aller Formen (Ia—I d)	der Atmungsorgane ansteckungs-fähig (offen) (Ia, Ib)	nicht ansteckungs-fähig (ge-schlossen) (Ic)	anderer Organe (extra-pulmonal) (Id)
Männlich				
1966 ¹⁾	34 189	11 506	19 101	3 582
1967 ²⁾	30 924	10 301	17 319	3 304
Weiblich				
1966 ¹⁾	20 834	4 293	12 108	4 433
1967 ²⁾	19 211	3 935	11 043	4 233
Insgesamt				
1966 ¹⁾	55 023	15 799	31 209	8 015
1967 ²⁾	50 135	14 236	28 362	7 537
1966 ³⁾	60 019	17 127	33 914	8 978
1967 ³⁾	54 671	15 535	30 731	8 405
auf 100 000 Einwohner ³⁾				
Männlich				
1966 ¹⁾	133,0	44,8	74,3	13,9
1967 ²⁾	119,5	39,8	67,0	12,8
Weiblich				
1966 ¹⁾	73,3	15,1	42,6	15,6
1967 ²⁾	67,3	13,8	38,7	14,8
Insgesamt				
1966 ¹⁾	101,7	29,2	57,7	14,8
1967 ²⁾	92,1	26,2	52,1	13,8
1966 ³⁾	100,6	28,7	56,9	15,1
1967 ³⁾	91,7	26,0	51,5	14,1


¹⁾ Ohne Hessen. — ²⁾ Einschl. Hessen. — ³⁾ 1967 vorläufiges Ergebnis.

auch nach erstmals bekannt gewordenen Tuberkulosen und Wiedererkrankten differenziert dargestellt werden. Während im Durchschnitt aller Altersgruppen 74 % aller Zugänge Ersterkrankte und 26 % Wiedererkrankte sind, schwankt der Anteil der Ersterkrankten zwischen 96 % bei den unter 1jähri-gen und 65 % bei den 65- bis 70jährigen. Daß in höheren Altersgruppen wieder ein Ansteigen der Ersterkrankten fest-gestellt wurde, dürfte auf Schwierigkeiten bei der Erfassung bzw. der Anamnese beruhen. Die Zahl der Ersterkrankten liegt bei der offenen Tuberkulose der Atmungsorgane gering-fügig unter und bei der Tuberkulose anderer Organe um etwa 15 % über dem Durchschnitt.

Tabelle 3: Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Erst- und Wiedererkrankung 1967

Alter von ... bis unter ... Jahren	Zugänge insgesamt	Davon waren			
		erstmalig bekannt gewordene Tuberkulose		Wiedererkrankte	
Form der Tuberkulose		Anzahl	%	Anzahl	%
Bundesgebiet (ohne Nordrhein-Westfalen und Hessen)					
unter 1	91	87	95,6	4	4,4
1—5	1 440	1 378	95,7	62	4,3
5—10	2 286	2 067	90,4	219	9,6
10—15	1 395	1 189	85,2	206	14,8
15—20	2 273	1 985	87,3	288	12,7
20—25	2 637	2 286	86,7	351	13,3
25—30	2 892	2 352	81,3	540	18,7
30—35	2 640	1 997	75,6	643	24,4
35—40	2 551	1 799	70,5	752	29,5
40—45	2 690	1 756	65,3	934	34,7
45—50	2 266	1 453	64,1	813	35,9
50—55	2 306	1 400	60,7	906	39,3
55—60	3 077	1 951	63,4	1 126	36,6
60—65	3 050	1 938	63,5	1 112	36,5
65—70	2 430	1 497	61,6	933	38,4
70—75	1 648	1 113	67,5	535	32,5
75—80	973	689	70,8	284	29,2
80 und älter	658	528	80,2	130	19,8
Insgesamt	37 303	27 465	73,6	9 838	26,4
Bundesgebiet ohne Hessen					
Tbk der Atmungs- organe (offen) ...	14 236	10 401	73,1	3 835	26,9
(geschlossen)	28 362	21 063	74,3	7 299	25,7
Tbk anderer Organe	7 537	6 305	83,7	1 232	16,3
Insgesamt dagegen	50 135	37 769	75,3	12 366	24,7
1966	55 023	41 617	75,6	13 406	24,4

Der Nachweis, der im letztjährigen Tuberkulosebericht geführt wurde, daß nämlich der Rückgang bei den Beständen vorwiegend in den jüngeren Jahren stattfindet, gilt mit ge-wissen Einschränkungen auch für die Zugänge. Während bei den unter 45jährigen in den meisten Altersgruppen ein Rück-gang zu verzeichnen ist, wurde bei den höheren Altersgrup-pen vielfach eine Zunahme des Zugangs festgestellt. Die Zu-nahme gilt für beide Geschlechter und für alle Formen der Tuberkulose. Ein besonders starker Zugang (+ 23 %) wurde an tuberkulösen Frauen im Alter von 45 bis 50 registriert, die an Tuberkulose anderer Organe litten. Im Gegensatz zur allgemeinen Altersverteilung wurde bei den unter 1jährigen



Mädchen ein Ansteigen des Zugangs an Tuberkulösen sämtlicher Formen, bei den Knaben ein Ansteigen des Zugangs bei der Tuberkulose anderer Organe festgestellt. Bei den 1- bis 5jährigen Mädchen zeichnet sich eine Stagnation des Zugangs an ansteckungsfähiger offener Lungentuberkulose ab. Wegen des gleichwohl geringen zahlenmäßigen Vorkommens der Tuberkulose in den Altersgruppen der Kinder lassen sich aus dieser Gegenüberstellung zweier Jahre jedoch keine sicheren Schlüsse für die Entwicklung der Tuberkulose ziehen.

Tuberkulosesterblichkeit erreicht neuen Tiefstand

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik 1967 starben 6 414 Menschen an Tuberkulose, von denen 76 % männlichen Geschlechts waren. Der Anteil der Tuberkulose der Atmungsorgane an den Sterbefällen beträgt 93 %. Während die Sterblichkeit an Tuberkulose 1966 nur um 6 % zurückgegangen ist, ist sie 1967 bei beiden Geschlechtern um 11 % gefallen. Die Tuberkulosesterblichkeit hat damit mit 17 Sterbefällen bei Männern und 5 Sterbefällen bei Frauen auf jeweils 100 000 Einwohner ihren bisher niedrigsten Stand in der Bundesrepublik erreicht. Wie die altersspezifische Gliederung der Sterbefälle für das Jahr 1966 zeigt, ist der Anteil der Tuberkulosesterbefälle unter den 40- bis 45jährigen Gestorbenen mit 4 % beim männlichen Geschlecht und mit 2 % beim weiblichen Geschlecht besonders hoch, obwohl die Mehrzahl der Sterbefälle in den höheren Altersgruppen liegt.

Krankenhausbetten für Tuberkulosekranke

Ende 1966 gab es in den Krankenhäusern des Bundesgebietes 41 697 Krankenbetten für Tuberkulosekranke, das waren 5,4 % weniger als im Vorjahr. Der Rückgang an Tuberkulosebetten hat sich damit im Berichtsjahr verstärkt fortgesetzt. Besonders stark war der Bettenrückgang in Fachabteilungen von allgemeinen Krankenhäusern (16,7 %), während der Bettenrückgang in Fachkrankenhäusern für Tuberkulose und entsprechenden Heilstätten nur 4,2 % betrug. In den Tuberkulosekrankenhäusern wurden 1966 111 113 Kranke stationär behandelt. Von ihnen waren 31 % weib-

lichen Geschlechts. Der Krankenzugang im Jahre 1966 in den Tuberkulosekrankenhäusern betrug 83 507, von denen 68,5 % Männer waren. Die Zahl der abgeschlossenen Tbk-Behandlungen, die 1966 von der Rentenversicherung durchgeführt wurden, betrug 75 427, darunter 61 % bei Männern. Die Zahl der Behandlungen hat damit gegenüber dem Vorjahr um 5 % abgenommen.

Zusammenfassung

Von den 221 090 aktiven Tuberkulösen, die Ende 1967 bei den Tuberkulosefürsorgestellten registriert wurden, waren 63 % männlichen und 37 % weiblichen Geschlechts. Die rückläufige Entwicklung des Bestandes, die im Vorjahr 6,8 % betragen hatte, hat sich mit 7,9 % verstärkt fortgesetzt. 59 % aller Tuberkulosekranken litten an einer geschlossenen Tuberkulose der Atmungsorgane, 27 % an ansteckungsfähiger offener Tuberkulose der Atmungsorgane und 14 % an Tuberkulose anderer Organe. Die Tuberkulose ist in den älteren Jahrgängen, vor allem bei den Männern, wesentlich häufiger als bei der Bevölkerung im mittleren und jüngeren Alter. Die Verlagerung auf die höheren Altersgruppen hat sich im Berichtsjahr fortgesetzt. Die Zahl der Zugänge belief sich 1967 auf 54 671, das waren 9 % weniger als im Vorjahr. Die Verlagerung der Tuberkulosen auf die höheren Altersjahrgänge tritt hier noch stärker in Erscheinung. Bei den gemeldeten Zugängen handelt es sich zu 74 % um Ersterkrankte und zu 26 % um Wiedererkrankte. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik 1967 starben 6 414 Menschen an Tuberkulose, 11 % weniger als im Jahre zuvor. 76 % von ihnen waren männlichen Geschlechts. Ende 1966 gab es in den Krankenhäusern des Bundesgebietes 41 697 Krankenbetten für Tuberkulosekranke. In den Tuberkulosekrankenhäusern und Heilstätten wurden 111 113 Patienten stationär behandelt; der Zugang an Kranken belief sich auf 83 507. 1966 wurden von der Rentenversicherung 75 427 stationäre Tuberkulosebehandlungen durchgeführt.

Tabelle 4: Sterbefälle an Tuberkulose

Jahr	aller Formen (Ia—Id)			Gestorbene an Tuberkulose der Atmungsorgane (Ia—Ic)			anderer Organe (extrapulmonal) (Id)		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
1965	7 574	5 707	1 867	7 097	5 457	1 640	477	250	227
1966	7 138	5 392	1 746	6 696	5 189	1 507	442	203	239
1967 ¹⁾	6 414	4 844	1 570	5 978	4 644	1 334	436	200	236
auf 100 000 Einwohner									
1957	19,3	28,8	11,0	17,5	26,9	9,3	1,7	1,8	1,6
1960	16,5	25,8	8,3	15,3	24,5	7,2	1,2	1,3	1,1
1964	12,6	19,9	6,2	11,8	19,0	5,3	0,9	0,9	0,9
1965	12,8	20,4	6,0	12,0	19,5	5,3	0,8	0,9	0,7
1966	12,0	19,0	5,6	11,2	18,3	4,8	0,7	0,7	0,8
1967 ¹⁾	10,7	17,0	5,0	10,0	16,3	4,2	0,7	0,7	0,8

¹⁾ Vorläufige Ergebnisse.

1. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1967 nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose											
	aller Formen (I a - I d)			der Atmungsorgane						anderer Organe (extrapulmonal) (I d)		
				ansteckungsfähig (offen) (I a, I b)			nichtansteckungsfähig (geschlossen) (I c)					
	insgesamt	männl.	weibl.	zusammen	männl.	weibl.	zusammen	männl.	weibl.	zusammen	männl.	weibl.
Bestand am Jahresende												
Anzahl												
unter 1	165	91	74	6	2	4	139	78	61	20	11	9
1 - 5	4 153	2 135	2 018	93	38	55	3 752	1 948	1 804	308	149	159
5 - 10	8 101	4 406	3 695	146	79	67	7 270	3 994	3 276	685	333	352
10 - 15	5 562	2 810	2 752	261	91	170	4 376	2 264	2 112	925	455	470
15 - 20	8 693	4 495	4 198	1 458	809	649	5 842	2 993	2 849	1 393	693	700
20 - 25	12 609	7 232	5 377	2 178	1 388	790	8 412	4 920	3 492	2 019	924	1 095
25 - 30	15 521	8 898	6 623	3 092	2 030	1 062	9 548	5 517	4 031	2 881	1 351	1 530
30 - 35	15 279	9 006	6 273	3 404	2 439	965	8 750	5 142	3 608	3 125	1 425	1 700
35 - 40	17 051	10 456	6 595	4 250	3 134	1 116	9 236	5 630	3 606	3 565	1 692	1 873
40 - 45	18 387	11 363	7 024	4 592	3 389	1 203	10 026	6 149	3 877	3 769	1 825	1 944
45 - 50	16 642	10 490	6 152	4 421	3 266	1 155	9 087	5 705	3 382	3 134	1 519	1 615
50 - 55	17 037	11 406	5 631	4 914	3 830	1 084	9 426	6 319	3 107	2 697	1 257	1 440
55 - 60	21 990	15 847	6 143	6 895	5 711	1 184	12 131	8 775	3 356	2 964	1 361	1 603
60 - 65	22 140	16 486	5 654	7 195	6 048	1 147	12 344	9 243	3 101	2 601	1 195	1 406
65 - 70	17 419	12 512	4 907	5 888	4 781	1 107	9 536	6 867	2 669	1 995	864	1 131
70 - 75	10 650	6 827	3 823	3 583	2 633	950	5 732	3 727	2 005	1 335	467	8 868
75 - 80	6 147	3 616	2 531	2 112	1 430	682	3 306	1 948	1 358	729	238	491
80 und mehr	3 544	1 929	1 615	1 233	766	467	1 836	992	844	475	171	304
Insgesamt	221 090	140 005	81 085	55 721	41 864	13 857	130 749	82 211	48 538	34 620	15 930	18 690
Auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts ¹⁾												
unter 1	16,1	17,3	14,8	(0,6)	(0,4)	(0,8)	13,5	14,8	12,2	(1,9)	(2,1)	(1,8)
1 - 5	101,9	102,3	101,6	2,3	(1,8)	2,8	92,1	93,3	90,8	7,6	7,1	8,0
5 - 10	176,3	187,1	165,0	3,2	3,4	3,0	158,2	169,6	146,3	14,9	14,1	15,7
10 - 15	139,5	137,6	141,4	6,5	4,5	8,7	109,7	110,9	108,5	23,2	22,3	24,2
15 - 20	222,4	224,1	220,7	37,3	40,3	34,1	149,5	149,2	149,8	35,6	34,5	36,8
20 - 25	335,5	373,7	294,9	57,9	71,7	43,3	223,8	254,2	191,5	53,7	47,7	60,1
25 - 30	305,9	334,6	274,3	60,9	76,3	44,0	188,2	207,5	166,9	56,8	50,8	63,4
30 - 35	366,4	413,5	314,9	81,6	112,0	48,4	209,8	236,1	181,1	74,9	65,4	85,3
35 - 40	429,3	512,0	341,8	107,0	153,5	57,8	232,5	275,7	186,9	89,8	82,8	97,1
40 - 45	481,5	573,1	329,7	120,3	200,7	56,5	262,6	364,2	182,0	98,7	108,1	91,3
45 - 50	534,6	600,4	341,3	142,0	249,2	64,1	291,9	435,3	187,6	100,7	115,9	89,6
50 - 55	500,7	794,1	286,4	144,4	266,7	55,1	277,0	435,9	158,0	79,3	87,5	73,2
55 - 60	561,1	941,0	274,9	175,9	339,1	53,0	309,6	521,0	150,2	75,6	80,8	71,7
60 - 65	611,6	1 029,0	280,2	198,7	377,5	56,8	341,0	576,9	153,7	71,8	74,6	69,7
65 - 70	596,3	1 027,2	288,1	201,6	392,5	65,0	326,4	563,7	156,7	68,3	70,9	66,4
70 - 75	517,7	902,7	293,9	174,2	348,1	73,0	278,6	492,8	154,1	64,9	61,7	66,7
75 - 80	458,3	738,0	297,3	157,5	291,8	80,1	246,5	397,6	159,5	54,4	48,6	57,1
80 und mehr	342,1	503,1	247,5	119,0	199,8	71,6	177,2	258,7	129,3	45,8	44,6	46,6
Insgesamt	369,8	493,0	258,3	93,2	147,4	44,1	218,7	289,5	154,6	57,9	56,1	59,5
Zugänge ²⁾												
Anzahl												
unter 1	129	58	71	6	2	4	109	48	61	14	8	6
1 - 5	1 787	928	859	37	16	21	1 625	841	784	125	71	54
5 - 10	2 774	1 499	1 275	50	28	22	2 539	1 375	1 164	185	96	89
10 - 15	1 718	926	792	99	41	58	1 409	632	532	210	108	102
15 - 20	2 976	1 597	1 379	666	367	299	1 970	1 072	898	340	158	182
20 - 25	3 489	2 028	1 461	896	547	349	2 091	1 263	828	502	218	284
25 - 30	3 923	2 284	1 639	1 131	755	376	2 079	1 207	872	713	322	391
30 - 35	3 699	2 281	1 418	1 037	756	281	1 895	1 163	732	767	362	405
35 - 40	3 629	2 257	1 372	1 085	833	252	1 793	1 069	724	751	355	396
40 - 45	3 835	2 357	1 478	1 171	864	307	1 876	1 139	737	788	354	434
45 - 50	3 171	1 993	1 178	943	707	256	1 610	1 016	594	618	270	348
50 - 55	3 250	2 137	1 113	991	763	228	1 733	1 148	585	526	226	300
55 - 60	4 178	2 956	1 222	1 496	1 240	256	2 140	1 485	655	542	231	311
60 - 65	4 171	3 057	1 114	1 555	1 314	241	2 118	1 537	581	498	206	292
65 - 70	3 240	2 221	1 019	1 293	989	304	1 533	1 077	456	414	155	259
70 - 75	2 124	1 264	860	875	568	307	983	619	364	266	77	189
75 - 80	1 243	676	567	544	332	212	546	301	245	153	43	110
80 und mehr	799	405	394	361	179	182	313	182	131	125	44	81
Insgesamt	50 135	30 924	19 211	14 236	10 301	3 935	28 362	17 319	11 043	7 537	3 304	4 233
Auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts ¹⁾												
unter 1	13,7	12,0	15,5	(0,6)	(0,4)	(0,9)	11,6	(10,0)	13,3	(1,5)	(1,7)	(1,3)
1 - 5	48,0	48,6	47,3	(1,0)	(0,8)	(1,2)	43,6	44,0	43,2	3,4	3,7	5,0
5 - 10	66,9	70,4	63,2	1,2	(1,3)	(1,1)	61,2	64,6	57,7	4,5	4,5	4,4
10 - 15	47,3	49,8	44,8	2,7	(2,2)	3,3	38,8	41,7	35,7	5,8	5,8	5,8
15 - 20	84,7	88,3	80,8	18,9	20,3	17,5	56,0	59,3	52,6	9,7	8,7	10,7
20 - 25	98,0	110,2	85,0	25,2	29,7	20,3	58,8	68,6	48,2	14,1	11,8	16,5
25 - 30	85,1	94,4	74,9	24,5	31,2	17,2	45,1	49,9	39,8	15,5	13,3	17,9
30 - 35	99,1	116,8	79,7	27,8	30,7	15,8	50,8	59,6	41,1	20,6	18,5	22,8
35 - 40	99,8	121,7	77,0	29,8	44,9	14,2	49,3	57,6	40,7	20,7	19,1	22,2
40 - 45	109,6	154,0	75,0	33,5	56,4	15,6	53,6	74,4	37,4	22,5	23,1	22,0
45 - 50	118,4	176,7	76,0	35,2	62,7	15,2	60,1	90,1	38,3	23,1	23,9	22,5
50 - 55	99,6	154,7	59,2	30,4	55,2	12,1	53,1	83,1	31,1	16,1	16,4	16,0
55 - 60	116,2	190,5	59,8	41,6	79,9	12,5	59,5	95,7	32,0	15,1	14,9	15,2
60 - 65	126,8	208,9	61,0	47,3	89,8	13,2	64,4	105,0	31,8	15,1	14,1	16,0
65 - 70	123,6	204,7	66,3	49,3	91,1	19,8	58,5	99,3	29,7	15,8	14,3	16,8
70 - 75	114,9	185,6	73,7	47,3	83,4	26,3	53,2	90,9	31,2	14,4	11,3	16,2
75 - 80	102,9	152,2	74,3	45,0	74,8	27,8	45,2	67,8	32,1	12,7	(9,7)	14,4
80 und mehr	86,0	116,9	61,7	38,9	51,7	31,3	33,7	52,5	22,5	13,5	(12,7)	13,9
Insgesamt	92,1	119,5	67,3	26,2	39,8	13,8	52,1	67,0	38,7	13,8	12,8	14,8

1) Vorläufige Ergebnisse. Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - 2) Bundesgebiet ohne Hessen.

2. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1967 nach Ländern und Altersgruppen

a) Grundzahlen

von Alter unter bis unter Jahren	Bundes- gebiet	Schlesw.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nordrh.- Westfalen	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Bestand am Jahresende												
Männlich												
unter 1	91	4	-	10	1	37	1	4	3	27	1	3
1 - 5	2 135	92	19	175	8	638	144	108	335	557	27	32
5 - 10	4 406	201	87	300	29	1 298	333	327	754	838	102	137
10 - 15	2 810	116	86	243	28	832	182	252	412	454	68	137
15 - 20	4 495	232	160	521	53	1 344	311	340	609	634	119	172
20 - 25	7 232	422	394	764	79	2 231	504	425	901	971	126	415
25 - 30	8 898	455	567	881	127	2 618	648	428	1 161	1 162	173	678
30 - 35	9 006	345	492	867	120	2 859	710	505	1 205	1 099	167	637
35 - 40	10 456	378	518	1 074	114	3 462	774	640	1 271	1 339	221	665
40 - 45	11 363	422	609	1 213	139	3 589	842	769	1 345	1 512	224	699
45 - 50	10 490	415	540	962	139	3 343	787	733	1 218	1 426	203	724
50 - 55	11 406	469	743	1 411	147	3 409	677	681	1 080	1 588	193	1 008
55 - 60	15 847	663	974	1 621	155	4 157	1 054	1 086	1 857	2 435	345	1 500
60 - 65	16 486	698	1 024	1 646	162	4 364	1 085	1 105	1 783	2 664	367	1 588
65 - 70	12 512	523	742	1 167	101	3 285	841	833	1 335	2 118	266	1 303
70 - 75	6 827	317	440	715	75	1 605	466	424	708	1 259	123	695
75 - 80	3 616	212	242	372	36	843	223	209	377	642	74	386
80 und mehr	1 929	87	105	211	17	371	149	131	229	344	40	245
Zusammen	140 005	6 051	7 742	14 153	1 530	40 285	9 731	9 000	16 581	21 069	2 839	11 024
Weiblich												
unter 1	74	2	-	7	2	29	2	4	6	22	-	-
1 - 5	2 018	80	18	180	12	645	163	108	273	479	24	36
5 - 10	3 695	161	77	237	26	1 117	284	281	592	703	85	122
10 - 15	2 752	101	85	270	19	950	176	198	358	377	72	127
15 - 20	4 198	200	169	513	51	1 246	321	294	549	543	114	198
20 - 25	5 377	277	329	593	84	1 620	362	332	668	658	85	369
25 - 30	6 623	340	438	731	99	1 909	481	325	812	767	124	597
30 - 35	6 273	290	418	688	65	1 984	479	318	706	639	115	571
35 - 40	6 595	269	439	758	92	2 134	427	431	696	661	93	595
40 - 45	7 024	292	452	805	103	2 237	475	439	704	770	128	619
45 - 50	6 152	246	437	578	108	1 932	405	395	613	697	99	642
50 - 55	5 631	239	437	697	81	1 732	337	282	486	661	73	606
55 - 60	6 143	261	453	584	92	1 697	390	343	616	828	84	795
60 - 65	5 654	254	381	632	76	1 437	380	306	609	820	57	702
65 - 70	4 907	185	328	566	38	1 165	314	273	533	868	46	591
70 - 75	3 823	174	257	459	25	734	278	214	424	757	48	453
75 - 80	2 531	152	154	329	17	486	156	130	285	467	33	322
80 und mehr	1 615	70	85	203	9	289	82	93	198	333	8	245
Zusammen	81 085	3 593	4 957	8 839	999	23 343	5 512	4 766	9 128	11 050	1 288	7 610
Insgesamt												
Insgesamt	221 090	9 644	12 699	22 992	2 529	63 628	15 243	13 766	25 709	32 119	4 127	18 634
Zugänge ¹⁾												
Männlich												
unter 1	58	1	-	2	1	16	.	5	5	26	2	-
1 - 5	928	42	11	40	5	170	.	61	238	331	13	17
5 - 10	1 499	58	31	88	11	265	.	96	413	468	40	29
10 - 15	926	33	20	83	7	171	.	89	247	225	20	31
15 - 20	1 597	54	42	169	13	386	.	124	366	341	55	47
20 - 25	2 028	111	86	249	29	478	.	123	418	398	46	90
25 - 30	2 284	129	115	210	47	623	.	97	467	395	56	145
30 - 35	2 281	79	105	237	44	627	.	112	509	425	41	102
35 - 40	2 257	80	80	209	41	684	.	127	454	417	57	108
40 - 45	2 357	93	83	272	39	690	.	158	460	413	47	102
45 - 50	1 993	80	82	210	26	597	.	124	358	400	36	80
50 - 55	2 137	84	116	216	38	666	.	117	372	366	40	122
55 - 60	2 956	135	121	308	43	817	.	192	471	593	85	191
60 - 65	3 057	127	131	357	37	888	.	198	412	630	79	198
65 - 70	2 221	94	72	268	30	575	.	127	344	503	53	155
70 - 75	1 264	65	47	166	20	289	.	67	195	294	21	100
75 - 80	676	47	19	85	7	152	.	32	103	143	27	61
80 und mehr	405	19	10	65	6	77	.	14	72	89	12	41
Zusammen	30 924	1 331	1 171	3 234	444	8 171	.	1 863	5 904	6 457	730	1 619
Weiblich												
unter 1	71	1	1	2	-	22	.	4	13	28	-	-
1 - 5	859	34	6	31	3	177	.	49	195	330	13	21
5 - 10	1 275	47	24	75	18	223	.	90	325	414	27	32
10 - 15	792	24	20	84	12	152	.	57	198	196	26	27
15 - 20	1 379	66	38	177	19	317	.	111	295	268	47	41
20 - 25	1 461	94	66	145	26	374	.	99	302	246	30	79
25 - 30	1 639	101	79	186	39	408	.	71	355	284	29	87
30 - 35	1 418	68	48	180	26	432	.	61	296	213	29	65
35 - 40	1 372	71	51	165	34	394	.	82	296	195	22	62
40 - 45	1 478	67	42	182	18	455	.	80	292	211	36	95
45 - 50	1 178	64	66	115	29	308	.	86	236	185	20	69
50 - 55	1 113	52	44	154	18	278	.	53	224	199	14	77
55 - 60	1 222	66	47	160	16	284	.	57	239	220	24	109
60 - 65	1 114	62	36	142	17	233	.	62	203	259	14	86
65 - 70	1 019	39	38	138	12	235	.	52	186	215	15	89
70 - 75	860	45	25	122	5	187	.	50	130	198	16	82
75 - 80	567	33	18	88	10	118	.	23	83	130	10	54
80 und mehr	394	22	18	61	5	64	.	15	62	95	-	52
Zusammen	19 211	956	667	2 207	307	4 661	.	1 102	3 930	3 886	372	1 123
Insgesamt												
Insgesamt	50 135	2 287	1 838	5 441	751	12 832	.	2 965	9 834	10 343	1 102	2 742

1) Bundesgebiet ohne Hessen. Einschl. der Übergänge aus den Gruppen II c, II d, III und V sowie der Reaktivierten.

2. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1967 nach Ländern und Altersgruppen

b) Verhältniszahlen auf 100000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts¹⁾

Alter von ... bis unter ... Jahre	Bundes- gebiet	Schlesw.- Holst.	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Bestand am Jahresende												
Männlich												
unter 1	17,3	(17,3)	-	(15,4)	(15,2)	(25,2)	(2,3)	(12,3)	(3,7)	(29,8)	(10,2)	(23,4)
1 - 5	102,3	103,3	(36,6)	68,5	(32,4)	109,1	82,2	81,3	105,5	153,4	(65,2)	(62,4)
5 - 10	187,1	214,7	160,2	105,8	(109,8)	194,0	169,6	208,4	212,2	200,9	197,7	271,3
10 - 15	137,6	144,1	192,8	97,6	(127,9)	141,2	106,5	177,1	137,5	128,2	147,8	314,9
15 - 20	224,1	272,9	313,7	211,3	226,5	242,0	173,8	261,3	210,0	181,8	282,7	314,4
20 - 25	373,7	429,3	604,3	335,1	302,7	434,7	295,6	415,4	319,6	289,3	413,1	495,2
25 - 30	334,6	387,9	642,9	296,6	347,0	352,6	274,7	300,6	286,6	256,2	381,1	709,9
30 - 35	413,5	410,2	744,3	367,4	442,8	437,8	369,0	406,3	360,2	309,5	413,4	980,0
35 - 40	512,0	534,7	913,6	486,0	483,1	547,7	421,8	520,3	419,3	398,3	560,9	1 250,0
40 - 45	673,1	695,2	1 225,4	645,9	681,4	705,8	532,9	749,5	557,6	534,3	660,8	1 648,6
45 - 50	800,4	816,9	1 270,6	658,9	789,8	868,3	655,8	955,7	667,4	638,6	799,2	1 770,2
50 - 55	794,1	811,4	1 532,0	843,9	738,7	825,0	531,4	806,9	547,9	658,1	731,1	1 898,3
55 - 60	941,0	954,0	1 650,8	820,3	671,0	879,6	699,9	1 099,2	808,4	871,5	1 116,5	2 054,8
60 - 65	1 029,0	1 044,9	1 768,6	874,1	764,2	963,4	756,6	1 157,1	856,0	1 016,4	1 223,3	2 100,5
65 - 70	1 027,2	992,4	1 690,2	786,4	660,1	995,5	766,6	1 121,1	840,5	1 029,2	1 225,8	2 254,3
70 - 75	902,7	868,5	1 501,7	753,4	765,3	827,3	672,4	936,0	732,9	972,2	1 008,2	1 791,2
75 - 80	738,0	834,6	1 198,0	589,5	(529,4)	683,1	491,2	723,2	613,0	791,6	1 000,0	1 445,7
80 und mehr	503,1	400,9	673,1	423,7	(320,8)	388,5	407,1	592,8	478,1	547,8	(701,0)	1 189,3
zusammen	493,0	511,2	902,0	425,7	430,0	499,7	388,0	524,8	405,3	436,9	525,7	1 173,0
Weiblich												
unter 1	14,8	(9,0)	-	(11,3)	(32,8)	(20,7)	(4,8)	(13,1)	(7,8)	(25,4)	-	-
1 - 5	101,6	94,5	(36,4)	74,2	(51,7)	116,1	98,1	85,0	90,5	137,8	(60,0)	(73,8)
5 - 10	165,0	181,3	148,1	88,7	(104,0)	175,0	152,6	188,8	174,8	176,7	174,5	275,6
10 - 15	141,4	133,2	200,0	118,3	(91,8)	168,5	108,7	146,1	124,7	111,8	161,8	334,1
15 - 20	220,7	254,8	342,8	222,9	228,7	235,3	189,5	238,6	199,4	163,5	285,0	380,0
20 - 25	294,9	359,3	517,3	295,8	324,3	321,0	224,3	341,9	245,7	208,0	269,8	503,4
25 - 30	274,3	340,0	560,1	274,7	311,3	282,1	226,8	239,3	223,4	182,7	274,9	697,4
30 - 35	314,9	373,2	674,2	309,1	260,0	339,6	275,3	272,5	241,5	190,2	298,7	904,9
35 - 40	341,8	379,4	751,7	348,5	386,6	372,6	253,0	366,5	251,8	201,7	246,0	1 031,2
40 - 45	329,7	364,1	686,9	333,5	388,7	361,6	248,0	332,1	238,1	209,0	301,2	922,5
45 - 50	341,3	341,2	739,4	283,2	455,7	381,1	251,9	371,2	244,2	221,5	298,2	914,5
50 - 55	286,4	296,2	668,2	303,0	315,2	314,1	198,8	244,6	180,8	197,9	205,6	674,1
55 - 60	274,9	284,6	583,0	228,7	316,2	274,3	200,0	259,7	204,3	221,2	205,4	671,5
60 - 65	280,2	308,3	524,8	276,6	295,7	259,1	213,1	253,3	229,5	242,1	157,9	608,8
65 - 70	288,1	255,2	510,1	284,0	(175,9)	258,0	209,8	270,3	241,6	298,5	(160,8)	573,3
70 - 75	293,9	295,9	482,2	296,9	(144,5)	219,9	246,2	289,2	255,9	340,5	(242,4)	511,9
75 - 80	297,3	374,4	438,7	317,9	(146,6)	226,2	211,1	274,3	265,4	330,3	(277,3)	507,1
80 und mehr	247,5	206,5	312,5	249,7	(102,3)	182,9	140,4	256,9	236,0	307,5	(96,4)	507,2
zusammen	258,3	278,8	501,2	242,7	253,7	266,0	201,8	251,1	205,4	204,9	217,5	610,7
Insgesamt												
Insgesamt	369,8	390,1	687,4	330,0	337,4	377,9	290,9	301,0	301,3	314,4	364,5	852,7
Zugänge²⁾												
Männlich												
unter 1	12,0	(4,4)	-	(3,1)	(15,4)	(10,8)	.	(15,5)	(6,2)	(28,6)	(20,2)	.
1 - 5	48,6	(47,7)	(21,3)	(15,8)	(20,3)	29,1	.	45,7	75,0	91,0	(31,0)	(33,5)
5 - 10	70,4	63,5	58,2	31,5	(42,5)	40,0	.	61,9	117,8	113,8	(78,4)	(59,1)
10 - 15	49,8	(41,1)	(44,7)	33,4	(32,3)	29,2	.	62,6	83,2	64,0	(43,6)	(70,0)
15 - 20	88,3	63,7	(81,2)	69,2	(55,3)	70,2	.	98,3	127,6	98,4	135,1	(87,4)
20 - 25	110,2	110,0	125,2	105,0	(109,0)	89,2	.	115,6	141,1	115,1	(141,5)	98,9
25 - 30	94,4	112,3	131,9	70,9	(130,6)	83,4	.	67,8	115,0	88,0	121,0	156,8
30 - 35	116,8	97,9	164,3	102,3	(169,2)	91,1	.	91,2	154,0	121,8	(102,8)	163,7
35 - 40	121,7	114,8	140,6	94,6	(174,5)	108,4	.	103,3	149,9	124,4	144,7	204,5
40 - 45	154,0	151,7	164,7	144,7	(188,4)	136,1	.	154,3	190,4	145,9	(138,6)	240,6
45 - 50	176,7	166,7	203,0	151,7	(155,7)	163,5	.	171,5	207,3	190,1	(150,0)	202,5
50 - 55	154,7	137,9	225,7	122,3	(181,0)	153,6	.	132,1	177,7	143,5	(143,9)	214,0
55 - 60	190,5	192,9	201,7	154,5	(184,5)	170,4	.	192,0	202,9	210,8	270,7	255,0
60 - 65	208,9	190,4	225,5	188,9	(175,4)	195,5	.	206,3	196,8	239,2	262,5	262,3
65 - 70	204,7	181,1	166,3	184,4	(200,0)	178,6	.	175,7	221,6	248,9	251,2	271,9
70 - 75	185,6	179,6	(160,4)	176,2	(206,2)	150,4	.	148,9	203,5	229,5	(176,5)	259,1
75 - 80	152,2	(185,0)	(93,1)	135,4	(102,9)	123,0	.	(111,9)	167,8	177,4	(360,0)	226,8
80 und mehr	116,9	(88,0)	(64,1)	130,8	(109,4)	80,7	.	(63,3)	150,3	142,2	(214,3)	(201,0)
zusammen	119,5	113,2	136,1	97,4	125,5	101,4	.	108,8	144,2	134,3	155,0	171,9
Weiblich												
unter 1	15,5	(4,5)	(7,6)	(3,2)	-	(15,7)	.	(13,0)	(11,0)	(22,5)	-	-
1 - 5	47,3	(40,8)	(12,1)	(12,9)	(13,1)	31,9	.	(38,6)	64,9	94,9	(32,3)	(40,5)
5 - 10	63,2	(54,2)	(47,1)	28,6	(73,5)	39,4	.	61,3	97,8	106,0	(55,9)	(68,7)
10 - 15	44,8	(31,8)	(47,1)	35,8	(58,5)	27,2	.	42,5	10,0	58,8	(58,7)	(55,2)
15 - 20	80,8	84,5	(76,3)	77,8	(84,4)	60,8	.	92,9	109,6	81,3	(122,4)	(80,4)
20 - 25	85,0	118,2	99,7	69,9	(97,7)	71,9	.	98,1	101,5	75,9	(90,4)	100,5
25 - 30	74,9	102,4	101,3	70,1	(123,8)	60,3	.	52,3	98,8	68,4	(63,6)	104,2
30 - 35	79,7	90,5	(79,3)	82,6	(106,6)	75,3	.	53,2	103,8	64,7	(77,1)	106,4
35 - 40	77,0	99,2	85,3	74,9	(141,1)	68,0	.	68,7	106,4	58,8	(57,9)	105,1
40 - 45	75,0	81,8	(62,3)	74,1	(66,2)	72,6	.	59,8	97,4	56,3	(82,5)	137,7
45 - 50	76,0	93,8	117,2	59,6	(130,0)	64,3	.	89,9	100,2	62,5	(63,9)	101,8
50 - 55	59,2	61,5	(64,0)	64,0	(66,9)	48,3	.	44,0	99,5	56,9	(37,9)	80,5
55 - 60	59,8	72,1	(59,8)	62,7	(55,0)	45,7	.	43,1	79,4	58,9	(58,4)	90,1
60 - 65	61,0	75,9	(49,9)	62,6	(66,9)	42,4	.	51,8	77,2	76,9	(59,2)	75,2
65 - 70	66,3	(53,9)	(59,0)	69,9	(56,1)	52,7	.	52,3	85,5	74,8	(53,6)	86,2
70 - 75	73,7	(77,9)	(47,6)	80,3	(29,4)	57,0	.	68,7	80,0	90,9	(82,9)	95,7
75 - 80	74,3	(82,9)	(52,2)	86,2	(88,5)	56,0	.	(49,6)	78,6	93,8	(85,5)	86,3
80 und mehr	67,7	(65,7)	(66,9)	76,5	(57,5)	41,3	.	(42,1)	75,5	89,6	-	110,9
zusammen	67,3	74,6	67,3	60,8	78,2	53,3	.	58,3	89,0	72,4	63,0	89,9
Insgesamt												
Insgesamt	92,1	93,1	99,3	78,3	100,6	76,3	.	82,3	115,6	101,6	97,4	125,1

1) Vorläufige Ergebnisse. Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - 2) Bundesgebiet ohne Hessen. Einschl. der Übergänge aus den Gruppen II c, II d, III und V sowie der Reaktivierten.