

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Tuberkulose

1970



Bestellnummer: 200720 – 70

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Textteil	
Vorbemerkung	3
Bestand	3
Zugänge	4
Tuberkulosesterblichkeit	4
Krankenhausbetten für Tuberkulose-Kranke	5
Zusammenfassung	5

Tabellenteil

1. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1970 nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Altersgruppen .	6
2. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1970 nach Ländern und Altersgruppen	
a) Grundzahlen	7
b) Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose 1970

Vorbemerkung

Wie bisher wird über die Tuberkulosestatistik 1970 ein eigener Bericht vorgelegt, da die Tuberkulose unter den nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. Juli 1961 zu meldenden übertragbaren Krankheiten eine überragende Stellung einnimmt.

Die statistischen Ergebnisse werden jährlich vom Statistischen Bundesamt auf Grund der Jahresmeldungen der Tuberkulosefürsorgestellen bei den Gesundheitsämtern, die von den Statistischen Landesämtern zusammengestellt werden, für das Bundesgebiet aufbereitet. In der Bundesstatistik werden nur die Erscheinungsarten der aktiven Tuberkulose ausgewiesen, und zwar die offene (Ia und Ib) und geschlossene (Ic) Tuberkulose der Atmungsorgane sowie die Tuberkulose anderer Organe (Id).

Nach dem Bestand und den Zugängen wird auch über die Sterbefälle an Tuberkulose aus der amtlichen Todesursachenstatistik 1970, über die Zahl der Tuberkulosekranken Häuser und der darin behandelten Patienten sowie über die von der Sozialen Rentenversicherung durchgeführten stationären Tuberkulose-Heilbehandlungen im Jahre 1969 — neuere Ergebnisse liegen noch nicht vor — berichtet.

Bestand

Die Zahl der in den Gesundheitsämtern der Bundesrepublik registrierten Kranken mit einer aktiven, also behandlungsbedürftigen Tuberkulose ist bis zum Ende 1970 wie in den Vorjahren um rd. 5 % von 199 977 auf 189 122 zurückgegangen. Fast zwei Drittel waren männlichen Geschlechts. Die Bestandsziffer — Kranke auf 100 000 Einwohner — betrug 1970 (1969) beim männlichen Geschlecht 413 (435) und beim weiblichen 214 (228); sie war somit, wie in früheren Jahren, beim männlichen Geschlecht fast doppelt so hoch wie beim weiblichen. Die Zahlen der Personen mit einer offenen Tuberkulose der Atmungsorgane ist mit 8 % etwas stärker zurückgegangen: Ende 1970 waren es noch 43 382 gegenüber 47 310 im


Tabelle 1: Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Jahresende	Tuberkulose der Atmungsorgane						anderer Organe (extrapul- monal) (Id)
	aller Formen (Ia bis Id)		nicht an- steckungs- fähig (ge- schlossen) (Ic)				
			mit Bakteriennachweis (Ia)	ohne (Ib)			
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner gleichen Geschlechts					
Männlich							
1958	236 023	924,4	244,0	54,3	527,7	97,3	
1964	169 135	609,2	163,8	27,5	351,9	66,0	
1965	161 037	571,6	152,0	25,2	332,0	62,8	
1966	151 118	532,1	143,7	21,4	307,5	59,9	
1967	140 005	492,7	131,0	16,3	289,3	56,1	
1968	133 855	466,1	121,7	15,0	275,4	54,1	
1969	126 890	434,9	109,2	12,1	262,5	50,9	
1970 ¹⁾	120 523	413,0	100,1	10,9	253,9	48,1	
Weiblich							
1958	165 794	570,1	88,5	25,8	350,8	105,1	
1964	102 433	332,3	48,9	11,1	202,0	70,4	
1965	96 537	310,2	44,8	10,0	187,9	67,5	
1966	88 872	283,1	41,9	8,1	169,3	63,7	
1967	81 085	257,2	37,8	6,1	153,9	59,3	
1968	77 220	243,2	35,1	5,6	145,5	57,2	
1969	73 087	228,3	32,7	4,5	137,3	53,0	
1970 ¹⁾	68 599	214,3	30,2	4,1	129,2	50,8	
Insgesamt							
1958	401 817	735,8	161,3	39,1	413,5	101,4	
1964	271 568	461,5	103,3	18,9	273,0	68,3	
1965	257 574	434,4	95,7	17,2	256,4	65,3	
1966	239 990	401,4	90,3	14,4	235,0	61,9	
1967	221 090	368,8	82,0	10,9	218,1	57,7	
1968	211 075	349,1	76,2	10,0	207,2	55,7	
1969	199 977	326,8	69,2	8,1	197,1	52,4	
1970 ¹⁾	189 122	309,1	63,5	7,4	188,7	49,5	

1) Verhältniszahlen vorläufige Ergebnisse.

Jahre vorher; bei ihnen gab es sogar dreimal so viel Männer wie Frauen (vgl. Tabelle 1). Da dem Bakteriennachweis für die Beurteilung der Tuberkulose in jedem Einzelfall wie hinsichtlich der Epidemiologie der Tuberkulose im allgemeinen eine überragende Bedeutung zukommt, ist es bemerkenswert, daß im Verlauf der letzten 10 Jahre der Anteil der Personen mit einer offenen Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis (Ib) an jenen der Gruppe mit einer offenen Tuberkulose der Atmungs-

Schaubild 1



organe (Ia + Ib) sowohl beim Bestand als auch bei den Zugängen von etwa 20 % auf 10 % gefallen ist. Darin kommt die Bestrebung zum Ausdruck, möglichst nur bakteriologisch bestätigte Fälle der offenen Tuberkulose zuzuordnen. Die heutigen Verfahren der mikrobiologischen Diagnostik ermöglichen in hohem Maße die Verifizierung einer offenen Tuberkulose durch den Nachweis von Tuberkulosebakterien. Dadurch werden die Fälle einer offenen Tuberkulose ohne Bakteriennachweis immer weniger.


Bis zum 30. Lebensjahr verläuft die Tuberkulosehäufigkeit bei beiden Geschlechtern noch ziemlich ähnlich, doch dann divergieren die Kurven so stark, daß bei den Männern über 40 Jahren die Bestandsziffern das Dreifache derjenigen der Frauen betragen (vgl. Schaubild 2). Die Bestandsziffern an extrapulmonaler Tuberkulose zeigen im Gegensatz zur Tuberkulose der Atmungsorgane ein leichtes Überwiegen beim weiblichen Geschlecht. Dies gilt in gleicher Weise für die Zugänge.

Nach Ländern betrachtet sind die weitaus höchsten Ziffern wieder in Berlin (West) mit 696 und Hamburg mit 608 zu beobachten: Sie sind etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt mit 309. Am niedrigsten sind die Ziffern wieder in Hessen mit 248 und Baden-Württemberg mit 255. Auch für Niedersachsen und Bremen wurden ähnlich tiefe Ziffern errechnet. Den größten Rückgang der Bestandsziffern haben Niedersachsen mit 12 %, Rheinland-Pfalz mit 11 % und Baden-Württemberg mit 9 % (Bundesdurchschnitt — 5,4 %). In Hessen und im Saarland blieben die Bestandsziffern etwa so hoch wie im Vorjahr.

Zugänge

1970 (1969) wurden 48 262 (49 695) Personen mit einer aktiven Tuberkulose neu registriert, was einem Rückgang von nur 3 % entspricht (1969 betrug er 4 %, 1968 5 %, 1967 sogar 9 %). Von den Neuregistrierten waren 63 % männlichen Geschlechts und hatten 30 % (14 475) eine offene Tuberkulose der Atmungsorgane. — Rd. 23 % waren Wiedererkrankte, wobei dieser Anteil für die einzelnen Altersgruppen stark schwankt. Bei den 40- bis 80jährigen war jeder Dritte ein Wiedererkrankter oder eine Wiedererkrankte (vgl. Tabelle 3). Ähnlich wie beim Bestand divergieren die Zugangskurven nach dem Geschlecht, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie dort, etwa vom 30. Lebensjahr an, wobei die Unterschiede mit dem Alter stetig zunehmen (vgl. Schaubild 2). Wie beim Bestand betragen die Zugangsziffern der Männer über 50 Jahre das Dreifache derjenigen der Frauen. Besonders sei hier auf die epi-

Schaubild 2



demologisch so bedeutende Beteiligung der über 40jährigen Männer an der Tuberkulosemorbidity (Bestand und Zugänge der männlichen Aktiv-Tuberkulösen insgesamt) mit 63 % hingewiesen, was zusammen mit dem oben erwähnten relativ hohen Anteil in diesen Altersgruppen zeigt, daß trotz aller bisherigen Anstrengungen auf dem Gebiet der Tuberkulosebekämpfung die Männer mittleren und höheren Alters immer noch ein großes Kontingent Tuberkulosekranker stellen. Noch stärker schlägt der Anteil bei der offenen Lungentuberkulose zu Buch: Von allen offentuberkulösen Männern im Bestand waren 74 %, also fast drei Viertel über 40 Jahre alt.

Die Häufigkeitsverteilung der Zugänge im einzelnen zeigt Tabelle 2. Auch 1970 entfielen rd. ein Drittel aller Zugänge beim männlichen Geschlecht auf die offene Tuberkulose der Atmungsorgane und nur ein Zehntel auf die Tuberkulose anderer Organe, während beim weiblichen Geschlecht diese Anteile bei 23 bzw. 21 % lagen.

Die Zugangshäufigkeit nach Ländern zeigt zwar ebenso wie die Bestandsziffern große Unterschiede, doch sind die Schwankungen bei den Zugangsziffern wesentlich geringer. Berlin (West) hatte 1970 wieder die höchste Zugangsziffer (116); sie lag um 46 % über dem Bundesdurchschnitt (79). Die tiefste — 64 in Nordrhein-Westfalen — lag 19 % darunter. In allen Ländern, außer in Bayern und Bremen

Tabelle 2: Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Jahr	aller Formen (1a bis 1d)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Anteil der erstmalig bekannt gewordenen Tuber- kulösen
		an- steckungs- fähig (offen) (1a, 1b)	nichtan- steckungs- fähig (ge- schlossen) (1c)	anderer Organe (extrapul- monal) (1d)		
Anzahl		auf 100 000 Einwohner gleichen Geschlechts				%
Männlich						
1966	34 189	132,2	44,5	73,8	13,8	74,1
1967	30 924	119,4	39,8	66,9	12,8	73,5
1968 ⁽¹⁾	29 641	113,6	38,2	63,5	11,9	74,2
1969	28 142	106,7	34,8	60,9	10,9	74,9
1970 ⁽²⁾	30 209	104,3	35,9	57,9	10,5	75,2
Weiblich						
1966	20 834	73,0	15,0	42,4	15,5	78,1
1967 ⁽¹⁾	19 211	66,9	13,7	38,5	14,7	78,3
1968	17 832	61,6	13,2	35,5	13,0	78,0
1969	17 105	58,8	12,3	34,3	12,2	78,5
1970 ⁽²⁾	18 053	56,6	12,8	32,0	11,8	78,8
Insgesamt						
1966	60 019	100,6	28,7	56,9	15,1	75,9
1967	54 671	91,3	25,9	51,3	14,0	75,5
1968	51 786	85,8	24,8	48,3	12,7	77,6
1969	49 695	81,7	23,2	46,6	11,9	76,6
1970 ⁽²⁾	48 262	79,3	23,8	44,3	11,2	76,6

1) Ohne Hessen. — 2) Verhältniszahlen vorläufige Ergebnisse.

waren Rückgänge verschiedenen Ausmaßes zu verzeichnen, doch muß zur Beurteilung regionaler Häufigkeitsunterschiede bei den Zugängen betont werden, daß sie stark von einer ungleichmäßigen Erfassung oder Entdeckung, z. B. infolge unterschiedlicher Intensität von Röntgenreihenuntersuchungen im Berichtsjahr, beeinflusst werden können.

Tabelle 3: Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Erst- und Wiedererkrankung 1970

Alter von ... bis ... Form der Tuberkulose	Zugänge		Wiedererkrankte	
	insgesamt	erstmalig bekanntgewordene Tuberkulose	Anzahl	%
	Anzahl	%	Anzahl	%
Bundesgebiet ohne Nordrhein-Westfalen				
unter 1	60	58	96,7	3,3
1-5	1 052	1 021	97,1	2,9
5-10	1 993	1 839	92,3	7,7
10-15	1 296	1 178	90,9	9,1
15-20	2 278	2 051	90,0	10,0
20-25	3 081	2 813	91,3	8,7
25-30	2 633	2 249	85,4	14,6
30-35	2 947	2 369	80,4	19,6
35-40	2 582	1 966	76,1	23,9
40-45	2 657	1 815	68,3	31,7
45-50	2 561	1 643	64,2	35,8
50-55	1 903	1 204	63,3	36,7
55-60	2 915	1 786	61,3	38,7
60-65	2 946	1 859	63,1	36,9
65-70	2 676	1 687	63,0	37,0
70-75	1 951	1 286	65,9	34,1
75-80	1 092	738	67,6	32,4
80 und älter	676	522	77,2	22,8
Insgesamt	37 299	28 084	75,3	24,7
Bundesgebiet				
Tuberkulose der Atmungsorgane				
offen	14 475	10 990	75,9	24,1
geschlossen	26 984	20 239	75,0	25,0
andere Organe	6 803	5 722	84,1	15,9
Insgesamt	48 262	36 951	76,6	23,4

Tuberkulosesterblichkeit

Im Jahr 1970 (1969) starben 5 037 (5 850) Personen, davon 3 716 (4 348) männlichen Geschlechts an Tuberkulose, was einer Sterbeziffer (Sterbefälle an Tuberkulose auf 100 000 Einwohner) von insgesamt 8,2 (9,6), von 12,6 (15,0) beim männlichen und 4,1 (4,7) beim weiblichen Geschlecht entspricht. Mit nahezu 15 % ist damit die Tuberkulosesterblichkeit im Berichtsjahr fast doppelt so stark zurückgegangen wie im Jahre vorher. Sicher ist dieser starke Sterblichkeitsrückgang insofern überhöht, als durch die

besonders schwere Virusgrippewelle im Dezember 1969 und Januar 1970 ein Teil der Tuberkulosekranken in dieser Zeit vorzeitig starb und sich auch unter den Grippesterbefällen eine Reihe Tuberkulosekranker befand. Dieser Anteil läßt sich größtmäßig nicht bestimmen, da es z. Z. noch keine multikausale Todesursachenstatistik gibt. Gerade in Grippejahren können somit aus der Tuberkulosemortalität nur sehr bedingt Schlüsse gezogen werden, zumal sich rd. 7 200 Grippesterbefälle nur rd. 5 000 Tuberkulosesterbefällen gegenüberstehen. Insgesamt gesehen machte die Tuberkulosesterblichkeit 1970 wieder weniger als 1 % der Gesamtsterblichkeit aus.

Tabelle 4: Sterbefälle an Tuberkulose

Jahr	Gestorbene an Tuberkulose			
	aller Formen (1a bis 1d)	der Atmungs- organe (1a bis 1d) ¹⁾	anderer Organe (extrapulmonal) (1d) ¹⁾	
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner gleichen Geschlechts		
Männlich				
1960	6 766	25,8	24,5	1,3
1964	5 500	19,9	19,0	0,9
1965	5 707	20,4	19,5	0,9
1966	5 392	19,0	18,3	0,7
1967	4 851	17,1	16,4	0,7
1968	4 675	16,3	14,9	0,7
1969	4 348	15,0	12,9	0,7
1970 ²⁾	3 716	12,6	10,8	0,5
Weiblich				
1960	9 457	8,1	7,2	1,1
1964	1 890	6,2	5,3	0,9
1965	1 867	6,0	5,1	0,7
1966	1 746	5,6	4,8	0,8
1967	1 573	5,0	4,2	0,8
1968	1 623	5,1	4,1	0,7
1969	1 502	4,7	3,6	0,6
1970 ²⁾	1 321	4,1	3,1	0,5
Insgesamt				
1960	9 223	16,5	15,3	1,2
1964	7 390	12,6	11,8	0,9
1965	7 574	12,8	12,0	0,8
1966	7 138	12,0	11,2	0,7
1967	6 424	10,7	10,0	0,7
1968	6 298	10,4	9,2	0,7
1969	5 850	9,6	8,0	0,6
1970 ²⁾	5 037	8,2	6,8	0,5

1) 1968 bis 1970 ohne Spätfolgen der Tuberkulose. — 2) Vorläufige Ergebnisse.

Krankenhausbetten für Tuberkulosekranke

Die Zahl der Tuberkulose-Krankenhäuser ging von Ende 1968 bis Ende 1969 von 195 auf 188 zurück. In ihnen standen 29 093 (— 85 %) aller Tuberkulosebetten (34 209).

Wieder gab es 1 853 Tuberkulosebetten weniger (— 5 %). Der Bettenausnutzungsgrad fiel von 90 auf 87 %, da sich die Verweildauer von 95 auf 90 Tage verkürzt hat³⁾. Die Zahl der in den Tuberkulose-Krankenhäusern behandelten Patienten ist mit rd. 104 000 1968 und 1969 gleich hoch geblieben. 69 % von ihnen waren männlichen Geschlechts.

Von der Sozialen Rentenversicherung wurden im Jahre 1969 (1968) 60 103 (63 693) stationäre Tuberkulose-Heilbehandlungen durchgeführt. Somit beträgt der Rückgang rd. 6 %. Die Anteile blieben mit 62 % bei Männern, 31 % bei Frauen und 7 % bei Kindern etwa ebenso hoch wie in den Vorjahren. Von den wegen Tuberkulose stationär behandelten Männern hatten 81 %, von den Frauen nur 60 % und von den Kindern 43 % eine Tuberkulose der Atmungsorgane.

Zusammenfassung

Ende 1970 waren bei den Gesundheitsämtern der Bundesrepublik rd. 189 000 (Ende 1969 rd. 200 000) Kranke mit einer aktiven Tuberkulose registriert. Zwei Drittel waren männlichen Geschlechts, ein Viertel hatte eine offene Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei Männern war sie dreimal so häufig wie bei Frauen. Während beim Bestand ein Rückgang von 5 % eintrat, nahmen die Zugänge zahlenmäßig nur um 3 % ab: 1970 (1969) wurden 48 200 (49 700) Zugänge gemeldet. Auch hier gab es doppelt so viele Männer wie Frauen. Fast ein Viertel waren Wiedererkrankte. Rd. 14 500 hatten eine offene Lungentuberkulose. Fast zwei Drittel der Tuberkulosekranken sind über 40jährige Männer, bei der offenen Tuberkulose der Atmungsorgane sind es sogar nahezu drei Viertel.

1970 starben rd. 5 000 Menschen an Tuberkulose und somit rd. 800 weniger als 1969. Der starke Rückgang ist mitbedingt durch die hohe Grippesterblichkeit im Winter 1969/70. Der Anteil der Tuberkulosesterblichkeit an der Gesamtsterblichkeit betrug wieder weniger als 1 %.

Bei einem weiteren Rückgang der Tuberkulose-Krankenhäuser von 195 auf 188 und der Tuberkulosebetten um 1 850 bzw. 5 % im Jahre 1969 wurde etwa die gleiche Zahl von Patienten wie im Jahre vorher, nämlich 104 000, stationär behandelt. Durch die niedrigere Verweildauer von 95 auf 90 Tage sank die Bettenausnutzung von 90 auf 87 %. Fast 70 % aller Patienten waren männlichen Geschlechts.

3) Errechnet nach der Formel:
$$\frac{\text{Pflegetage}}{\text{Stationär behandelte Kranke}}$$

1. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose 1970 nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose											
	aller Formen (I a - I d)			der Atmungsorgane						anderer Organe (extrapulmonal) (I d)		
				ansteckungsfähig (offen) (I a, I b)			nichtansteckungsfähig (geschlossen) (I c)					
	Insgesamt	männlich	weiblich	Zusammen	männlich	weiblich	Zusammen	männlich	weiblich	Zusammen	männlich	weiblich

Bestand am Jahresende

Anzahl

unter 1	97	50	47	3	2	1	84	43	41	10	5	5
1 - 5	2 850	1 524	1 326	67	43	24	2 566	1 381	1 185	217	100	117
5 - 10	6 318	3 398	2 920	149	69	80	5 668	3 084	2 584	501	245	256
10 - 15	4 668	2 314	2 354	268	115	153	3 723	1 870	1 853	677	329	348
15 - 20	7 585	3 929	3 656	1 356	746	610	5 060	2 592	2 468	1 169	591	578
20 - 25	11 862	6 900	4 962	2 103	1 314	789	8 078	4 785	3 293	1 681	801	880
25 - 30	11 843	6 799	5 044	2 214	1 447	767	7 365	4 295	3 070	2 264	1 057	1 207
30 - 35	14 051	8 528	5 523	2 966	2 131	835	8 288	5 111	3 177	2 797	1 286	1 511
35 - 40	14 075	8 978	5 097	3 242	2 504	738	8 004	5 139	2 865	2 829	1 335	1 494
40 - 45	15 990	10 423	5 567	3 737	2 847	890	8 971	5 933	3 038	3 282	1 643	1 639
45 - 50	15 821	10 225	5 596	3 765	2 879	886	8 866	5 710	3 156	3 190	1 636	1 554
50 - 55	12 822	8 399	4 423	3 345	2 564	781	7 218	4 799	2 419	2 259	1 036	1 223
55 - 60	17 375	12 183	5 192	4 539	3 643	896	10 200	7 319	2 881	2 636	1 221	1 415
60 - 65	18 593	13 686	4 907	5 164	4 295	969	11 053	8 300	2 753	2 376	1 091	1 285
65 - 70	15 621	11 187	4 434	4 610	3 724	886	9 142	6 691	2 451	1 869	772	1 097
70 - 75	10 400	6 835	3 565	3 079	2 300	779	5 966	4 058	1 908	1 355	477	878
75 - 80	5 747	3 331	2 416	1 715	1 130	585	3 297	1 955	1 342	735	246	489
80 u. mehr	3 404	1 834	1 570	1 060	648	412	1 896	1 032	864	448	154	294
Insgesamt	189 122	120 523	68 599	43 382	32 401	10 981	115 445	74 097	41 348	30 295	14 025	16 270

Auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts¹⁾

unter 1	11,0	11,0	(10,9)	(0,3)	(0,4)	(0,2)	9,5	(9,5)	(9,5)	(1,1)	(1,1)	(1,2)
1 - 5	71,6	74,7	68,2	1,7	(2,1)	(1,2)	64,4	67,7	61,0	5,4	4,9	6,0
5 - 10	126,3	132,6	119,6	3,0	2,7	3,3	113,3	120,4	105,8	10,0	9,6	10,5
10 - 15	107,9	104,3	111,6	6,2	5,2	7,3	86,0	84,3	87,9	15,6	14,8	16,5
15 - 20	188,3	190,7	185,8	33,7	36,2	31,0	125,6	125,8	125,5	29,0	28,7	29,4
20 - 25	312,9	353,2	270,0	55,5	67,3	42,9	213,1	244,9	179,2	44,3	41,0	47,9
25 - 30	255,6	278,4	230,1	47,8	59,2	35,0	158,9	175,9	140,1	48,9	43,3	55,1
30 - 35	287,0	331,9	237,4	60,6	82,9	35,9	169,3	198,9	136,6	57,1	50,0	64,9
35 - 40	359,8	439,4	272,9	82,9	122,5	39,5	204,6	251,5	153,4	72,3	65,3	80,0
40 - 45	404,7	536,8	277,1	94,6	146,6	44,3	227,1	305,6	151,2	83,1	84,6	81,6
45 - 50	409,5	625,6	251,0	97,4	176,2	39,7	229,5	349,4	141,6	82,6	69,7	69,7
50 - 55	515,8	808,1	305,8	134,6	246,7	54,0	290,4	461,7	167,3	90,9	99,7	84,6
55 - 60	458,2	766,4	235,7	119,7	229,2	40,7	269,0	460,4	130,8	69,5	76,8	64,2
60 - 65	502,2	869,0	230,6	139,5	272,7	40,8	298,5	527,0	129,4	64,2	69,3	60,4
65 - 70	496,3	836,2	245,0	146,5	278,4	49,0	290,4	500,1	135,4	59,4	57,7	60,6
70 - 75	461,6	810,4	252,9	136,7	272,7	55,3	264,8	481,1	135,4	60,1	56,6	62,3
75 - 80	405,0	684,3	259,1	120,9	232,1	62,7	232,3	401,6	143,9	51,8	50,5	52,5
80 u. mehr	304,0	472,3	214,6	94,7	166,9	56,3	169,3	265,8	118,1	40,0	39,7	40,2
Insgesamt	309,1	413,0	214,3	70,9	111,0	34,3	188,7	253,9	129,2	49,5	48,1	50,8

Zugänge

Anzahl

unter 1	86	45	41	8	4	4	67	37	30	11	4	7
1 - 5	1 224	668	556	26	17	9	1 116	605	511	82	46	36
5 - 10	2 309	1 218	1 091	42	22	20	2 138	1 130	1 008	129	66	63
10 - 15	1 540	783	757	90	39	51	1 313	678	635	137	66	71
15 - 20	2 856	1 564	1 292	673	354	319	1 895	1 061	834	288	149	139
20 - 25	3 810	2 200	1 610	1 051	634	417	2 319	1 373	946	440	193	247
25 - 30	3 445	2 029	1 416	1 028	659	369	1 780	1 073	707	637	297	340
30 - 35	3 886	2 430	1 456	1 229	884	345	1 944	1 204	740	713	342	371
35 - 40	3 488	2 312	1 176	1 096	870	226	1 746	1 129	617	646	313	333
40 - 45	3 624	2 436	1 188	1 187	929	258	1 820	1 206	614	617	301	316
45 - 50	3 467	2 248	1 219	1 135	879	256	1 700	1 069	631	632	300	332
50 - 55	2 591	1 684	907	821	624	197	1 339	888	451	431	172	259
55 - 60	3 887	2 654	1 233	1 299	1 015	284	2 047	1 394	653	541	245	296
60 - 65	3 965	2 877	1 088	1 445	1 172	273	2 032	1 484	548	488	221	267
65 - 70	3 470	2 385	1 085	1 364	1 034	330	1 730	1 210	520	376	141	235
70 - 75	2 477	1 548	929	1 017	716	301	1 157	734	423	303	98	205
75 - 80	1 330	719	611	575	325	250	575	345	230	180	49	131
80 u. mehr	807	409	398	389	211	178	266	154	112	152	44	108
Insgesamt	48 262	30 209	18 053	14 475	10 388	4 087	26 984	16 774	10 210	6 803	3 047	3 756

Auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts¹⁾

unter 1	9,4	(9,6)	(9,2)	(0,9)	(0,8)	(0,9)	7,3	(7,9)	(6,7)	(1,2)	(0,8)	(1,6)
1 - 5	30,4	32,4	28,3	(0,6)	(0,8)	(0,5)	27,7	29,4	26,0	2,0	(2,2)	(1,8)
5 - 10	46,7	48,1	45,3	(0,8)	(0,9)	(0,8)	43,3	44,6	41,8	2,6	2,6	2,6
10 - 15	36,2	35,9	36,5	2,1	(1,8)	2,5	30,8	31,1	30,6	3,2	3,0	3,4
15 - 20	71,2	76,2	66,0	16,8	17,3	16,3	47,3	51,7	42,6	7,2	7,3	7,1
20 - 25	102,2	114,8	88,8	28,2	33,1	23,0	62,2	71,6	52,2	11,8	10,1	13,6
25 - 30	73,2	82,2	63,4	21,9	26,7	16,5	37,8	43,5	31,6	13,5	12,0	15,2
30 - 35	81,6	97,6	64,0	25,8	35,5	15,2	40,8	48,3	32,5	15,0	13,7	16,3
35 - 40	90,5	115,3	63,6	28,4	43,4	12,2	45,3	56,3	33,4	16,8	15,6	18,0
40 - 45	92,7	129,2	58,7	30,4	49,3	12,7	46,5	63,9	30,3	15,8	16,0	15,6
45 - 50	90,9	139,6	55,3	29,8	54,6	11,6	44,6	66,4	28,6	16,6	18,6	15,1
50 - 55	101,4	157,6	61,0	32,1	58,4	13,2	52,4	83,1	30,3	16,9	16,1	17,4
55 - 60	101,6	164,6	55,7	33,9	63,0	12,8	53,5	86,5	29,5	14,1	15,2	13,4
60 - 65	107,3	181,6	51,5	39,1	74,0	12,9	55,0	93,7	26,0	13,2	13,9	12,6
65 - 70	111,4	180,2	60,6	43,8	78,1	18,4	55,5	91,4	29,0	12,1	10,7	13,1
70 - 75	111,6	187,5	66,7	45,8	86,7	21,6	52,1	88,9	30,3	13,7	11,9	14,7
75 - 80	94,5	147,3	66,5	40,9	66,6	27,2	40,9	70,7	25,0	12,8	10,0	14,3
80 u. mehr	73,0	105,5	55,5	35,2	54,4	24,8	24,1	39,7	15,6	13,8	11,3	15,1
Insgesamt	79,3	104,3	56,6	23,8	35,9	12,8	44,3	57,9	32,0	11,2	10,5	11,8

1) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

2. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose 1970 nach Ländern und Altersgruppen

a) Grundzahlen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Bundes- gebiet	Schlesw.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Bestand am Jahresende												
Männlich												
unter 1	50	4	-	6	1	15	3	-	2	16	-	3
1 - 5	1 524	57	15	70	6	491	95	48	189	504	16	33
5 - 10	3 398	116	71	173	11	1 048	252	200	571	817	62	77
10 - 15	2 314	89	67	179	13	689	168	169	324	485	64	67
15 - 20	3 929	218	138	366	33	1 183	278	238	475	744	109	147
20 - 25	6 900	360	310	702	57	1 954	552	393	943	1 200	140	289
25 - 30	6 799	350	465	632	74	2 041	472	283	881	941	131	529
30 - 35	8 528	298	522	730	93	2 471	638	442	1 196	1 334	179	625
35 - 40	8 978	362	457	782	97	2 925	659	499	1 218	1 247	185	547
40 - 45	10 423	371	527	1 046	113	3 303	792	653	1 277	1 423	249	669
45 - 50	10 225	435	566	947	122	3 222	810	667	1 251	1 375	235	595
50 - 55	8 399	371	458	856	111	2 700	567	479	894	1 240	171	552
55 - 60	12 183	566	753	1 200	131	3 380	856	700	1 371	1 861	313	1 052
60 - 65	13 686	637	862	1 363	126	3 657	961	892	1 544	2 089	321	1 234
65 - 70	11 187	454	688	1 028	81	2 966	762	780	1 257	1 807	293	1 071
70 - 75	6 835	325	440	735	63	1 654	492	426	744	1 150	128	678
75 - 80	3 331	172	240	334	23	841	241	183	361	565	65	306
80 u.mehr	1 834	63	135	213	21	354	122	122	226	334	29	215
Zusammen	120 523	5 248	6 714	11 362	1 176	34 894	8 720	7 174	14 724	19 132	2 690	8 689
Weiblich												
unter 1	47	2	1	1	1	19	2	-	4	14	-	3
1 - 5	1 326	48	8	56	8	493	81	40	198	355	16	23
5 - 10	2 920	105	46	167	13	899	237	175	521	629	57	71
10 - 15	2 354	95	66	171	14	813	181	137	342	416	50	69
15 - 20	3 656	151	139	352	22	1 078	300	217	466	616	127	188
20 - 25	4 962	239	248	519	52	1 411	388	289	685	758	92	281
25 - 30	5 044	242	358	448	72	1 463	337	267	635	634	102	486
30 - 35	5 523	294	378	551	69	1 653	425	258	698	599	105	493
35 - 40	5 097	210	340	517	58	1 733	366	248	594	537	76	418
40 - 45	5 567	240	365	590	76	1 801	362	334	551	606	97	545
45 - 50	5 596	268	423	557	91	1 738	384	339	560	613	132	491
50 - 55	4 423	190	323	470	70	1 487	275	225	395	495	69	424
55 - 60	5 192	223	426	504	74	1 461	336	273	532	676	93	594
60 - 65	4 907	231	367	529	64	1 338	263	258	481	725	69	582
65 - 70	4 434	208	314	504	49	1 098	291	234	465	697	52	522
70 - 75	3 565	172	268	425	22	727	247	202	371	634	42	455
75 - 80	2 416	161	186	289	23	420	162	138	287	430	31	289
80 u.mehr	1 570	85	81	219	12	268	89	90	210	274	13	229
Zusammen	68 599	3 164	4 337	6 869	790	19 900	4 726	3 724	7 995	9 708	1 223	6 163
Insgesamt	189 122	8 412	11 051	18 231	1 966	54 794	13 446	10 868	22 719	28 840	3 913	14 852
Zugänge												
Männlich												
unter 1	46	-	-	6	1	12	3	-	2	22	-	-
1 - 5	668	18	7	32	-	93	64	22	111	301	3	17
5 - 10	1 218	31	14	60	6	178	94	63	264	458	25	25
10 - 15	783	35	15	70	4	133	66	44	125	245	32	14
15 - 20	1 564	63	35	142	7	313	140	103	231	447	43	40
20 - 25	2 200	90	78	240	23	403	196	142	402	516	38	72
25 - 30	2 029	80	85	196	33	466	166	81	365	391	36	130
30 - 35	2 430	78	92	196	40	596	197	108	453	493	50	127
35 - 40	2 312	76	79	217	30	586	212	117	420	432	42	101
40 - 45	2 436	77	86	206	35	689	204	138	400	444	59	98
45 - 50	2 247	74	74	227	38	616	194	129	359	410	56	70
50 - 55	1 684	58	68	164	27	460	144	85	256	320	28	74
55 - 60	2 654	97	106	260	37	686	230	152	352	513	80	141
60 - 65	2 877	109	105	301	36	753	232	167	384	564	55	171
65 - 70	2 385	111	83	253	22	571	165	145	342	484	63	146
70 - 75	1 548	66	65	201	21	351	123	85	197	327	27	85
75 - 80	719	39	30	88	8	134	56	43	101	145	18	57
80 u.mehr	409	19	27	55	7	71	42	17	47	81	5	38
Zusammen	50 209	1 121	1 049	2 914	375	7 111	2 528	1 641	4 811	6 593	660	1 406
Weiblich												
unter 1	41	1	1	3	-	14	2	-	4	14	-	2
1 - 5	556	9	1	19	1	79	53	19	127	226	5	17
5 - 10	1 091	27	6	67	7	138	80	52	263	412	21	18
10 - 15	757	26	14	57	7	111	60	45	155	239	19	24
15 - 20	1 292	59	37	103	8	265	119	75	189	342	40	55
20 - 25	1 610	57	60	160	23	326	144	99	287	337	31	86
25 - 30	1 416	58	64	124	32	346	112	64	239	250	32	95
30 - 35	1 456	65	63	140	21	343	139	68	267	249	23	78
35 - 40	1 176	42	48	89	23	320	116	67	214	178	12	67
40 - 45	1 188	55	49	142	20	278	107	72	182	191	16	76
45 - 50	1 219	53	60	140	21	290	96	84	193	185	27	70
50 - 55	907	35	44	112	20	228	72	55	129	142	11	59
55 - 60	1 233	53	65	132	21	286	100	55	185	226	24	86
60 - 65	1 088	56	48	123	17	266	66	63	166	197	18	68
65 - 70	1 085	54	32	135	17	223	85	61	140	242	11	85
70 - 75	929	42	34	122	13	175	75	47	122	207	14	78
75 - 80	611	40	41	84	5	104	50	43	83	111	3	47
80 u.mehr	398	21	14	59	4	60	24	20	59	78	5	54
Zusammen	18 053	753	681	1 811	260	3 852	1 500	989	3 004	3 826	312	1 065
Insgesamt	48 262	1 874	1 730	4 725	635	10 963	4 028	2 630	7 815	10 419	972	2 471

2. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose 1970 nach Ländern und Altersgruppen

b) Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts ¹⁾

Alter von ... bis unter ... Jahren	Bundesgebiet	Schlesw.-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrh.-Westf.	Hessen	Rheinld.-Pfalz	Baden-Württg.	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Bestand am Jahresende												
Männlich												
unter 1	11,0	(19,6)	-	(10,5)	(19,2)	(11,9)	(7,8)	-	(2,8)	(20,1)	-	(28,0)
1 - 5	74,7	62,4	(29,6)	27,4	(24,7)	86,5	55,0	(38,6)	60,3	142,5	(43,5)	(66,9)
5 - 10	132,6	107,3	117,5	55,6	(37,9)	146,6	116,2	120,2	145,3	181,1	119,7	129,0
10 - 15	104,3	101,7	137,8	67,1	(54,4)	108,7	89,7	113,0	96,5	123,6	132,5	148,6
15 - 20	190,7	263,6	299,3	146,1	(149,3)	203,3	155,1	168,9	155,0	209,4	246,0	288,2
20 - 25	353,2	388,8	551,6	310,1	231,7	378,3	306,8	362,2	319,8	337,6	433,4	435,9
25 - 30	278,4	309,5	567,1	238,8	217,0	310,7	210,0	231,2	232,8	220,1	360,9	518,6
30 - 35	331,9	272,9	660,8	260,8	271,9	335,3	277,4	314,4	299,4	306,7	415,3	759,4
35 - 40	439,4	485,9	829,4	360,0	418,1	472,5	360,1	420,7	384,0	364,1	502,7	973,3
40 - 45	536,8	540,0	986,9	493,2	504,5	558,0	441,0	556,7	448,5	437,8	689,8	1 330,0
45 - 50	625,6	694,9	1 150,4	518,9	592,2	668,7	528,4	682,0	541,1	490,5	733,1	1 383,7
50 - 55	808,1	889,7	1 392,1	731,0	798,6	881,5	607,1	785,2	629,1	702,2	868,0	1 595,4
55 - 60	766,4	857,6	1 420,8	641,0	595,5	760,1	600,3	751,9	622,6	686,0	1 090,6	1 724,6
60 - 65	869,0	956,5	1 570,1	736,0	594,3	831,5	672,0	949,9	729,3	804,1	1 118,5	1 755,3
65 - 70	836,2	780,1	1 467,0	634,6	473,7	810,2	626,1	955,9	714,6	805,3	1 215,8	1 791,0
70 - 75	810,4	835,5	1 452,1	695,4	588,8	757,7	631,6	828,8	669,1	789,8	901,4	1 729,6
75 - 80	684,3	693,5	1 263,2	528,5	359,4	696,8	529,7	624,6	580,4	679,9	866,7	1 219,1
80 u. mehr	472,3	285,1	865,4	419,3	388,9	371,8	323,6	544,6	463,1	524,3	491,5	1 053,9
Zusammen	413,0	426,9	795,9	334,7	326,3	424,6	334,5	410,8	342,7	380,9	503,3	938,0
Weiblich												
unter 1	(10,9)	(10,4)	(10,0)	(1,8)	(20,0)	(15,8)	(5,5)	-	(6,0)	(18,5)	-	29,4
1 - 5	68,2	(54,8)	(16,7)	23,1	(35,1)	92,1	49,0	(33,8)	66,3	105,5	(45,3)	48,6
5 - 10	119,6	105,1	(79,4)	56,5	(47,8)	131,9	115,0	110,5	139,3	145,5	115,2	124,6
10 - 15	111,6	114,6	142,2	68,0	(61,4)	134,4	102,4	96,8	106,9	111,5	108,0	161,6
15 - 20	185,8	196,6	306,8	150,0	(104,3)	193,3	176,6	163,0	157,2	181,1	297,4	381,3
20 - 25	270,0	316,1	444,4	259,4	219,4	280,2	229,2	282,8	244,6	227,5	284,0	453,2
25 - 30	230,1	261,3	491,8	192,2	243,2	242,8	169,0	230,0	189,2	164,6	273,5	555,4
30 - 35	237,4	301,5	524,3	213,1	234,7	249,8	206,4	194,9	200,0	149,6	239,2	652,1
35 - 40	272,9	296,6	627,3	247,0	257,8	315,8	222,9	223,4	216,2	166,8	215,3	755,9
40 - 45	277,1	315,4	607,3	259,5	308,9	305,3	202,3	270,4	192,8	176,5	252,6	887,6
45 - 50	251,0	307,0	611,3	220,5	322,7	274,8	188,3	249,3	179,5	156,6	306,3	671,7
50 - 55	305,8	319,9	685,8	282,6	374,3	363,8	218,3	263,8	199,2	197,8	260,4	709,0
55 - 60	235,7	242,4	587,6	196,3	259,6	241,3	174,4	210,0	175,2	178,7	236,0	574,5
60 - 65	230,6	264,3	494,6	219,0	231,9	228,3	139,4	202,7	168,1	203,9	178,3	507,9
65 - 70	245,0	273,7	486,1	241,7	(214,0)	224,9	180,7	215,5	195,4	225,6	165,1	514,3
70 - 75	252,9	273,4	489,9	252,5	(120,2)	199,3	198,7	246,3	203,6	262,1	188,3	518,2
75 - 80	259,1	365,9	480,6	257,3	(181,1)	178,2	199,0	261,9	242,6	273,5	231,3	440,5
80 u. mehr	214,6	226,1	270,9	237,5	(118,8)	150,1	136,9	222,8	225,8	226,3	138,3	424,1
Zusammen	214,3	238,3	445,5	185,4	199,7	223,3	167,9	193,5	173,3	175,0	206,3	510,2
Insgesamt												
Insgesamt	309,1	329,0	608,2	256,8	260,1	319,9	248,0	296,0	255,0	272,9	347,1	695,9
Zugänge												
Männlich												
unter 1	(9,6)	-	-	(10,1)	(17,9)	(9,2)	(7,5)	-	(2,8)	(26,8)	-	-
1 - 5	32,4	(19,5)	(13,6)	(12,5)	-	14,7	36,7	(17,4)	35,1	84,2	(7,9)	(34,0)
5 - 10	48,1	(29,3)	(23,6)	19,5	(21,0)	25,2	44,0	38,1	68,1	102,5	(48,0)	(42,9)
10 - 15	35,9	(40,7)	(31,4)	26,7	(17,0)	21,3	35,9	(29,7)	38,0	63,7	(66,9)	(31,7)
15 - 20	76,2	75,7	(75,3)	56,6	(31,4)	54,2	78,2	73,3	76,1	126,6	(97,1)	(77,5)
20 - 25	114,8	96,6	137,1	107,7	(92,4)	79,6	111,7	135,1	140,6	148,1	(121,8)	108,4
25 - 30	82,2	70,0	102,8	72,5	(95,4)	70,0	73,6	64,5	96,0	90,6	(95,2)	129,0
30 - 35	97,6	73,9	119,6	72,0	(121,2)	82,9	88,6	78,6	117,8	118,2	117,1	159,7
35 - 40	115,3	104,8	146,0	101,7	(131,6)	96,1	118,4	99,6	135,7	128,5	(113,5)	187,0
40 - 45	129,2	115,1	164,4	99,4	(159,8)	120,0	116,9	120,8	145,7	140,6	165,7	201,2
45 - 50	139,6	119,4	150,4	126,5	(185,4)	130,2	128,8	134,0	157,9	148,3	177,8	160,9
50 - 55	157,6	135,2	198,3	135,3	(186,2)	146,3	150,8	135,4	175,8	177,1	(137,9)	205,0
55 - 60	164,6	145,0	195,9	136,9	(165,9)	152,3	159,1	161,0	157,8	187,1	225,9	222,7
60 - 65	181,6	162,9	188,8	161,9	(169,0)	169,8	161,7	176,9	181,1	216,2	189,0	239,2
65 - 70	180,2	193,7	178,1	158,0	(130,2)	158,0	137,3	179,5	196,4	217,5	264,7	244,6
70 - 75	187,5	171,9	215,2	194,4	(200,0)	164,6	161,2	169,7	182,1	229,6	(194,2)	217,4
75 - 80	147,3	(156,6)	(156,3)	139,2	(123,1)	110,7	123,1	146,8	162,1	174,5	(240,0)	223,5
80 u. mehr	105,5	(86,0)	(173,1)	108,3	(129,6)	74,5	111,7	75,6	96,7	127,6	(84,0)	(186,3)
Zusammen	104,3	91,7	124,3	86,3	104,3	87,1	97,9	94,4	113,3	132,5	123,3	152,2
Weiblich												
unter 1	(9,2)	(5,0)	(9,3)	(5,3)	-	(11,3)	(5,3)	-	(5,8)	(17,9)	-	(18,7)
1 - 5	28,3	(10,2)	(2,1)	(7,8)	(4,3)	14,4	31,8	(15,8)	42,2	66,5	(13,7)	(35,5)
5 - 10	45,3	(27,1)	(10,5)	23,0	(26,1)	20,5	39,4	33,1	71,4	96,4	(42,4)	(32,3)
10 - 15	36,5	(31,9)	(30,7)	23,0	(31,3)	18,6	34,6	32,1	49,5	65,3	(41,4)	(57,3)
15 - 20	66,0	76,5	(81,1)	43,9	(37,6)	47,9	70,2	56,4	64,7	101,3	(93,7)	110,9
20 - 25	88,8	75,2	106,0	80,8	(95,8)	65,5	86,5	99,4	104,9	102,9	(97,8)	139,2
25 - 30	63,4	61,3	86,5	51,8	(106,3)	56,3	55,5	53,4	70,3	63,6	(82,7)	108,4
30 - 35	64,0	68,6	88,9	55,2	(72,7)	52,6	69,3	52,3	78,9	64,2	(53,4)	105,3
35 - 40	63,6	(60,4)	(89,4)	42,9	(103,1)	58,9	71,5	60,6	79,0	55,8	(33,9)	123,6
40 - 45	58,7	71,7	(80,2)	62,0	(80,6)	46,8	59,3	57,7	63,7	55,2	(41,0)	122,2
45 - 50	55,3	61,2	86,8	56,0	(74,5)	46,6	47,8	62,8	62,6	47,8	(64,1)	94,0
50 - 55	61,0	(57,2)	(90,5)	65,3	(103,6)	54,1	55,9	62,6	63,4	55,5	(40,3)	94,7
55 - 60	55,7	57,4	88,3	51,3	(73,2)	47,0	51,6	42,1	60,9	59,6	(60,3)	80,6
60 - 65	51,5	64,7	(64,9)	51,4	(62,3)	45,7	35,3	49,8	58,7	55,9	(47,0)	59,1
65 - 70	60,6	71,7	(49,7)	65,3	(74,9)	46,3	53,5	56,8	59,5	79,0	(35,4)	83,6
70 - 75	66,7	(67,1)	(62,0)	73,4	(71,8)	48,6	61,3	58,2	67,9	86,6	(63,9)	88,2
75 - 80	66,5	(92,2)	(107,3)	75,7	(39,7)	44,8	62,1	82,9	71,4	71,8	(22,7)	(71,9)
80 u. mehr	55,5	(56,8)	(47,6)	65,3	(40,4)	34,3	37,7	50,5	64,6	65,7	(54,3)	101,7
Zusammen	56,6	56,9	(69,8)	49,0	65,7	43,4	53,6	51,5	65,7	69,4	52,6	87,8
Insgesamt												
Insgesamt	79,3	73,6	95,1	66,8	84,1	64,3	74,9	71,9	88,6	99,3	86,1	115,7

1) Vorläufiges Ergebnis. Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufalls-schwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand September 1971

I. Jahresbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen ¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen ¹⁾	1962 vergriffen ¹⁾	1965 vergriffen ¹⁾
1960 "	1963 Preis DM 12.--	1966 Preis DM 15.--
1961 "	1964 vergriffen ¹⁾	1967 " DM 15.--
		1968 " DM 15.--

II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9.--
A 7/S/ Körperbehinderte April 1966 vergriffen ¹⁾	
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966 (Bestellnummer: 200790-660002)	" DM 9.--

III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 12,50	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ II Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2,50	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.--,	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 6,50	letzter Jahresbericht für 1968

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25.--
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, erscheint Ende 1971
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--
3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11.--.

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--
Band 3, Ausgabe 1968, " DM 39.--
Band 4, Ausgabe 1970, " DM 39.--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 – Telefon (06131) 59 344, vertrieben.

¹⁾ Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.