

STATISTISCHES  
B U N D E S A M T  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**2. Vierteljahr 1962**



Bestellnummer: A 7/II - vj 2/62  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 2. Vierteljahr 1962 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.6.1962 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

---

Erschienen im Dezember 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose  
im 2. Vierteljahr 1962

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des zweiten Vierteljahres 1962 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1961 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

2. Vierteljahr 1962

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Schleswig-Holstein	126	73	199	421	620	122	742
Hamburg	155	42	197	515	712	80	792
Niedersachsen	331	92	423	1 032	1 455	285	1 740
Bremen	.	.	37	115	152	39	191
Nordrhein-Westfalen	1 098	199	1 297	2 276	3 573	670	4 243
Hessen	239	67	306	512	818	219	1 037
Rheinland-Pfalz	215	61	276	502	778	209	987
Baden-Württemberg	353	56	409	1 124	1 533	349	1 882
Bayern	545	141	686	1 328	2 014	345	2 359
Saarland	88	17	105	202	307	43	350
Bundesgebiet ohne Berlin	3 150 <sup>a)</sup>	748 <sup>a)</sup>	3 935	8 027	11 962	2 361	14 323
2. Vj. 1961	3 219 <sup>a)</sup>	759 <sup>a)</sup>	4 031	8 910	12 941	2 574	15 515
Berlin (West)	232	3	235	586	821	81	902
2. Vj. 1961	161	53	214	463	677	66	743
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	3 382 <sup>a)</sup>	751 <sup>a)</sup>	4 170	8 613	12 783	2 442	15 225
2. Vj. 1961	3 380 <sup>a)</sup>	812 <sup>a)</sup>	4 245	9 373	13 618	2 640	16 258
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	21,6	12,5	34,1	72,2	106,4	20,9	127,3
Hamburg	33,7	9,1	42,9	112,1	155,0	17,4	172,4
Niedersachsen	19,8	5,5	25,3	61,8	87,2	17,1	104,2
Bremen	.	.	20,8	64,6	85,4	21,9	107,3
Nordrhein-Westfalen	27,4	5,0	32,3	56,7	89,0	16,7	105,7
Hessen	19,6	5,5	25,1	42,0	67,1	18,0	85,1
Rheinland-Pfalz	25,0	7,1	32,1	58,3	90,4	24,3	114,7
Baden-Württemberg	17,9	2,8	20,8	57,1	77,8	17,7	95,5
Bayern	22,7	5,9	28,5	55,2	83,7	14,3	98,
Saarland	32,4	6,3	38,7	74,4	113,0	15,8	128,9
Bundesgebiet ohne Berlin	23,4 <sup>a)</sup>	5,6 <sup>a)</sup>	28,9	58,9	87,8	17,3	105,1
2. Vj. 1961	24,2 <sup>a)</sup>	5,7 <sup>a)</sup>	29,9	66,1	96,0	19,1	115,1
Berlin (West)	42,7	0,6	43,2	107,7	151,0	14,9	165,8
2. Vj. 1961	29,3	9,7	39,0	84,3	123,3	12,0	135,3
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	24,2 <sup>a)</sup>	5,4 <sup>a)</sup>	29,4	60,8	90,2	17,2	107,4
2. Vj. 1961	24,4 <sup>a)</sup>	5,9 <sup>a)</sup>	30,3	66,8	97,0	18,8	115,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30.6.1962

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	2 785	1 148	3 933	9 807	13 740	1 909	15 649
Hamburg	3 273	1 127	4 400	13 317	17 717	2 219	19 936
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	.	.	1 155	3 371	4 526	866	5 392
Nordrhein-Westfalen	19 122	4 240	23 362	52 971	76 333	14 833	91 166
Hessen	4 522	683	5 205	11 024	16 229	3 504	19 733
Rheinland-Pfalz	4 024	1 737	5 761	11 917	17 678	3 587	21 265
Baden-Württemberg	8 353	1 129	9 482	20 912	30 394	5 712	36 106
Bayern	11 894	1 690	13 584	24 782	38 366	4 756	43 122
Saarland	1 324	539	1 863	2 710	4 573	685	5 258
Bundesgebiet ohne Berlin <sup>1)</sup>	55 297 a)	12 293 a)	68 745	150 811	219 556	38 071	257 627
2. Vj. 1961	67 331 a)	13 408 a)	83 244	181 362	264 606	45 712	310 318
Berlin (West)	6 586	97	6 683	18 686	25 369	1 883	27 252
2. Vj. 1961	6 823	452	7 275	20 236	27 511	1 927	29 438
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) <sup>1)</sup>	61 883 a)	12 390 a)	75 428	169 497	244 925	39 954	284 879
2. Vj. 1961	74 154 a)	13 860 a)	90 519	201 598	292 117	47 639	339 756
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	118,9	49,0	168,0	418,8	586,8	81,5	668,3
Hamburg	177,5	61,1	238,7	722,4	961,1	120,4	1 081,4
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	.	.	161,7	471,8	633,4	121,2	754,7
Nordrhein-Westfalen	118,7	26,3	145,0	328,7	473,7	92,0	565,7
Hessen	92,3	13,9	106,2	225,0	331,2	71,5	402,7
Rheinland-Pfalz	116,4	50,3	166,7	344,8	511,5	103,8	615,2
Baden-Württemberg	105,3	14,2	119,5	263,6	383,2	72,0	455,2
Bayern	123,0	17,5	140,5	256,3	396,8	49,2	446,0
Saarland	121,4	49,4	170,8	248,4	419,2	62,8	481,9
Bundesgebiet ohne Berlin <sup>1)</sup>	116,8 a)	26,0 a)	143,0	313,8	456,8	79,2	536,0
2. Vj. 1961	125,8 a)	25,1 a)	153,5	334,5	488,1	84,3	572,4
Berlin (West)	302,1	4,4	306,5	857,0	1 163,6	86,4	1 249,9
2. Vj. 1961	309,6	20,5	330,1	918,3	1 248,5	87,4	1 335,9
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) <sup>1)</sup>	124,9 a)	25,0 a)	150,1	337,4	487,5	79,5	567,0
2. Vj. 1961	133,1 a)	24,9 a)	160,4	357,3	517,8	84,4	602,2

1) Ohne Niedersachsen.

a) Ohne Bremen.

### 3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	1961				1962	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Atmungsorgane						
Schleswig-Holstein	13,9	12,1	12,6	15,5	17,2	12,7
Hamburg	15,4	13,3	9,3	17,0	13,4	14,6
Niedersachsen	14,0	11,4	10,3	13,3	13,6	12,5
Bremen	12,1	8,5	6,7	11,7	13,7	7,3
Nordrhein-Westfalen	14,9	12,6	10,8	12,9	13,9	13,2
Hessen	10,4	9,7	9,7	10,5	10,2	8,9
Rheinland-Pfalz	17,3	14,2	13,8	15,4	14,4	13,0
Baden-Württemberg	13,2	10,5	9,8	12,1	13,4	11,5
Bayern	17,0	15,2	14,7	15,9	17,0	15,5
Saarland	19,1	19,1	18,1	19,1	16,4	18,4
Bundesgebiet ohne Berlin	14,7	12,5	11,5	13,7	14,2	12,9
Berlin (West)	24,1	18,4	18,5	21,6	21,2	25,0
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	15,1	12,7	11,7	14,0	14,5	13,4
Andere Organe						
Schleswig-Holstein	0,9	1,9	1,2	1,0	0,7	2,1
Hamburg	1,5	0,4	0,6	0,9	1,1	0,7
Niedersachsen	1,4	1,0	1,1	0,8	1,3	1,5
Bremen	2,3	0,6	0,6	1,7	0,6	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,9	1,0	1,2	0,8	0,9	0,9
Hessen	1,1	1,0	0,9	1,1	0,8	0,7
Rheinland-Pfalz	1,7	0,9	0,8	1,0	1,3	1,5
Baden-Württemberg	1,0	1,5	1,3	1,7	1,2	1,8
Bayern	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Saarland	1,1	1,1	1,1	1,5	0,7	2,6
Bundesgebiet ohne Berlin	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3
Berlin (West)	1,7	2,0	1,6	2,3	1,3	0,4
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2