

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**1. Vierteljahr 1963**



Bestellnummer: A 7/II - vj 1/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 1. Vierteljahr 1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.3.1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

---

Erschienen im September 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose  
im 1. Vierteljahr 1963

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1963 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1962 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

1. Vierteljahr 1963

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	135	69	204	437	641	98	739
Hamburg	106	31	137	332	469	66	535
Niedersachsen	337	95	432	872	1 304	220	1 524
Bremen	.	.	39	105	144	37	181
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup>	1 040	180	1 220	2 093	3 313	564	3 877
Hessen	239	76	315	555	870	203	1 073
Rheinland-Pfalz	237	58	295	479	774	193	967
Baden-Württemberg	393	102	495	1 295	1 790	330	2 120
Bayern	502	92	594	1 291	1 885	280	2 165
Saarland	67	11	78	194	272	44	316
Bundesgebiet ohne Berlin	3 056 <sup>a)</sup>	714 <sup>a)</sup>	3 809	7 653	11 462	2 035	13 497
1. Vj. 1962	3 202 <sup>a)</sup>	793 <sup>a)</sup>	4 028	8 552	12 580	2 336	14 916
Berlin (West)	276	6	282	549	831	78	909
1. Vj. 1962	235	5	240	528	768	108	876
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 332 <sup>a)</sup>	720 <sup>a)</sup>	4 052	8 202	12 293	2 113	14 406
1. Vj. 1962	3 437 <sup>a)</sup>	798 <sup>a)</sup>	4 268	9 080	13 348	2 444	15 792
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	23,3	11,9	35,2	75,3	110,5	16,9	127,4
Hamburg	23,3	6,8	30,1	72,9	103,0	14,5	117,4
Niedersachsen	20,3	5,7	26,0	52,5	78,5	13,2	91,8
Bremen	.	.	22,0	59,2	81,2	20,9	102
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup>	26,0	4,5	30,5	52,4	82,9	14,1	97
Hessen	19,6	6,2	25,8	45,5	71,4	16,7	88,0
Rheinland-Pfalz	27,6	6,8	34,4	55,8	90,2	22,5	112,7
Baden-Württemberg	19,9	5,2	25,1	65,6	90,7	16,7	107,4
Bayern	20,9	3,8	24,7	53,7	78,4	11,7	90,1
Saarland	24,7	4,1	28,8	71,7	100,5	16,3	116,7
Bundesgebiet ohne Berlin	22,8 <sup>a)</sup>	5,3 <sup>a)</sup>	28,0	56,3	84,3	15,0	99,3
1. Vj. 1962	24,2 <sup>a)</sup>	6,0 <sup>a)</sup>	30,0	63,7	93,7	17,4	111,1
Berlin (West)	51,5	1,1	52,6	102,5	155,1	14,6	169,7
1. Vj. 1962	43,6	0,9	44,5	98,0	142,5	20,0	162,6
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	23,9 <sup>a)</sup>	5,2 <sup>a)</sup>	28,7	58,0	87,0	15,0	101,9
1. Vj. 1962	24,9 <sup>a)</sup>	5,8 <sup>a)</sup>	30,6	65,0	95,6	17,5	113,1

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Einschl. der Übergänge aus den Überwachungs- oder Beobachtungs-  
fällen, jedoch ohne Zuzüge aus anderen Kreisen. a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 31.3.1963

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	2 617	1 084	3 701	8 986	12 687	1 818	14 505
Hamburg	3 154	978	4 132	12 828	16 960	2 217	19 177
Niedersachsen	7 053	1 156	8 209	18 667	26 876	5 139	32 015
Bremen	.	.	1 060	2 724	3 784	811	4 595
Nordrhein-Westfalen	17 797	3 821	21 618	49 021	70 639	14 012	84 651
Hessen	4 179	669	4 848	10 529	15 377	3 325	18 702
Rheinland-Pfalz	3 829	1 564	5 393	11 235	16 628	3 470	20 098
Baden-Württemberg	7 931	1 108	9 039	19 961	29 000	5 393	34 393
Saarland	11 462	1 449	12 911	22 639	35 550	4 411	39 961
Saarland	1 279	448	1 727	2 732	4 459	678	5 137
Bundesgebiet ohne Berlin	59 301 <sup>a)</sup>	12 277 <sup>a)</sup>	72 638	159 322	231 960	41 274	273 234
1. Vj. 1962 <sup>b)</sup>	55 721	12 484	69 370	152 418	221 788	37 844	259 632
Berlin (West)	6 325	54	6 379	17 080	23 459	1 780	25 239
1. Vj. 1962	6 647	118	6 765	19 186	25 951	1 897	27 848
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	65 626 <sup>a)</sup>	12 331 <sup>a)</sup>	79 017	176 402	255 419	43 054	298 473
1. Vj. 1962 <sup>b)</sup>	62 368 <sup>a)</sup>	12 602 <sup>a)</sup>	76 135	171 604	247 739	39 741	287 480
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	111,1	46,0	157,1	381,5	538,6	77,2	615,8
Hamburg	170,7	52,9	223,6	694,3	917,9	120,0	1 037,9
Niedersachsen	104,6	17,1	121,8	276,9	398,7	76,2	474,9
Bremen	.	.	147,2	378,4	525,6	112,7	638,3
Nordrhein-Westfalen	109,6	23,5	133,2	302,0	435,2	86,3	521,5
Hessen	84,4	13,5	98,0	212,7	310,7	67,2	377,9
Rheinland-Pfalz	110,0	44,9	154,9	322,7	477,6	99,7	577,3
Baden-Württemberg	98,8	13,8	112,6	249,6	361,2	67,2	428,4
Bayern	117,4	14,8	132,3	232,0	364,2	45,2	409,4
Saarland	116,3	40,7	157,0	248,4	405,4	61,6	467,1
Bundesgebiet ohne Berlin	108,8 <sup>a)</sup>	22,5 <sup>a)</sup>	131,6	288,6	420,1	74,8	494,9
1. Vj. 1962 <sup>b)</sup>	118,1 <sup>a)</sup>	26,5 <sup>a)</sup>	144,9	318,4	463,2	79,0	542,3
Berlin (West)	291,4	2,5	293,9	786,9	1 080,8	82,0	1 162,8
1. Vj. 1962	304,6	5,4	310,0	879,2	1 189,2	86,9	1 276,1
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	115,8 <sup>a)</sup>	21,8 <sup>a)</sup>	137,7	307,4	445,1	75,0	520,1
1. Vj. 1962 <sup>b)</sup>	126,4 <sup>a)</sup>	25,5 <sup>a)</sup>	152,1	342,8	494,9	79,4	574,3

a) Ohne Bremen.- b) Ohne Niedersachsen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)  
auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	1962				1963
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.
Atmungsorgane					
Schleswig-Holstein	17,2	12,7	12,5	13,2	15,5
Hamburg	13,4	14,6	12,9	18,0	23,3
Niedersachsen	13,6	12,5	9,8	11,6	16,7
Bremen	13,7	7,3	10,0	12,7	22,0
Nordrhein-Westfalen	13,9	13,2	11,1	12,8	18,2
Hessen	10,2	8,9	9,0	7,6	12,1
Rheinland-Pfalz	14,4	13,0	11,1	13,1	17,7
Baden-Württemberg	13,4	11,5	9,2	11,5	17,7
Bayern	17,0	15,5	12,0	13,7	19,6
Saarland	16,4	18,4	17,1	15,9	20,7
Bundesgebiet ohne Berlin	14,2	12,9	10,9	12,4	17,8
Berlin (West)	21,2	25,0	19,5	24,8	53,8
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	14,5	13,4	11,2	12,9	18,4
Andere Organe					
Schleswig-Holstein	0,7	2,1	1,2	1,9	1,2
Hamburg	1,1	0,7	0,4	0,6	1,3
Niedersachsen	1,3	1,5	0,7	0,9	0,9
Bremen	0,6	0,6	0,6	2,2	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,9	0,9	0,6	1,1	1,1
Hessen	0,8	0,7	0,5	1,0	0,7
Rheinland-Pfalz	1,3	1,5	0,8	1,0	0,8
Baden-Württemberg	1,2	1,8	1,0	1,3	1,7
Bayern	1,3	1,3	0,7	0,6	0,9
Saarland	0,7	2,6	0,7	0,4	0,7
Bundesgebiet ohne Berlin	1,1	1,3	0,7	1,0	1,1
Berlin (West)	1,3	0,4	1,3	1,5	0,4
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,1	1,2	0,7	1,0	1,0