

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

2. Vierteljahr 1963



Bestellnummer: A 7/II - vj 2/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 2. Vierteljahr 1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.6.1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

Erschienen im November 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose
im 2. Vierteljahr 1963

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Anzahl der Neuzugänge und auch die des Bestands an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Die unterschiedliche, wechselnde Teilnahme der Bevölkerung in verschiedenen Verwaltungsbezirken z.B. an Röntgen-Reihenuntersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des zweiten Vierteljahres 1963 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1962 auf Grund der Todesursachenstatistik beigefügt.

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

2. Vierteljahr 1963

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	150	57	207	474	681	111	792
Hamburg	121	35	156	405	561	98	659
Niedersachsen	371	117	488	1 041	1 529	291	1 820
Bremen	.	.	44	108	152	32	184
Nordrhein-Westfalen ²⁾	1 146	198	1 344	2 104	3 448	603	4 051
Hessen	255	94	349	633	982	217	1 199
Rheinland-Pfalz	224	59	283	524	807	164	971
Baden-Württemberg	428	94	522	1 364	1 886	317	2 203
Bayern	560	94	654	1 319	1 973	333	2 306
Saarland	76	9	85	177	262	33	295
Bundesgebiet ohne Berlin	3 331 ^{a)}	757 ^{a)}	4 132	8 149	12 281	2 199	14 480
2. Vj. 1962	3 150 ^{a)}	748 ^{a)}	3 935	8 027	11 962	2 361	14 323
Berlin (West)	237	3	240	568	808	72	880
2. Vj. 1962	232	3	235	586	821	81	902
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	3 568 ^{a)}	760 ^{a)}	4 372	8 717	13 089	2 271	15 360
2. Vj. 1962	3 382 ^{a)}	751 ^{a)}	4 170	8 613	12 783	2 442	15 225
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	25,5	9,7	35,2	80,6	115,8	18,9	134,6
Hamburg	26,2	7,6	33,8	87,8	121,7	21,3	142,9
Niedersachsen	22,0	7,0	29,0	61,8	90,8	17,3	108,1
Bremen	.	.	24,5	60,1	84,6	17,8	102,4
Nordrhein-Westfalen ²⁾	28,3	4,9	33,2	51,9	85,1	14,9	100,0
Hessen	20,6	7,6	28,2	51,2	79,4	17,5	96,9
Rheinland-Pfalz	25,8	6,8	32,5	60,3	92,8	18,9	111,7
Baden-Württemberg	21,3	4,7	26,0	68,0	94,0	15,8	109,7
Bayern	23,0	3,9	26,8	54,1	80,9	13,7	94,5
Saarland	27,7	3,3	31,0	64,5	95,4	12,0	107,4
Bundesgebiet ohne Berlin	24,5 ^{a)}	5,6 ^{a)}	30,0	59,1	89,0	15,9	105,0
2. Vj. 1962	23,4 ^{a)}	5,6 ^{a)}	28,9	58,9	87,8	17,3	105,1
Berlin (West)	43,7	0,6	44,3	104,8	149,1	13,3	162,4
2. Vj. 1962	42,7	0,6	43,2	107,7	151,0	14,9	165,8
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	25,2 ^{a)}	5,4 ^{a)}	30,5	60,8	91,3	15,8	107,1
2. Vj. 1962	24,2 ^{a)}	5,4 ^{a)}	29,4	60,8	90,2	17,2	107,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Einschl. der Übergänge aus den Überwachungs- oder Beobachtungs-fällen, jedoch ohne Zuzüge aus anderen Kreisen.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30.6.1963

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	2 567	1 059	3 625	8 856	12 481	1 820	14 301
Hamburg	3 161	925	4 086	12 573	16 659	2 244	18 903
Niedersachsen	6 908	1 179	8 087	18 387	26 474	5 140	31 614
Bremen	.	.	1 054	2 600	3 654	787	4 441
Nordrhein-Westfalen	17 822	3 855	21 677	48 646	70 323	14 053	84 376
Hessen	4 186	707	4 893	10 564	15 457	3 322	18 779
Rheinland-Pfalz	3 894	1 541	5 435	11 248	16 683	3 404	20 087
Baden-Württemberg	7 901	1 145	9 046	19 859	28 905	5 346	34 251
Bayern	11 408	1 363	12 771	22 504	35 275	4 457	39 732
Saarland	1 305	414	1 719	2 762	4 481	672	5 153
Bundesgebiet ohne Berlin	59 152 ^{a)}	12 187 ^{a)}	72 339	157 999	230 392	41 245	271 637
2. Vj. 1962 b)	55 297 ^{a)}	12 293 ^{a)}	68 745	150 811	219 556	38 071	257 627
Berlin (West)	6 276	43	6 319	16 784	23 103	1 753	24 856
2. Vj. 1962	6 586	97	6 683	18 686	25 369	1 883	27 252
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	65 428 ^{a)}	12 230 ^{a)}	78 712	174 783	253 495	42 998	296 493
2. Vj. 1962 b)	61 883 ^{a)}	12 390 ^{a)}	75 428	169 497	244 925	39 954	284 879
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	108,6	44,8	153,4	374,7	528,0	77,0	605,0
Hamburg	170,8	50,0	220,7	679,2	899,9	121,2	1 021,1
Niedersachsen	102,2	17,4	119,6	271,9	391,5	76,0	467,6
Bremen	.	.	146,2	360,6	506,7	109,1	615,9
Nordrhein-Westfalen	109,5	23,7	133,2	298,9	432,1	86,3	518,4
Hessen	84,2	14,2	98,4	212,4	310,7	66,8	377,5
Rheinland-Pfalz	111,5	44,1	155,6	321,9	477,5	97,4	574,9
Baden-Württemberg	97,8	14,2	111,9	245,8	357,7	66,2	423,9
Bayern	116,4	13,9	130,3	229,5	359,8	45,5	405,2
Saarland	118,4	37,5	155,9	250,5	406,4	60,9	467,3
Bundesgebiet ohne Berlin	108,1 ^{a)}	22,3 ^{a)}	130,6	285,0	415,6	74,4	490,1
2. Vj. 1962 b)	116,8 ^{a)}	26,0 ^{a)}	143,0	313,8	456,8	79,2	536,0
Berlin (West)	288,3	2,0	290,3	771,1	1 061,4	80,5	1 142,0
2. Vj. 1962	302,1	4,4	306,5	857,0	1 163,6	86,4	1 249,9
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	115,0 ^{a)}	21,5 ^{a)}	136,6	303,4	440,0	74,6	514,7
2. Vj. 1962 b)	124,9 ^{a)}	25,0 ^{a)}	150,1	337,4	487,5	79,5	567,0

a) Ohne Bremen. -- b) Ohne Niedersachsen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1962				1963	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Atmungsorgane						
Schleswig-Holstein	17,2	12,7	12,5	13,2	15,5	12,4
Hamburg	13,4	14,6	12,9	18,0	23,3	17,1
Niedersachsen	13,6	12,5	9,8	11,6	16,7	12,4
Bremen	13,7	7,3	10,0	12,7	22,0	10,0
Nordrhein-Westfalen	13,9	13,2	11,1	12,8	18,2	11,2
Hessen	10,2	8,9	9,0	7,6	12,1	7,7
Rheinland-Pfalz	14,4	13,0	11,1	13,1	17,7	11,3
Baden-Württemberg	13,4	11,5	9,2	11,5	17,7	10,6
Bayern	17,0	15,5	12,0	13,7	19,6	13,9
Saarland	16,4	18,4	17,1	15,9	20,7	14,6
Bundesgebiet ohne Berlin	14,2	12,9	10,9	12,4	17,8	11,7
Berlin (West)	21,2	25,0	19,5	24,8	33,8	18,1
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	14,5	13,4	11,2	12,9	18,4	11,9
Andere Organe						
Schleswig-Holstein	0,7	2,1	1,2	1,9	1,2	0,5
Hamburg	1,1	0,7	0,4	0,6	1,3	0,9
Niedersachsen	1,3	1,5	0,7	0,9	0,9	1,0
Bremen	0,6	0,6	0,6	2,2	0,6	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,9	0,9	0,6	1,1	1,1	0,7
Hessen	0,8	0,7	0,5	1,0	0,7	0,5
Rheinland-Pfalz	1,3	1,5	0,8	1,0	0,8	0,9
Baden-Württemberg	1,2	1,8	1,0	1,3	1,7	0,5
Bayern	1,3	1,3	0,7	0,6	0,9	0,9
Saarland	0,7	2,6	0,7	0,4	0,7	0,7
Bundesgebiet ohne Berlin	1,1	1,3	0,7	1,0	1,1	0,7
Berlin (West)	1,3	0,4	1,3	1,5	0,4	1,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,1	1,2	0,7	1,0	1,0	0,8