

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

3. Vierteljahr 1963



Bestellnummer: A 7/II - vj 3/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 3. Vierteljahr 1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.9.1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

Erschienen im Februar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose
im 3. Vierteljahr 1963

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene Kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Anzahl der Neuzugänge und auch die des Bestandes an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Die unterschiedliche, wechselnde Teilnahme der Bevölkerung in verschiedenen Verwaltungsbezirken z.B. an Röntgen-Reihen-Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des dritten Vierteljahres 1963 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1962 auf Grund der Todesursachenstatistik beigefügt.

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 3. Vierteljahr 1963

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	125	61	186	461	647	117	764
Hamburg	120	35	155	390	545	80	625
Niedersachsen	300	118	418	930	1 348	243	1 591
Bremen	.	.	30	90	120	32	152
Nordrhein-Westfalen ²⁾	1 120	226	1 346	2 143	3 489	630	4 119
Hessen	233	68	301	557	858	218	1 076
Rheinland-Pfalz	212	69	281	469	750	172	922
Baden-Württemberg	405	96	501	1 321	1 822	395	2 217
Bayern	567	103	670	1 164	1 834	325	2 159
Saarland	83	8	91	165	256	43	299
Bundesgebiet ohne Berlin	3 175 ^{a)}	784 ^{a)}	3 979	7 690	11 669	2 255	13 924
3. Vj. 1962	3 263 ^{a)}	750 ^{a)}	4 049	7 891	11 940	2 448	14 388
Berlin (West)	285	8	293	524	817	85	902
3. Vj. 1962	230	4	234	560	794	95	889
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	3 450 ^{a)}	792 ^{a)}	4 272	8 214	12 486	2 340	14 826
3. Vj. 1962	3 493 ^{a)}	754 ^{a)}	4 283	8 451	12 734	2 543	15 277
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	20,9	10,2	31,2	77,2	108,4	19,6	128,0
Hamburg	25,7	7,5	33,2	83,6	116,8	17,1	133,9
Niedersachsen	17,6	6,9	24,5	54,5	79,0	14,2	93,2
Bremen	.	.	16,5	49,4	65,9	17,6	83,5
Nordrhein-Westfalen ²⁾	27,3	5,5	32,8	52,1	84,9	15,3	100,2
Hessen	18,5	5,4	24,0	44,3	60,3	17,4	85,7
Rheinland-Pfalz	24,0	7,8	31,8	53,2	85,0	19,5	104,5
Baden-Württemberg	19,9	4,7	24,6	64,8	89,3	19,4	108,7
Bayern	22,9	4,2	27,1	47,0	74,1	13,1	87,2
Saarland	29,8	2,9	32,7	59,3	92,0	15,5	107,5
Bundesgebiet ohne Berlin	22,9 ^{a)}	5,7 ^{a)}	28,4	55,0	83,4	16,1	99,5
3. Vj. 1962	23,9 ^{a)}	5,5 ^{a)}	29,3	57,1	86,3	17,7	104,0
Berlin (West)	51,9	1,5	53,4	95,4	148,8	15,5	164,3
3. Vj. 1962	41,9	0,7	42,6	102,0	144,6	17,3	161,9
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	24,0 ^{a)}	5,5 ^{a)}	29,4	56,5	85,9	16,1	101,9
3. Vj. 1962	24,6 ^{a)}	5,3 ^{a)}	29,8	58,8	88,6	17,7	106,3

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Einschl. der Übergänge aus den Überwachungs- oder Beobachtungsfällen, jedoch ohne Zuzüge aus anderen Kreisen. - a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30.9.1963

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	2 483	996	3 479	8 633	12 112	1 735	13 847
Hamburg	3 147	864	4 011	12 342	16 353	2 256	18 609
Niedersachsen	6 731	1 197	7 928	18 258	26 186	5 101	31 287
Bremen	.	.	994	2 515	3 509	785	4 294
Nordrhein-Westfalen	17 691	3 855	21 546	47 925	69 471	14 024	83 495
Hessen	4 131	695	4 826	10 506	15 332	3 344	18 676
Rheinland-Pfalz	3 909	1 531	5 440	10 978	16 418	3 260	19 678
Baden-Württemberg	7 856	1 177	9 033	19 876	28 909	5 412	34 321
Bayern	11 455	1 328	12 783	22 244	35 027	4 492	39 519
Saarland	1 318	384	1 702	2 813	4 515	676	5 191
Bundesgebiet ohne Berlin	58 721 ^{a)}	12 027 ^{a)}	71 742	156 090	227 832	41 085	268 917
3. Vj. 1962 b)	54 851 ^{a)}	12 167 ^{a)}	68 152	148 473	216 625	38 256	254 881
Berlin (West)	6 242	54	6 296	16 410	22 706	1 766	24 472
3. Vj. 1962	6 519	89	6 608	18 056	24 664	1 855	26 519
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	64 963 ^{a)}	12 081 ^{a)}	78 038	172 500	250 538	42 851	293 389
3. Vj. 1962 b)	61 370 ^{a)}	12 256 ^{a)}	74 760	166 529	241 289	40 111	281 400
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	104,7	42,0	146,7	364,0	510,7	73,2	583,8
Hamburg	169,8	46,6	216,5	666,1	882,5	121,7	1 004,3
Niedersachsen	99,3	17,7	116,9	269,3	386,2	75,2	461,5
Bremen	.	.	137,5	347,8	485,3	108,6	593,8
Nordrhein-Westfalen	108,3	23,6	131,9	293,4	425,3	85,9	511,2
Hessen	82,7	13,9	96,7	210,4	307,1	67,0	374,1
Rheinland-Pfalz	111,5	43,7	155,2	313,2	468,5	93,0	561,5
Baden-Württemberg	96,9	14,5	111,4	245,1	376,5	66,7	423,3
Bayern	116,5	13,5	130,0	226,2	356,2	45,7	401,8
Saarland	119,2	34,7	154,0	254,5	408,5	61,2	469,6
Bundesgebiet ohne Berlin	107,0 ^{a)}	21,9 ^{a)}	129,0	280,7	409,7	73,9	483,6
3. Vj. 1962 b)	115,4 ^{a)}	25,6 ^{a)}	141,3	307,8	449,1	79,3	528,4
Berlin (West)	286,3	2,5	288,8	752,8	1 041,6	81,0	1 122,6
3. Vj. 1962	299,6	4,1	303,7	829,7	1 133,4	85,2	1 218,6
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	113,8 ^{a)}	21,2 ^{a)}	135,0	298,5	433,6	74,2	507,7
3. Vj. 1962 b)	123,5 ^{a)}	24,7 ^{a)}	148,3	330,3	478,6	79,6	558,2

a) Ohne Bremen. - b) Ohne Niedersachsen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1962				1963		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Atmungsorgane							
Schleswig-Holstein	17,2	12,7	12,5	13,2	15,5	12,4	10,9
Hamburg	13,4	14,6	12,9	18,0	23,3	17,1	12,2
Niedersachsen	13,6	12,5	9,8	11,6	16,7	12,4	10,0
Bremen	13,7	7,3	10,0	12,7	22,0	10,0	6,0
Nordrhein-Westfalen	13,9	13,2	11,1	12,8	18,2	11,2	10,0
Hessen	10,2	8,9	9,0	7,6	12,1	7,7	7,8
Rheinland-Pfalz	14,4	13,0	11,1	13,1	17,7	11,3	10,8
Baden-Württemberg	13,4	11,5	9,2	11,5	17,7	10,6	8,9
Bayern	17,0	15,5	12,0	13,7	19,6	13,9	13,3
Saarland	16,4	18,4	17,1	15,9	20,7	14,6	21,2
Bundesgebiet ohne Berlin	14,2	12,9	10,9	12,4	17,8	11,7	10,5
Berlin (West)	21,2	25,0	19,5	24,8	33,8	18,1	22,0
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	14,5	13,4	11,2	12,9	18,4	11,9	11,0
Andere Organe							
Schleswig-Holstein	0,7	2,1	1,2	1,9	1,2	0,5	1,3
Hamburg	1,1	0,7	0,4	0,6	1,3	0,9	0,2
Niedersachsen	1,3	1,5	0,7	0,9	0,9	1,0	0,5
Bremen	0,6	0,6	0,6	2,2	0,6	0,6	-
Nordrhein-Westfalen	0,9	0,9	0,6	1,1	1,1	0,7	0,6
Hessen	0,8	0,7	0,5	1,0	0,7	0,5	0,4
Rheinland-Pfalz	1,3	1,5	0,8	1,0	0,8	0,9	0,5
Baden-Württemberg	1,2	1,8	1,0	1,3	1,7	0,5	1,1
Bayern	1,3	1,3	0,7	0,6	0,9	0,9	1,3
Saarland	0,7	2,6	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7
Bundesgebiet ohne Berlin	1,1	1,3	0,7	1,0	1,1	0,7	0,8
Berlin (West)	1,3	0,4	1,3	1,5	0,4	1,7	0,5
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,1	1,2	0,7	1,0	1,0	0,8	0,7