

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

1. Vierteljahr 1965



Bestellnummer : A 7/II - vj 1/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 1. Vierteljahr 1965 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.3.1965 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr).....	6

Erschienen im Juli 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.h. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugewogene krank. Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsstörungen, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atemorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atemorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulose ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verteilungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden noch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1965 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1964 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 1. Vierteljahr 1965

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose						insgesamt
	der Atmungsorgane					Anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)	zusammen		
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	163	61	233	442	675	107	782
Hamburg	103	25	134	284	418	76	494
Niedersachsen	290	104	394	830	1 224	244	1 468
Bremen	.	.	30	70	100	28	128
Nordrhein-Westfalen	900	178	1 078	1 811	2 889	606	3 495
Hessen	220	75	295	595	888	212	1 100
Rheinland-Pfalz	193	77	270	434	704	152	856
Baden-Württemberg	356	83	439	1 366	1 805	318	2 123
Bayern	573	104	677	1 471	2 148	288	2 436
Saarland	83	7	90	197	287	33	320
Berlin (West)	196	2	198	536	734	88	822
Bundesgebiet	3 089 ^{a)}	719 ^{a)}	3 838	8 034	11 872	2 152	14 024
dagegen 1. Vj. 1964	3 004 ^{a)}	652 ^{a)}	3 694	7 615	11 309	2 103	13 412

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	28,5	10,8	39,2	74,4	113,7	18,0	131,7
Hamburg	22,8	5,5	29,3	62,0	91,2	16,6	107,8
Niedersachsen	17,1	6,1	23,3	49,1	72,3	14,4	86,8
Bremen	.	.	16,6	38,7	55,2	15,5	70,7
Nordrhein-Westfalen	22,0	4,4	26,4	44,3	70,7	14,8	85,5
Hessen	17,5	6,0	23,5	47,2	70,6	16,9	87,5
Rheinland-Pfalz	22,0	8,8	30,8	49,6	80,4	17,4	97,8
Baden-Württemberg	17,4	4,1	21,5	66,9	83,4	15,6	104,0
Bayern	23,3	4,2	27,5	59,7	87,2	11,7	98,9
Saarland	30,1	2,5	32,6	71,4	104,0	12,0	116,0
Berlin (West)	36,1	0,4	36,5	98,8	135,3	16,2	151,5
Bundesgebiet	21,6 ^{a)}	5,0 ^{a)}	26,5	55,5	82,0	14,9	96,9
dagegen 1. Vj. 1964	21,1 ^{a)}	4,6 ^{a)}	25,6	52,7	78,3	14,6	92,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.h. erstmalig erkrankte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitstypen, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Fürsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Untersuchungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1965 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1964 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 1. Vierteljahr 1965

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose						insgesamt
	der Atmungsorgane				Anderer Organe (aktiv extrapulmonal)		
	erstickungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)			
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	163	61	233	442	675	107	782
Hamburg	103	25	134	281	418	76	494
Niedersachsen	290	104	394	830	1 224	244	1 468
Bremen	.	.	30	70	100	28	128
Nordrhein-Westfalen	900	173	1 078	1 811	2 889	606	3 495
Hessen	220	75	295	593	888	212	1 100
Rheinland-Pfalz	193	77	270	434	704	152	856
Baden-Württemberg	356	83	439	1 366	1 805	318	2 123
Bayern	573	101	677	1 471	2 148	288	2 436
Saarland	83	7	90	197	287	33	320
Berlin (West)	196	2	198	536	734	88	822
Bundesgebiet	3 089 ^{a)}	719 ^{a)}	3 838	8 034	11 872	2 152	14 024
dagegen 1. Vj. 1964	3 004 ^{a)}	652 ^{a)}	3 694	7 615	11 309	2 103	13 412

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	28,5	10,8	39,2	74,4	113,7	18,0	131,7
Hamburg	23,8	5,5	29,3	62,0	91,2	16,6	107,8
Niedersachsen	17,1	6,1	23,3	49,1	72,3	14,4	86,8
Bremen	.	.	16,6	38,7	55,2	15,5	70,7
Nordrhein-Westfalen	22,0	4,4	26,4	44,3	70,7	14,8	85,5
Hessen	17,5	6,0	23,5	47,2	70,6	16,9	87,5
Rheinland-Pfalz	22,0	8,8	30,8	49,6	80,4	17,4	97,8
Baden-Württemberg	17,4	4,1	21,5	66,9	88,4	15,6	104,0
Bayern	23,3	4,2	27,5	59,7	87,2	11,7	98,9
Saarland	30,1	2,5	32,6	71,4	104,0	12,0	116,0
Berlin (West)	36,1	0,4	36,5	98,8	135,3	16,2	151,5
Bundesgebiet	21,6 ^{a)}	5,0 ^{a)}	26,5	55,5	82,0	14,9	96,9
dagegen 1. Vj. 1964	21,1 ^{a)}	4,6 ^{a)}	25,6	52,7	78,3	14,6	92,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 31. 12. 1965

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose						Anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	insgesamt
	der Atemwegsorgane							
	ansteckungsfähig (offen)			nicht ansteckungsfähig (aktiv geschwunden)				
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen	zu-	zu-			
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	2 159	832	2 991	7 267	10 278	1 460	11 738	
Hamburg	2 938	661	3 599	11 359	14 958	2 243	17 201	
Niedersachsen	5 966	1 070	7 036	16 273	23 309	4 635	27 944	
Bremen	.	.	815	1 965	2 778	681	3 459	
Nordrhein-Westfalen	16 066	3 624	19 690	44 063	63 753	13 099	76 857	
Hessen	3 441	639	4 080	9 671	13 754	3 077	16 831	
Rheinland-Pfalz	3 396	1 315	4 711	9 470	14 181	2 929	17 110	
Sachsen-Anhalt	7 322	1 174	8 496	10 831	27 327	4 941	32 268	
Bayern	10 475	1 174	11 649	20 724	32 373	3 922	36 295	
Saarland	1 255	335	1 590	4 773	6 363	696	7 059	
DDR (West)	5 471	43	5 514	12 234	20 748	1 710	22 458	
DDR (gesamt)	58 489 ^{a)}	10 867 ^{a)}	70 171	127 636	227 827	39 393	267 220	
gegen 1. Vj. 1964	62 435 ^{a)}	11 299 ^{a)}	74 634	162 367	240 016	41 074	281 090	

Auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	89,5	34,5	124,0	302,1	426,1	60,5	486,6
Hamburg	158,2	35,6	193,8	611,6	805,4	120,8	926,1
Niedersachsen	86,8	15,6	102,4	256,2	339,1	67,4	406,6
Bremen	.	.	110,2	266,5	377,8	92,6	470,4
Nordrhein-Westfalen	96,7	21,8	118,5	285,2	383,7	78,8	462,5
Hessen	67,3	12,5	79,8	189,2	269,0	60,2	329,1
Rheinland-Pfalz	95,5	37,0	132,5	305,2	398,6	82,3	481,0
Sachsen-Anhalt	88,0	14,1	102,1	226,4	308,6	59,4	388,0
Bayern	104,6	11,7	116,3	207,0	323,3	39,2	362,5
Saarland	112,0	29,9	141,9	247,4	359,3	62,1	451,4
DDR (West)	248,6	2,0	250,6	592,2	942,7	77,7	1 020,4
DDR (gesamt)	100,7 ^{a)}	18,7 ^{a)}	119,3	268,0	387,3	67,0	454,3
gegen 1. Vj. 1964	108,9 ^{a)}	19,7 ^{a)}	128,6	284,9	413,4	70,8	484,2

^{a)} ohne Bremen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1964				1965
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Atemungsorgane					
Schleswig-Holstein	12,8	13,0	9,3	11,4	14,0
Hamburg	11,5	12,3	10,9	16,2	15,5
Niedersachsen	13,0	11,7	8,8	11,2	12,4
Bremen	10,5	12,1	9,2	3,8	6,6
Nordrhein-Westfalen	12,2	10,3	10,7	12,0	12,3
Hessen	7,7	7,5	5,8	7,2	8,4
Rheinland-Pfalz	12,4	12,3	9,5	15,1	13,6
Baden-Württemberg	11,0	10,7	8,4	10,1	11,3
Bayern	16,3	12,9	14,7	14,4	16,6
Saarland	21,4	17,7	14,2	12,8	18,1
Berlin (West)	22,7	22,2	14,6	18,8	19,2
Bundesgebiet	13,0	11,6	10,5	12,1	13,1
Andere Organe					
Schleswig-Holstein	0,7	1,3	0,8	1,0	0,5
Hamburg	0,4	0,2	0,6	0,2	1,3
Niedersachsen	0,9	1,4	0,6	1,0	1,0
Bremen	1,7	1,7	1,1	0,5	0,6
Nordrhein-Westfalen	1,0	0,6	0,8	0,8	0,6
Hessen	0,2	0,4	1,2	0,5	0,4
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,4	0,7	0,6
Baden-Württemberg	1,1	1,0	0,7	0,6	0,8
Bayern	1,2	1,1	0,7	1,0	0,5
Saarland	-	0,7	1,4	0,7	-
Berlin (West)	1,8	1,6	0,7	1,4	2,2
Bundesgebiet	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7