

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

1. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/II - vj 1/66
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

Seite

Vorbemerkung	3
--------------------	---

Tabellenteil

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose im 1. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs im 1. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (Grund- und Verhältniszahlen)	6

Erkrankungs- und Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Erkrankungs- bzw. Sterbefälle beruhen, wurden eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM --,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Zu diesen Meldungen zählen als Zugänge nur Erkrankte mit einer aktiven Tuberkulose (Gruppe I, entsprechend den Erläuterungen zur Tuberkulosestatistik vom November 1965 des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose), und zwar:

- a) Alle erstmals bekannt gewordenen Tuberkulösen einschließlich der Reaktivierten, d.h. jener Kranken, deren Tuberkulose inaktiv war und im Berichtszeitraum aktiv geworden ist.
- b) Alle Tuberkulösen, die in früheren Jahren aus der Tuberkulosefürsorge ausgeschieden waren und im Berichtszeitraum erneut erkrankten.
- c) Alle Tuberkulösen, die nach Umzug von einem in einen anderen Fürsorgebezirk dort registriert werden.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Zugänge an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1966 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1965 aufgrund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach der Art und Form der Tuberkulose

im 1. Vierteljahr 1966

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose				
	der Atmungsorgane			anderer Organe (aktiv extrapul- monal)	ins- gesamt
	an- steckungs- fähig (offen)	nichtanstek- kungsfähig (aktiv geschlossen)	zusammen		

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	179	370	549	108	657
Hamburg	166	373	539	87	626
Niedersachsen	603	1 359	1 962	254	2 216
Bremen	58	146	204	24	228
Nordrhein-Westfalen	1 301	2 132	3 433	313	3 746
Hessen	401	832	1 233	256	1 489
Rheinland-Pfalz	321	514	835	170	1 005
Baden-Württemberg	669	1 835	2 504	452	2 956
Bayern	907	1 816	2 723	347	3 070
Saarland	71	141	212	98	310
Berlin (West)	212	530	742	95	837
Bundesgebiet	4 888	10 048	14 936	2 204	17 140
dagegen 1. Vj. 1965	3 838	8 034	11 872	2 152	14 024

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	29,7	61,4	91,2	17,9	109,1
Hamburg	36,3	81,6	118,0	19,0	137,0
Niedersachsen	35,3	79,6	114,9	14,9	129,7
Bremen	31,6	79,6	111,3	(13,1)	124,4
Nordrhein-Westfalen	31,5	51,6	83,1	7,6	90,7
Hessen	31,4	65,1	96,5	20,0	116,5
Rheinland-Pfalz	36,3	58,1	94,4	19,2	113,6
Baden-Württemberg	32,1	88,1	120,2	21,7	141,9
Bayern	36,4	72,8	109,1	13,9	123,1
Saarland	25,5	50,7	126,9	35,2	111,4
Berlin (West)	39,2	97,9	137,1	17,6	154,6
Bundesgebiet	33,4	68,6	102,0	15,1	117,1
dagegen 1. Vj. 1965	26,5	55,5	82,0	14,9	96,9

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs
im 1. Vierteljahr 1966

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe (aktiv extrapulmonal)		
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)					
	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulose 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulose 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulose 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	122	56	1	267	81	22	92	14	2
Hamburg	133	30	3	273	86	14	78	8	1
Niedersachsen	295	266	42	651	613	95	182	47	25
Bremen	40	16	2	101	37	8	21	2	1
Nordrhein-Westfalen	692	599	10	905	1 208	19	243	57	13
Hessen	295	88	18	601	167	64	196	56	4
Rheinland-Pfalz	240	70	11	397	100	17	129	39	2
Baden-Württemberg	444	205	20	1 293	487	55	354	86	12
Bayern	612	279	16	1 266	513	37	280	56	11
Saarland	64	7	-	131	10	-	47	2	49
Berlin (West)	131	81	.	386	144	.	79	16	.
Bundesgebiet	3 068	1 697	123	6 271	3 446	331	1 701	383	120

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	20,3	9,3	(0,2)	44,3	13,5	(3,7)	15,3	(2,3)	(0,3)
Hamburg	29,1	(6,6)	(0,7)	59,7	18,8	(3,1)	17,1	(1,8)	(0,2)
Niedersachsen	17,3	15,6	(2,5)	38,1	35,9	5,6	10,7	(2,8)	(1,5)
Bremen	(21,8)	(8,7)	(1,1)	55,1	(20,2)	(4,4)	(11,5)	(1,1)	(0,5)
Nordrhein-Westfalen	16,7	14,5	(0,2)	21,9	29,2	(0,5)	5,9	1,4	(0,3)
Hessen	23,1	6,9	(1,4)	47,0	13,1	5,0	15,3	4,4	(0,3)
Rheinland-Pfalz	27,1	7,9	(1,2)	44,9	11,3	(1,9)	14,6	(4,4)	(0,2)
Baden-Württemberg	21,3	9,8	(1,0)	62,1	23,4	2,6	17,0	4,1	(0,6)
Bayern	24,5	11,2	(0,6)	50,7	20,6	(1,5)	11,2	2,2	(0,4)
Saarland	23,0	(2,5)	-	47,1	(3,6)	-	(16,9)	(0,7)	(17,6)
Berlin (West)	24,2	15,0	.	71,3	26,6	.	14,6	(3,0)	.
Bundesgebiet	21,0	11,6	0,8	42,8	23,5	2,3	11,6	2,6	0,8

1) Einschl. der Übergänge aus den Gruppen IIc, IId, III, V. - 2) Bzw. Reaktivierete. - 3) In Niedersachsen und Hessen einschl. der Zuzüge aus den Fürsorgebezirken, innerhalb der Länder. In Berlin (West) ohne die Zuzüge aus den Kreisen außerhalb des Landes.

3. Sterbefälle an Tuberkulose

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1965				1966
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.

Atmungsorgane

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	83	80	67	77	82
Hamburg	71	65	53	50	60
Niedersachsen	210	207	180	180	213
Bremen	12	11	11	23	25
Nordrhein-Westfalen	501	434	441	518	458
Hessen	105	97	93	119	108
Rheinland-Pfalz	119	110	104	107	109
Baden-Württemberg	231	215	211	230	236
Bayern	403	395	322	381	382
Saarland	50	42	35	46	40
Berlin (West)	104	97	100	99	110
Bundesgebiet	1 894	1 753	1 622	1 830	1 823

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	14,0	13,3	10,9	12,5	13,6
Hamburg	15,5	14,0	12,4	10,7	13,1
Niedersachsen	12,4	12,1	10,3	10,3	12,5
Bremen	(6,6)	(6,0)	(5,9)	(12,3)	(13,6)
Nordrhein-Westfalen	12,3	10,5	10,5	12,3	11,1
Hessen	8,4	7,6	7,2	9,1	8,5
Rheinland-Pfalz	13,6	12,4	11,5	11,9	12,3
Baden-Württemberg	11,3	10,3	10,0	10,8	11,3
Bayern	16,6	15,8	12,7	15,0	15,3
Saarland	18,1	(15,0)	(12,3)	(16,2)	(14,4)
Berlin (West)	19,2	17,7	18,0	17,9	20,3
Bundesgebiet	13,1	11,9	10,9	12,2	12,5

Andere Organe

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	3	3	3	1	2
Hamburg	6	8	2	2	-
Niedersachsen	17	16	13	18	11
Bremen	1	3	1	1	-
Nordrhein-Westfalen	25	25	28	49	35
Hessen	5	10	6	15	7
Rheinland-Pfalz	5	9	11	8	7
Baden-Württemberg	16	25	20	18	20
Bayern	12	21	19	15	22
Saarland	-	3	1	-	-
Berlin (West)	12	10	8	2	8
Bundesgebiet	102	133	112	129	112

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Bundesgebiet	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8
--------------	-----	-----	-----	-----	-----