

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

2. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/II - vj 2/66
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

Seite

Vorbemerkung	3
--------------------	---

Tabellenteil

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose im 2. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs im 2. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (Grund- und Verhältniszahlen)	6

Erkrankungs- und Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Erkrankungs- bzw. Sterbefälle beruhen, wurden eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Zu diesen Meldungen zählen als Zugänge nur Erkrankte mit einer aktiven Tuberkulose (Gruppe I, entsprechend den Erläuterungen zur Tuberkulosestatistik vom November 1965 des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose), und zwar:

- a) Alle erstmals bekannt gewordenen Tuberkulösen einschließlich der Reaktivierten, d. h. jener Kranken, deren Tuberkulose inaktiv war und im Berichtszeitraum aktiv geworden ist.
- b) Alle Tuberkulösen, die in früheren Jahren aus der Tuberkulosefürsorge ausgeschieden waren und im Berichtszeitraum erneut erkrankten.
- c) Alle Tuberkulösen, die nach Umzug von einem in einen anderen Fürsorgebezirk dort registriert werden.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Zugänge an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten und zweiten Vierteljahres 1966 und zum Vergleich die der Vierteljahre 1965 aufgrund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach der Art und Form der Tuberkulose

im 2. Vierteljahr 1966

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose				
	der Atmungsorgane			anderer Organe (aktiv extrapul- monal)	ins- gesamt
	an- steckungs- fähig (offen)	nichtansteck- ungsfähig (aktiv geschlossen)	zusammen		

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	157	323	480	83	563
Hamburg	178	445	623	97	720
Niedersachsen	498	1 155	1 653	262	1 915
Bremen	49	137	186	38	224
Nordrhein-Westfalen	1 557	2 743	4 300	589	4 889
Hessen	365	733	1 098	291	1 389
Rheinland-Pfalz	343	471	814	172	986
Baden-Württemberg	675	1 711	2 386	419	2 805
Bayern	805	1 657	2 462	329	2 791
Saarland	127	130	257	39	296
Berlin (West)	225	500	725	103	828
Bundesgebiet	4 979	10 005	14 984	2 422	17 406
dagegen 2. Vj. 1965	3 940	7 974	11 914	2 212	14 126

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	25,7	52,8	78,5	13,6	92,1
Hamburg	38,6	96,4	134,9	21,0	155,9
Niedersachsen	28,8	66,7	95,5	15,1	110,6
Bremen	(26,4)	73,8	100,1	(20,5)	120,6
Nordrhein-Westfalen	37,2	65,5	102,7	14,1	116,8
Hessen	23,1	56,4	84,6	22,4	107,0
Rheinland-Pfalz	33,2	52,5	90,7	19,2	109,9
Baden-Württemberg	31,9	80,8	112,6	19,8	132,4
Bayern	31,8	65,4	97,1	13,0	110,1
Saarland	45,0	46,1	91,2	(13,8)	105,0
Berlin (West)	41,2	91,5	132,7	18,8	151,5
Bundesgebiet	33,5	67,4	100,9	16,3	117,2
dagegen 2. Vj. 1965	26,8	54,3	81,1	15,1	96,1

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs

im 2. Vierteljahr 1966

(vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe (aktiv extrapulmonal)		
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)					
	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulöse 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulöse 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulöse 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	117	35	5	238	61	24	65	15	3
Hamburg	142	33	3	308	123	14	85	11	1
Niedersachsen	308	136	54	752	284	119	191	51	20
Bremen	32	17	-	98	36	3	30	7	1
Nordrhein-Westfalen	862	670	25	1 325	1 369	49	486	83	20
Hessen	283	71	11	537	135	61	235	44	12
Rheinland-Pfalz	250	79	14	360	88	23	148	23	1
Baden-Württemberg	439	208	28	1 199	457	55	345	69	5
Bayern	551	242	12	1 189	440	28	273	53	3
Saarland	113	14	-	122	6	2	38	-	1
Berlin (West)	157	68	.	394	106	.	84	19	.
Bundesgebiet	3 254	1 573	152	6 522	3 105	378	1 980	375	67

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	19,1	(5,7)	(0,8)	38,9	10,0	(3,9)	10,6	(2,5)	(0,5)
Hamburg	30,8	(7,1)	(0,6)	66,7	26,6	(3,0)	18,4	(2,4)	(0,2)
Niedersachsen	17,8	7,9	3,1	43,4	16,4	6,9	11,0	2,9	(1,2)
Bremen	(17,2)	(9,2)	-	52,8	(19,4)	(1,6)	(16,2)	(3,8)	(0,5)
Nordrhein-Westfalen	20,6	16,0	(0,6)	31,6	32,7	(1,2)	11,6	2,0	(0,5)
Hessen	21,8	5,5	(0,8)	41,4	10,4	4,7	18,1	(3,4)	(0,9)
Rheinland-Pfalz	27,9	8,8	(1,6)	40,1	9,8	(2,6)	16,5	(2,6)	(0,1)
Baden-Württemberg	20,7	9,8	(1,3)	56,6	21,6	2,6	16,3	3,3	(0,2)
Bayern	21,7	9,5	(0,5)	46,9	17,4	(1,1)	10,8	2,1	(0,1)
Saarland	40,1	(5,0)	-	43,3	(2,1)	(0,7)	(13,5)	-	(0,4)
Berlin (West)	28,7	12,4	.	72,1	19,4	.	15,4	(3,5)	.
Bundesgebiet	21,9	10,6	1,0	43,9	20,9	2,5	13,3	2,5	0,5

1) Einschl. der Übergänge aus den Gruppen II c, II d, III, V. - 2) Bzw. Reaktivierete. - 3) In Niedersachsen und Hessen einschl. der Zuzüge aus den Fürsorgebezirken innerhalb der Länder.

3. Sterbefälle an Tuberkulose
(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1965				1966	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Atmungsorgane						
Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	83	80	67	77	82	71
Hamburg	71	65	58	50	60	54
Niedersachsen	210	207	180	180	213	186
Bremen	12	11	11	23	25	19
Nordrhein-Westfalen	501	434	441	518	458	459
Hessen	105	97	93	119	108	90
Rheinland-Pfalz	119	110	104	107	109	116
Baden-Württemberg	231	215	211	230	236	211
Bayern	408	395	322	381	382	356
Saarland	50	42	35	46	40	31
Berlin (West)	104	97	100	99	110	63
Bundesgebiet	1 894	1 753	1 622	1 830	1 823	1 656
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr						
Schleswig-Holstein	14,0	13,3	10,9	12,5	13,6	11,6
Hamburg	15,5	14,0	12,4	10,7	13,1	11,7
Niedersachsen	12,4	12,1	10,3	10,3	12,5	10,7
Bremen	(6,6)	(6,0)	(5,9)	(12,3)	(13,6)	(10,2)
Nordrhein-Westfalen	12,3	10,5	10,5	12,3	11,1	11,0
Hessen	8,4	7,6	7,2	9,1	8,5	6,9
Rheinland-Pfalz	13,6	12,4	11,5	11,9	12,3	12,9
Baden-Württemberg	11,3	10,3	10,0	10,8	11,3	10,0
Bayern	16,6	15,8	12,7	15,0	15,3	14,0
Saarland	18,1	(15,0)	(12,3)	(16,2)	(14,4)	(11,0)
Berlin (West)	19,2	17,7	18,0	17,9	20,3	11,5
Bundesgebiet	13,1	11,9	10,9	12,2	12,5	11,1
Andere Organe						
Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	3	3	3	1	2	5
Hamburg	6	8	2	2	-	4
Niedersachsen	17	16	13	18	11	17
Bremen	1	3	1	1	-	-
Nordrhein-Westfalen	25	25	28	49	35	25
Hessen	5	10	6	15	7	12
Rheinland-Pfalz	5	9	11	8	7	6
Baden-Württemberg	16	25	20	18	20	25
Bayern	12	21	19	15	22	22
Saarland	-	3	1	-	-	2
Berlin (West)	12	10	8	2	8	6
Bundesgebiet	102	133	112	129	112	124
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr						
Bundesgebiet	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8