

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland Wachstumstand

Anfang Juni 1961

Hinweis:

Die bisher in der Sammelreihe Statistische Berichte III/4 veröffentlichten Ergebnisse der Berichterstattung über Wachstumstand und Ernte der landwirtschaftlichen Feldfrüchte und des Grünlandes erscheinen nunmehr in der

Reihe 1: „Bodennutzung und Ernte“
innerhalb der neuen Fachserie „Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei“.



Jahrgang 1961 Nr.3
VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ



64.1500

Nachdem bis in den Monat Mai eine für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Früchte recht günstige Witterung herrschte, setzte darauf eine langanhaltende Regenperiode mit relativ niedrigen Temperaturen fast in der ganzen Bundesrepublik ein. Der Vorsprung, den die Vegetation in diesem Frühjahr gegenüber normalen Jahren hatte, ist dadurch wieder ganz verloren gegangen.

Der Stand des Wintergetreides, der sich mit Ausnahme der Wintergerste gegenüber dem Vormonat wieder verschlechterte, wird auch ungünstiger als Anfang Juni 1960 beurteilt. Die Note für Winterroggen lautet im Bundesdurchschnitt 2,7 gegenüber 2,6 im Vormonat und 2,4 im Juni des vergangenen Jahres. Während in Süddeutschland die Noten für Winterroggen noch verhältnismäßig günstig sind, wird sein Stand in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nur etwa mit mittel beurteilt. Auch beim Winterweizen hat sich die neueste Wachstumsstandsnote im Bundesdurchschnitt gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkt auf 2,5 verschlechtert und steht um 0,2 Punkte ungünstiger als im Vorjahr. Ebenso ist auch beim Winterweizen die Beurteilung in Süddeutschland mit 2,3 bis 2,4 günstiger, während die Noten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 2,8 bzw. 2,9 lauten. Der Stand der Wintergerste, die schon verhältnismäßig weit entwickelt war, hat sich gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkt verbessert. Verglichen mit dem Juni 1960 steht sie mit 2,5 um 0,2 Punkte günstiger. Die Beurteilung ist in den einzelnen Ländern ziemlich gleichmäßig. Der Stand des Wintermengengetreides ist etwa der gleiche wie bei Winterroggen. Eine unveränderte Beurteilung sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahr hat nur der Raps mit 2,6. In einigen weniger bedeutenden Anbaugebieten haben sich die Noten für Winterraps etwas verschlechtert, in Nordrhein-Westfalen sogar auf 3,0. Aber in dem Hauptanbaugbiet Schleswig-Holstein hat sich die Note vom Mai zum Juni d. J. von 2,7 auf 2,6 verbessert.

Von den überwinternden Fruchtarten haben die Futterpflanzen relativ den besten Stand, da sie im Frühjahr sehr gut gewachsen waren und die große Feuchtigkeit ihnen nicht besonders schadete. Klee und auch Luzerne werden im Bundesdurchschnitt mit 2,3 beurteilt, womit sie etwa ebenso wie im Vormonat stehen, aber um 0,5 bzw. 0,2 Punkte besser als im Vorjahr. Bei Wiesen und Weiden war die Beurteilung Anfang Juni d. J. etwas schlechter als im Vormonat, da durch die Kälte das Wachstum etwas stockte. Der Stand der Wiesen hat sich um 0,1 Punkt auf 2,3 und der der Viehweiden um 0,3 Punkte auf 2,5 verschlechtert.

Deutliche Nässeschäden und stockendes Wachstum infolge des kalten Wetters zeigen dagegen in weiten Gebieten die Sommergetreidearten, Hülsenfrüchte und auch die Hackfrüchte. Die Noten für Sommergetreide liegen im Bundesdurchschnitt zwischen 2,8 und 3,0 gegenüber 2,5 bis 2,6 im Juni des vergangenen Jahres. Für die Sommergetreidearten werden aus einigen Ländern sogar Noten gemeldet, die schlechter als mittel sind, insbesondere aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In Süddeutschland ist die Beurteilung des Sommergetreides dagegen etwas besser.

Der Stand der Frühkartoffeln wird in diesem Jahr ebenso wie im Juni 1960 beurteilt. Im Bundesdurchschnitt lautet die Note 2,8, aber in Niedersachsen geht sie bis auf 3,1 zurück, während die Frühkartoffeln in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg besser beurteilt werden. Die Spätkartoffeln haben im Bundesdurchschnitt nur einen mittleren Stand. Am schlechtesten werden sie in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit 3,3 beurteilt. Aber auch in Hessen ist die Note mit 3,2 nicht viel besser, in Schleswig-Holstein erreicht sie 3,0 und nur in den süddeutschen Ländern stehen die Spätkartoffeln mit 2,8 bis 2,9 etwas günstiger. Aus diesen Noten ist

zu ersehen, daß die schwereren Böden stark durch die Übernässung zu leiden hatten. In einigen Fällen ist sogar Nachtfrostschaden aufgetreten und durch die ungünstige Witterung hat der Unkrautwuchs überhandgenommen.

Die Noten für Zucker- und Futterrüben lauten im Bundesdurchschnitt 2,9. Ebenso wie bei den anderen schon genannten Fruchtarten ist auch bei diesen Hackfrüchten der Stand in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen am schlechtesten, wo die Noten sogar bis auf 3,3 zurückgehen. In den anderen Gebieten wird dagegen der Stand der Rüben mit mittel oder etwas besser beurteilt.

Infolge des feuchten Wetters treten auch Schädlinge und Krankheiten am Getreide und den Hackfrüchten in verhältnismäßig größerem Umfang auf.

Wachstumstand im Bundesgebiet ¹⁾

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

| Winterfrüchte usw. | 1961 | | 1960 Juni | Sommerfrüchte | 1961 | 1960 |
|---|------|-----|--------------|--------------------|------|------|
| | Juni | Mai | | | Juni | |
| Winterroggen | 2,7 | 2,6 | 2,4 | Sommerroggen | 2,8 | 2,6 |
| Winterweizen und Spelz | 2,5 | 2,4 | 2,3 | Sommerweizen | 2,8 | 2,6 |
| Wintergerste | 2,5 | 2,6 | 2,7 | Sommergerste | 2,8 | 2,5 |
| Wintermenggetreide | 2,7 | 2,5 | 2,4 | Hafer | 2,8 | 2,6 |
| Winterraps | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Sommermenggetreide | 3,0 | 2,6 |
| Klee | 2,3 | 2,3 | 2,8 | Erbsen | 2,8 | 2,6 |
| Luzerne | 2,3 | 2,2 | 2,5 | Ackerbohnen | 2,7 | 2,7 |
| Wiesen | 2,3 | 2,2 | 2,7 | Frühkartoffeln | 2,8 | 2,8 |
| Viehweiden | 2,5 | 2,2 | 2,6 | Spätkartoffeln | 3,0 | 2,9 |
| | | | | Zuckerrüben | 2,9 | 2,6 |
| | | | | Futterrüben | 2,9 | 2,7 |
| Rübsen (Winter- u. Sommerfrucht) zusammen | 2,6 | 2,7 | 2,6 | Sommerraps | 2,7 | 2,7 |
| | | | | Mohn | 2,8 | 3,0 |

¹⁾ Ohne Bremen und Berlin.

Weitere Ergebnisse, z.T. in tieferer regionaler Gliederung, in den Veröffentlichungen aller Statistischen Landesämter unter der Nr. C II 1.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Wachstumstand

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

| Lfd. Nr. | Land | 1961 | Winter- | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---------|-------------------------------|--------|
| | | | Roggen | Weizen (einschl. Spelz) | Gerste |
| 1 | Schleswig-Holstein | Juni | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| 2 | " " | Mai | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| 3 | Hamburg | Juni | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| 4 | " | Mai | 2,4 | 2,1 | 2,6 |
| 5 | Niedersachsen | Juni | 2,9 | 2,9 | 2,5 |
| 6 | " | Mai | 2,7 | 2,9 | 2,7 |
| 7 | Bremen | Juni | . | . | . |
| 8 | " | Mai | . | . | . |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | Juni | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| 10 | " " | Mai | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
| 11 | Hessen | Juni | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| 12 | " | Mai | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | Juni | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 14 | " " | Mai | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 15 | Baden-Württemberg | Juni | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 16 | " " | Mai | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 17 | Bayern | Juni | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 18 | " | Mai | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 19 | Saarland | Juni | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| 20 | " | Mai | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 21 | Bundesgebiet o. Berl. ¹⁾ | Juni | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 22 | " " " | Mai | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| 23 | Berlin (West) | Juni | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| 24 | " " | Mai | 2,3 | 2,4 | 2,4 |

¹⁾ Ohne Bremen

Wachstumsstand

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

| A. | Land | Juni | Sommer- roggen | Sommer- weizen | Sommer- gerste | Hafer | Sommer- mengge- treide |
|----|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| | Schleswig-Holstein | 1961 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| | " " | 1960 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| | Hamburg | 1961 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| | " " | 1960 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| | Niedersachsen | 1961 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| | " " | 1960 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | Bremen | 1961 | . | . | . | . | . |
| | " " | 1960 | . | . | . | . | . |
| | Nordrhein-Westfalen | 1961 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| | " " | 1960 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | Hessen | 1961 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | " " | 1960 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| | Rheinland-Pfalz | 1961 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| | " " | 1960 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
| | Baden-Württemberg | 1961 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| | " " | 1960 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| | Bayern | 1961 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| | " " | 1960 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| | Saarland | 1961 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| | " " | 1960 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| | Bundesgebiet o. Berl. ¹⁾ | 1961 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
| | " " " | 1960 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| | Berlin (West) | 1961 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
| | " " | 1960 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |

Ohne Bremen

Anfang Juni 1961

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

| Winter- | | Rübsen (Winter- und Sommer- frucht) | Klee (auch im Gemisch mit Gräsern) | Luzerne | Wiesen | Vieh- weiden | Lfd. Nr. |
|-------------------|------|---|--|---------|--------|-----------------|-------------|
| Meng- getreide | Raps | | | | | | |
| - | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 1 |
| - | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2 |
| 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3 |
| 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 4 |
| 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 5 |
| 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 6 |
| . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 9 |
| 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 10 |
| 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 11 |
| 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 12 |
| 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 13 |
| 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 14 |
| 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 15 |
| 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 16 |
| 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 17 |
| 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 18 |
| 2,2 | 2,4 | . | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 19 |
| 2,1 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 20 |
| 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 21 |
| 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 22 |
| 2,0 | - | - | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 23 |
| 2,3 | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 24 |

Anfang Juni 1961

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

| Erbsen | Acker- bohnen | Frühkar- toffeln | Spätkar- toffeln | Zucker- rüben | Futter- rüben | Sommer- raps | Mohn | Lfd. Nr. |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------------|
| 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | . | 1 |
| 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2 |
| 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | - | 3 |
| 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | - | 4 |
| 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 5 |
| 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 6 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 9 |
| 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 10 |
| 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 11 |
| 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 4,1 | 12 |
| 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 13 |
| 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 14 |
| 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 15 |
| 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 16 |
| 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 17 |
| 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 18 |
| 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | . | 19 |
| 2,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | . | 20 |
| 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 21 |
| 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 22 |
| . | . | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | . | . | 23 |
| . | - | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | - | - | 24 |