

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

**Wachstumstand und Ernteschätzung
von Gemüse**

Mai 1966



Bestellnummer: B 2/1 - 6/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterung zum Tabellenteil: Übersicht über die Witterung	4
Wachstumstand von Gemüse	5
Ernteschätzung überwinternder Gemüsearten u. Frühjahrsspinat	6
Ernteschätzung in einigen Hauptanbaugebieten im Mai 1965	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juni 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

In der Berichterstattung über das Gemüse zeigt die Beurteilung der Witterungsfaktoren nach dem Stand von Mitte Mai ein erhebliches Überwiegen der mittleren Bewertung, bei den Niederschlägen mit 81 % der Meldungen als ausreichend und beim Temperaturverlauf mit 74 % als normal. Der Unterschied gegenüber der kalten, niederschlagsreichen Witterung des Vorjahres ist erheblich.

Beurteilung des Witterungsverlaufes in % der
ausgewerteten Berichte
für Mai 1966

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperaturverlauf		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	1	87	12	11	78	11
Hamburg	26	57	17	17	57	26
Niedersachsen	5	76	21	11	70	19
Bremen
Nordrhein-Westfalen	11	68	21	15	63	22
Hessen	10	86	4	9	79	12
Rheinland-Pfalz	10	89	1	15	81	4
Baden-Württemberg	6	85	9	14	76	10
Bayern	3	82	15	16	75	8
Saarland	-	100	-	-	100	-
Berlin (West)	58	42	-	33	67	-
<u>Bundesgebiet</u>	6	81	13	13	74	13
April	-	30	70	1	36	63
Mai 1965	0	30	70	.	17	83

Die Noten für den Wachstumsstand zeigen bei den bereits im April benoteten frühen Sorten des Weißkohls, Rotkohls, Wirsings, der Möhren und bei den Winterzwiebeln Verbesserungen um bis zu drei Zehntelnoten. Am geringsten und mit der schwächsten Verbesserung gegenüber dem April wurde der Frührotkohl bewertet (Note 2,9). Bei den anderen Arten und auch bei den im Mai erstmalig in die Beurteilung einbezogenen Frischerbsen und Dicken Bohnen bewegen sich die Noten bei oder leicht unter der Mitte zwischen gut und mittel.

Die endgültigen Ernteschätzungen für die im Freien überwinternden Gemüsearten Adventswirsing, Winterkopfsalat und Winterspinat erbrachten Hektarerträge, die um 10 - 20 % über dem Vorjahr und über dem sechsjährigen Durchschnitt liegen. Trotzdem ist die Erntemenge kleiner als nach den Vergleichsangaben, da die Flächen erheblich kleiner waren, während sie beim Winterspinat dank einer beachtlichen Flächenerweiterung um über 30 % das Vorjahr und den Durchschnitt übertrifft. Auch beim Frühjahrsspinat ergaben sich starke Verbesserungen, so daß an Winter- und Frühjahrsspinat zusammen etwa 34 000 t gegen etwa 26 000 t im Vorjahr zur Verfügung standen.

Wachstumstand des Gemüses im Mai 1966
(gegenüber April)

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Zeit	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wir- sing	Frühe Möh- ren	Winter- zwie- beln	Frisch- erbsen	Dicke Boh- nen
Schleswig-Holstein	Mai	2,6	2,7	2,8	2,7	-	2,6	2,6
	April	3,3	3,3	3,2	3,1	-	.	.
Hamburg	Mai	2,8	2,9	3,1	3,0	2,8	2,3	2,7
	April
Niedersachsen	Mai	2,7	2,8	2,8	2,7	2,4	2,6	2,7
	April	3,2	3,4	3,2	2,9	3,0	.	.
Bremen	Mai
	April
Nordrhein-Westfalen	Mai	2,5	2,6	2,4	2,7	2,7	2,5	2,3
	April	2,9	3,1	2,8	3,2	3,5	.	.
Hessen	Mai	2,6	2,7	2,5	2,7	2,6	2,7	2,7
	April	2,8	2,8	2,7	2,9	3,0	.	.
Rheinland-Pfalz	Mai	2,5	2,3	2,3	2,6	2,5	2,2	2,3
	April	2,5	2,5	2,5	2,6	2,8	.	.
Baden-Württemberg	Mai	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,2
	April	2,4	2,6	2,5	2,7	2,5	.	.
Bayern	Mai	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	2,5	2,4
	April	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	.	.
Saarland	Mai	2,0	2,1	2,0	2,0	2,4	2,3	2,0
	April	2,4	2,7	2,5	2,5	2,2	.	.
Berlin (West)	Mai	2,6	2,4	2,6	2,8	-	3,0	3,0
	April	2,6	2,6	2,6	2,9	-	.	.
<u>Bundesgebiet</u>	Mai	2,6	2,9	2,5	2,7	2,6	2,6	2,5
	April	2,9	3,0	2,8	2,9	2,8	.	.
	1965 Mai	2,8	2,9	2,7	2,9	2,5	2,8	2,6

Ernteschätzung
(gegenüber

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	qz	
1	Schleswig-Holstein	1966	-	-	-
2		1965	-	-	-
3	Hamburg	1966	-	-	-
4		1965	-	-	-
5	Niedersachsen	1966	-	-	-
6		1965	-	-	-
7	Bremen	1966	-	-	-
8		1965	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1966	157	193,9	30 445
10		1965	174	174,5	30 532
11	Hessen	1966	1	299,5	299
12		1965	1	220,4	220
13	Rheinland-Pfalz	1966	39	191,6	7 490
14		1965	35	146,6	5 056
15	Baden-Württemberg	1966	-	-	-
16		1965	-	-	-
17	Bayern	1966	-	-	-
18		1965	-	-	-
19	Saarland	1966	2	119,8	215
20		1965	2	129,1	210
21	Berlin (West)	1966	-	-	-
22		1965	-	-	-
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	199	193,2	38 447
24		1965	212	169,0	35 818
25		Ø 1960/65	197	167,5	32 988

von Gemüse im Mai
Anbau und Ernte 1965).

Winterkopfsalat			Winterspinat			Frühjahresspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	59	124,9	7 369	1
-	-	-	1	111,3	111	17	131,4	2 234	2
2	126,7	253	3	122,0	366	100	175,8	17 580	3
2	132,5	265	2	120,0	240	104	194,7	20 249	4
3	107,3	279	256	113,6	29 070	499	108,2	53 960	5
12	110,4	1 347	126	103,5	13 082	421	98,3	41 336	6
0	.	.	0	140,7	38	3	209,6	662	7
0	.	.	0	.	.	3	117,9	350	8
7	116,1	813	237	118,1	27 991	446	123,2	54 964	9
9	114,2	1 028	149	117,7	17 534	359	109,4	39 290	10
11	144,3	1 587	15	105,4	1 581	73	116,3	8 490	11
7	91,4	640	20	110,9	2 218	42	143,3	6 019	12
32	130,3	4 203	273	147,0	40 115	110	122,5	13 434	13
65	103,6	6 777	188	126,1	23 755	86	107,4	9 217	14
48	241,6	11 524	156	156,7	24 492	220	128,1	28 246	15
68	238,2	16 269	192	158,7	30 486	182	124,0	22 518	16
23	101,3	2 330	155	107,2	16 616	93	92,9	8 640	17
18	65,1	1 172	225	80,9	18 203	103	79,9	8 230	18
0	101,1	47	6	127,4	753	18	139,7	2 530	19
0	89,9	38	9	129,9	1 207	18	147,8	2 696	20
0	.	.	15	91,7	1 347	9	85,0	720	21
3	110,0	330	17	79,7	1 323	13	84,8	1 066	22
126	167,0	21 036	1 116	127,6	142 369	1 630	120,6	196 595	23
184	151,4	27 866	929	116,4	108 159	1 348	113,7	153 205	24
161	139,8	22 502	908	113,4	102 972	1 532	116,6	178 666	25

4. Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten Mai 1966

dz/ha

Hauptanbauggebiet Land			Advents- wirsing	Winter- kopfsalat	Winter- spinat	Frühjahrs- spinat
Landkreis	Northeim	Ndsa	-	97,5	.	.
	Springe		-	140,0	.	.
	Hildesheim-Mbg.		-	120,0	170,3	.
	Hannover		-	.	137,5	117,5
	Braunschweig		-	.	133,8	131,4
	Wolfenbüttel		-	.	95,0	62,5
	Harburg		-	.	.	135,0
	Bonn	NW	206,3	105,0	115,6	38,8
	Soest		.	94,5	.	.
	Köln		.	.	93,6	.
	Recklinghausen		.	.	.	130,0
	Kempen-Krefeld		.	.	.	129,9
	Geldern		.	.	.	62,2
	Grevenbroich		.	.	.	111,2
KrfSt	Düsseldorf		.	.	.	151,3
KrfSt u. Ldkr	Koblenz	PhPf	144,8	93,0	122,3	
	Mainz		.	106,0	175,4	
	Worms		.	.	.	125,0
	Frankenthal		236,0	165,0	147,8	124,0
	Ludwigshafen		145,9	93,8	148,0	129,0
	Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	-	184,0	165,0	137,2
	Unteres Neckartal u. Kraichgau		-	205,7	142,6	119,6
	Unteres Rheintal		-	223,3	149,6	130,2
	Breisgau u. Kaiserstuhl		-	199,6	143,8	130,2
	Konstanz m. Insel Reichenau		-	270,9	208,9	103,6
	Oberes Gäugebiet		-	157,5	110,0	97,8
	Nörtl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw		-	176,7	163,1	124,7
KrfSt	München	Bay	-	.	120,0	103,0
	Nürnberg		-	.	.	92,0
Ldkr	Kitzingen		-	.	129,0	.