

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse**

**August 1967**



Bestellnummer : B 2/1 - 14/67

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen . . . . .	3
1. Wachstumstand des Gemüses im August 1967 . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im August 1967 . . . . .	6
3. Begutachtung des Spargelkrautes im August 1967 . . . . .	7
4. Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten im August 1967 . . . . .	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im September 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Der Witterungsverlauf wurde von den Berichterstattern für die Zeit vom 21. Juli bis zum 20. August als für den Gemüsebau etwa ebenso günstig wie im Vormonat beurteilt.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im August 1967  
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	1	79	20	26	73	1
Hamburg	-	92	8	12	80	8
Niedersachsen	7	80	13	29	66	5
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	25	73	2	44	56	-
Hessen	33	67	-	53	47	-
Rheinland-Pfalz	29	69	2	43	55	2
Baden-Württemberg	22	76	2	28	71	1
Bayern	39	61	-	38	62	-
Saarland	45	55	-	41	59	-
Berlin (West)	19	81	-	12	88	-
<u>Bundesgebiet</u> Aug. 1967	20	74	6	33	65	2
Juli 1967	24	73	3	30	69	1
Aug. 1966	3	54	43	2	50	48

Der Wachstumstand der späten Gemüsearten war im August - bei einer Streuung der Noten zwischen 2,2 und 2,6 - besser als normal.

Die von den Berichterstattern geschätzten Hektarerträge für Steckzwiebeln und Stangenbohnen liegen um 18 bzw. 14 % über den Ergebnissen von 1966 und stellen für das Bundesgebiet bisher nie erreichte Spitzenenerträge dar. Die Erntemengen sind bei Steckzwiebeln, deren Anbaufläche um 9 % ausgedehnt wurde, um 29 % höher als im vorigen Jahr, während bei Stangenbohnen eine um 14 % größere Ernte zu verzeichnen ist.

Nach dem Ergebnis der Begutachtung des Spargelkrautes, das besser als im Vorjahr und selbst noch etwas besser als nach dem guten Stand von 1965 ist, sind die Voraussetzungen für die Ernte 1968 als sehr günstig zu bezeichnen.

1. Wachstumstand des

(gegenüber Juli 1967

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing
1	Schleswig-Holstein	Aug. 1967	2,1	2,3	2,1
2		Juli 1967	2,3	2,3	2,3
3		Aug. 1966	2,4	2,4	2,3
4	Hamburg	Aug. 1967	2,6	2,7	2,5
5		Juli 1967	2,9	3,0	3,0
6		Aug. 1966	2,3	2,5	2,4
7	Niedersachsen	Aug. 1967	2,3	2,5	2,5
8		Juli 1967	2,6	2,6	2,5
9		Aug. 1966	2,4	2,4	2,5
10	Bremen	Aug. 1967	.	.	.
11		Juli 1967	.	.	.
12		Aug. 1966	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Aug. 1967	2,3	2,3	2,3
14		Juli 1967	2,3	2,2	2,4
15		Aug. 1966	2,2	2,3	2,4
16	Hessen	Aug. 1967	2,4	2,6	2,5
17		Juli 1967	2,7	2,7	2,7
18		Aug. 1966	2,3	2,3	2,3
19	Rheinland-Pfalz	Aug. 1967	2,4	2,3	2,7
20		Juli 1967	2,5	2,3	2,3
21		Aug. 1966	2,3	2,3	2,3
22	Baden-Württemberg	Aug. 1967	2,1	2,2	2,2
23		Juli 1967	2,3	2,4	2,3
24		Aug. 1966	2,0	2,2	2,2
25	Bayern	Aug. 1967	2,5	2,5	2,5
26		Juli 1967	2,4	2,5	2,4
27		Aug. 1966	2,3	2,3	2,3
28	Saarland	Aug. 1967	2,2	2,2	2,1
29		Juli 1967	2,4	2,0	2,5
30		Aug. 1966	2,1	2,1	2,0
31	Berlin (West)	Aug. 1967	2,5	2,5	2,5
32		Juli 1967	2,6	2,4	2,4
33		Aug. 1966	2,8	2,7	2,8
34	<u>Bundesgebiet</u>	Aug. 1967	2,2	2,3	2,3
35		Juli 1967	2,4	2,3	2,4
36		Aug. 1966	2,3	2,4	2,3

Gemüses im August 1967

und August 1966)

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Rosen- kohl	Mittelfrüher und Spätblumen- kohl	Spät- kohlraabi	Späte Möhren	Rote Rüben (Rote Bete)	Porree (Lauch)	Lfd. Nr.
2,2	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4	1
.	3,0	.	2,7	.	.	2
2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4	3
2,6	2,7	2,7	2,8	2,6	2,8	4
.	3,0	.	3,1	.	.	5
2,5	2,8	2,6	3,1	2,4	2,7	6
2,5	2,7	2,6	2,4	2,3	2,5	7
.	2,8	.	2,4	.	.	8
2,6	2,8	2,4	2,6	2,5	2,6	9
.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	.	12
2,5	2,7	2,4	2,3	2,0	2,4	13
.	2,5	.	2,2	.	.	14
2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,4	15
2,6	2,8	2,5	2,6	2,6	2,6	16
.	2,8	.	2,7	.	.	17
2,4	2,7	2,4	2,4	2,4	2,3	18
2,8	2,4	2,4	2,4	2,3	2,6	19
.	2,5	.	2,5	.	.	20
2,4	2,7	2,0	2,3	2,1	2,2	21
2,2	2,5	2,3	2,2	2,1	2,3	22
.	2,5	.	2,3	.	.	23
2,3	2,4	2,2	2,3	2,2	2,1	24
2,6	2,8	2,5	2,4	2,3	2,5	25
.	2,7	.	2,4	.	.	26
2,4	2,6	2,4	2,4	2,3	2,3	27
2,5	2,5	2,6	2,1	2,5	2,0	28
.	2,5	.	2,0	.	.	29
2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	30
2,6	2,8	2,6	2,5	2,2	2,4	31
.	2,9	.	2,5	.	.	32
2,6	3,1	2,4	2,2	2,3	2,6	33
2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	34
.	2,6	.	2,5	.	.	35
2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	2,4	36

2. Ernteschätzung von Gemüse im August 1967  
(gegenüber Anbau und Ernte 1966)

Land	Jahr	Steckzwiebeln			Stangenbohnen (auch Prunk- und Feuerbohnen)		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz		ha	dz	
Schleswig-Holstein	1967	2	153,6	307	-	-	-
	1966	2	186,4	373	-	-	-
Hamburg	1967	3	176,0	528	19	164,4	3 124
	1966	2	201,5	403	24	127,3	3 055
Niedersachsen	1967	14	229,2	3 323	22	161,5	3 472
	1966	10	206,8	2 027	24	139,0	3 280
Bremen	1967	0	191,6	48	0	112,3	6
	1966	0	195,3	27	0	113,5	9
Nordrhein-Westfalen	1967	18	199,7	3 594	327	173,9	56 854
	1966	22	200,0	4 400	312	142,8	44 556
Hessen	1967	25	322,1	8 053	43	244,4	10 509
	1966	8	340,2	2 722	40	162,8	6 512
Rheinland-Pfalz	1967	185	268,8	49 801	65	127,6	8 243
	1966	172	217,4	37 334	67	123,0	8 207
Baden-Württemberg	1967	77	204,5	15 685	146	153,0	22 323
	1966	62	179,4	11 158	151	164,3	24 791
Bayern	1967	65	183,9	11 954	52	120,9	6 287
	1966	78	177,0	13 803	52	112,5	5 849
Saarland	1967	3	239,1	689	11	135,1	1 481
	1966	3	232,0	629	12	178,1	2 162
Berlin (West)	1967	0	.	.	1	78,5	72
	1966	1	193,6	108	4	89,8	369
<u>Bundesgebiet</u>	1967	392	239,8	93 982	686	163,8	112 71
	1966	360	202,7	72 984	686	144,0	90 790
	Ø 1961/66	396	194,0	76 843	838	129,7	106 700

### 3. Begutachtung des Spargelkrautes im August 1967

Land	Jahr	Anbau- fläche ha	Wuchsfreu- digkeit	Farbe		
				des Spargelkrautes		
			Note	dunkelgr.	hellgrün	gelblich
				in % der Anbaufläche		
Schleswig-Holstein	1967	82	2,3	74	26	-
	1966	82	2,5	53	47	-
Hamburg	1967	2	2,4	50	50	-
	1966	1	2,1	100	-	-
Niedersachsen	1967	1 583	2,2	94	6	0
	1966	1 448	2,5	80	20	0
Bremen	1967	0	.	.	.	.
	1966	0	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	1967	168	2,2	76	24	-
	1966	149	2,5	53	47	-
Hessen	1967	1 021	2,3	95	5	0
	1966	1 071	2,4	66	34	-
Rheinland-Pfalz	1967	713	2,2	81	19	0
	1966	739	2,6	37	63	0
Baden-Württemberg	1967	1 035	2,1	95	4	1
	1966	1 058	2,3	80	20	0
Bayern	1967	337	2,4	75	25	-
	1966	366	2,5	64	36	-
Saarland	1967	2	2,3	50	50	-
	1966	2	2,0	100	-	-
Berlin (West)	1967	4	2,7	50	50	-
	1966	5	2,4	50	70	-
<u>Bundesgebiet</u>	1967	4 947	2,2	89	11	0
	1966	4 921	2,4	66	34	0

4. Ernteschätzung in Hauptanbaubereichen im August 1967  
dz/ha

Hauptanbaubgebiet			Steckzwiebeln	Stangen- bohnen
Ldkr	Harburg	Ndsa	256,5	158,8
	Uelzen		213,9	.
	Goslar		.	144,1
	Wolfenbüttel		246,2	167,4
	Bonn	NW	150,5	172,7
	Köln		.	238,8
	Kempen-Krefeld		.	156,6
KrfrSt	Düsseldorf		250,0	.
KrfrSt und Ldkr	Koblenz	RhPf	.	123,0
	Mainz		.	135,2
	Frankenthal		.	149,6
	Landau		292,4	.
Ldkr	Bergzabern		.	136,3
	Germersheim		268,6	.
Oberes Neckartal und Remstal			BaWü	206,6
Unteres Neckartal und Kraichgau				187,1
Unteres Rheintal				196,0
Breisgau und Kaiserstuhl				253,4
Konstanz mit Insel Reichenau				219,0
Oberes Gäugebiet				156,3
Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw				159,0
KrfSt	Nürnberg	Bay	200,0	136,0
Ldkr	Schweinfurt		225,0	.
	Kitzingen		.	142,0