

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

April 1969

Eilbericht



Bestellnummer : 210210 - 690003

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Erntevorschätzung von überwinternden Gemüsearten . .	4
2. Wachstumsstand und voraussichtlicher Hektarertrag von Gemüse im April	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden
kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Mai 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -, 50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Infolge der vor allem im Februar und März vorherrschenden außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse wurden zu Beginn der diesjährigen Berichtszeit in verschiedenen Gebieten des Bundesgebietes bei den im Freien überwinterten Gemüsearten stärkere Auswinterungsschäden festgestellt.

Übersicht berichteter Anbauflächen
ha

Land	Adventswirsing		Winterkopfsalat		Winterspinat		Zusammen	
	Vorerhebung 1969	berichtet	Vorerhebung 1969	berichtet	Vorerhebung 1969	berichtet	Vorerhebung 1969	berichtet
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	3	3	2	2	5	5
Niedersachsen	10	3	12	3	230	226	252	232
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	183	183	7	7	84	84	274	274
Hessen	3	0	3	2	18	14	24	16
Rheinland-Pfalz	69	61	15	14	230	222	314	297
Baden-Württemberg	-	-	48	40	138	89	186	129
Bayern	-	-	27	14	83	52	110	66
Saarland	1	1	0	0	3	3	4	4
Berlin (West)	-	-	1	1	5	-	6	1
Bundesgebiet	266	248	116	84	793	692	1 175	1 024
Abnahme	ha	- 18		- 32		- 101		- 151
	%	- 7		- 28		- 13		- 13

Nach den Ergebnissen der Erntevorschätzung ist beim Winterspinat mit einer um rd. 16 % geringeren Erntemenge zu rechnen, während beim Adventswirsing und Winterkopfsalat gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um rd. 33 bzw. 40 % erwartet wird.

Durch die zum Teil erheblich verspätete Frühjahrsbestellung waren die Berichterstatter zum 20. April 1969 vielfach noch nicht in der Lage, den Wachstumsstand des Frühgemüses zu beurteilen oder gar eine Erntevorschätzung durchzuführen. Aus diesem Grunde ist es in diesem Jahr auch nicht möglich, hier ein Ergebnis für das Bundesgebiet zu veröffentlichen. Auch die Länderergebnisse beruhen zum Teil nur auf Meldungen aus klimatisch günstigen Anbaugebieten.

1. Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1969	-	-	-
2		1968	-	-	-
3	Hamburg	1969	-	-	-
4		1968	-	-	-
5	Niedersachsen	1969	3	120,0	360
6		1968	5	171,5	858
7	Bremen	1969	-	-	-
8		1968	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1969	183	163,1	29 848
10		1968	224	195,4	43 779
11	Hessen	1969	0	200,0	0
12		1968	0	210,0	.
13	Rheinland-Pfalz	1969	61	128,2	7 815
14		1968	64	181,1	11 531
15	Baden-Württemberg	1969	-	-	-
16		1968	-	-	-
17	Bayern	1969	-	-	-
18		1968	-	-	-
19	Saarland	1969	1	.	.
20		1968	3	144,1	379
21	Berlin (West)	1969	-	-	-
22		1968	1	.	.
23	Bundesgebiet	1969	248	153,3	38 023
24		1968	297	190,4	56 547

1) 1968: Endgültige Ergebnisse.

überwinternden Gemüsearten

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
3	137,5	413	2	116,4	233	3
2	146,1	292	3	130,9	393	4
3	110,0	330	226	99,1	22 397	5
2	134,4	215	76	114,3	8 651	6
-	-	-	0	.	.	7
-	-	-	-	-	-	8
7	113,7	796	84	121,8	10 230	9
9	115,2	1 037	139	117,1	16 280	10
2	143,8	288	14	135,4	1 896	11
2	127,5	255	23	174,9	4 023	12
14	92,7	1 286	222	138,0	30 675	13
25	108,9	2 672	270	156,4	42 312	14
40	247,9	9 866	89	158,1	14 055	15
60	272,4	16 507	99	154,5	15 234	16
14	76,3	1 068	52	91,1	4 737	17
27	101,0	2 727	121	105,6	12 778	18
0	.	.	3	.	.	19
0	.	.	4	128,2	570	20
1	.	.	-	-	-	21
-	-	-	7	90,6	654	22
84	167,2	14 047	692	121,7	84 223	23
127	186,7	23 705	742	136,0	100 895	24

2. Wachstumstand und voraussichtlicher
Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel,

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Spargel	Frühkohlrabi	
			Note	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag
					dz
1	Schleswig-Holstein	1969	.	.	.
2		1968	.	.	.
3	Hamburg	1969	3,1	.	.
4		1968	2,0	3,5	190,4
5	Niedersachsen	1969	3,1	3,4	120,2
6		1968	2,7	3,3	126,2
7	Bremen	1969	.	.	.
8		1968	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1969	2,8	3,0	.
10		1968	2,8	3,1	.
11	Hessen	1969	3,0	3,4	162,9
12		1968	2,7	3,0	170,5
13	Rheinland-Pfalz	1969	2,5	3,0	133,3
14		1968	2,5	2,8	146,4
15	Baden-Württemberg	1969	2,9	3,1	207,8
16		1968	2,5	2,7	187,0
17	Bayern	1969	3,0	3,3	139,0
18		1968	2,7	3,0	154,2
19	Saarland	1969	.	3,0	.
20		1968	.	2,1	.
21	Berlin (West)	1969	3,0	3,5	.
22		1968	2,5	2,7	135,0
24	Bundesgebiet	1969	.	.	.
25		1968	2,6	3,1	159,7

Hektarertrag von Gemüse im April

4 = gering, 5 = sehr gering

Frühjahrskopfsalat		Frühjahrsspinat		Lfd. Nr.
Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	
	dz		dz	
.	.	.	.	1
.	.	.	.	2
4,0	167,6	3,4	143,8	3
3,4	115,1	3,6	107,3	4
3,2	153,0	3,0	106,6	5
.	.	.	.	6
.	.	.	.	7
.	.	.	.	8
3,0	.	3,3	.	9
3,2	.	2,9	.	10
3,3	152,9	3,4	123,0	11
3,0	167,3	2,9	106,2	12
3,0	122,0	2,9	110,5	13
2,8	120,4	2,7	100,9	14
2,8	209,8	2,7	137,6	15
2,5	186,0	2,4	129,8	16
3,3	125,1	3,2	84,1	17
2,8	146,7	2,7	86,1	18
3,0	.	3,1	.	19
2,0	.	2,0	.	20
3,5	.	3,5	.	21
2,8	93,0	3,0	65,8	22
3,0	154,9	2,8	112,9	23
				24