

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Weinmosternte

1963



Bestellnummer: B 2/III - 9/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Die Weinmosternte 1963	3
2. Texttabelle.	
a) Allgemeine Angaben.	3
b) Ertragschätzungen	4
c) Ergebnisse nach Weinbaulandschaften	6
d) Verkaufserlöse Most	7
e) Verkaufserlöse Speisetrauben.	7
3. Ende der Lese.	8
4. Rebflächen, Mosterträge und Güte des Mostes	
a) Weinmost insgesamt.	10
b) Weißmost.	14
c) Rotmost	18
d) Most aus gemischten Beständen	21
5. Mostgewicht und Säuregehalt.	22
6. Mosterträge wichtiger Rebsorten.	26
7. Mostausbeute wichtiger Rebsorten	28

Die letzte Darstellung der Methoden ist in "Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206, erschienen.

Erschienen im Januar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Mit der Berichterstattung von Ende November, deren Ergebnisse hier zusammengefaßt werden, enden die Feststellungen für das Jahr 1963. Die Beurteilung der Witterungsverhältnisse für den Rebbau zeigt eine gewisse Verbesserung gegenüber den letzten Ermittlungen von Mitte Oktober. Etwas mehr als die Hälfte der Berichterstatter bezeichneten die Witterung als mittel u. 44% als gut für die Reben, so daß nur 3% mit einer schlechten Bewertung verblieben. Im November 1962 war der Anteil von gut mit 61 % wesentlich größer. Ein gleichgerichteter Unterschied gegenüber dem Vorjahr ist bei der Sonnenscheindauer ersichtlich, während bei den Niederschlägen die mittlere Beurteilung einen mehr als doppelt so großen Anteil wie vor einem Jahr erreichte und über 90 % der Bezirke betraf. Auch der Temperaturverlauf erhielt nur von 5 % der Berichterstatter eine ungünstige Note. Besondere Wetterschäden sind nur schwach und in unerheblichem Umfang, nämlich in 3 % der Bezirke aufgetreten.

Das Ende der Lese lag nur beim Riesling in mehr als der Hälfte der Bezirke (55%) nach dem 1. November. Für den Silvaner beträgt dieser Anteil nur 26 %. Für den Müller-Thurgau war am 31. Oktober praktisch die gesamte Lese beendet. In 53 % der Bezirke endete die Lese bei dieser Rebsorte gegen Mitte Oktober zwischen dem 11. und 20. X. Noch etwas früher wurde die Lese beim Portugieser abgeschlossen. Im Vergleich 1962 ist allgemein ein frühes Ende der Lese festzustellen.

Allgemeine Angaben über die Witterung
in % der Meldungen mit einschlägigen Angaben

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet 1)		
							November 1963	Oktober 1963	November 1962
Besondere Wetterschäden									
keine	100	92	97	97	99	100	97	96	96
schwache	-	4	3	3	1	-	3	3	3
mittlere	-	4	0	-	-	-	0	1	1
starke	-	-	0	-	-	-	0	0	0
Witterung für die Re- ben und Trauben									
schlecht	-	8	5	2	3	-	3	7	3
mittel	25	60	64	43	42	100	53	59	36
gut	75	32	31	55	55	-	44	34	61
Niederschläge									
zu gering	-	-	4	1	5	-	3	4	56
ausreichend	100	89	90	96	93	100	93	89	44
zu hoch	-	11	6	3	2	-	4	7	0
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	4	6	4	4	-	5	12	5
normal	-	71	70	53	55	100	61	60	46
günstig	100	25	24	43	41	-	34	28	49
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	25	19	12	10	-	15	29	5
genügend	100	68	75	76	80	100	76	63	67
reichlich	-	7	6	12	10	-	9	8	28

1) Weinbautreibende Länder.

Der Hektarertrag von Weinmost insgesamt hat sich gegenüber der letzten Vor-schätzung von Mitte Oktober um 10 % erhöht und beträgt jetzt 88,3 hl. Er bleibt damit wesentlich (um 28 hl) hinter 1960 mit 115,8 hl zurück, liegt aber seinerseits höher als in allen übrigen Jahren, von denen 1958 mit 81,1 hl das nächstbeste Ergebnis hat. Einen besonders hohen Hektarertrag erreichte Rheinland-Pfalz mit 92,0 hl, der aber vom Saarland mit 116,5 hl noch übertrof-fen wird. Die übrigen Länder bleiben unter dem Bundesdurchschnitt, so Hessen mit 73,5 hl und Baden-Württemberg mit 85,4 hl. Eine größere Zahl von Weinbaugebie-ten hat Hektarerträge von über 100 hl, im besonderen die Obermosel mit 124,0 hl. Für den Weißmost ergibt sich ein Bundesdurchschnitt von 89,3 hl, für den Rotmost von 86,6 hl und für den Most aus gemischten Beständen von 73,7 hl.

Die Hektarerträge der einzelnen Rebsorten zeigen beachtliche Unterschiede zu den beiden Vorjahren auch in den Relationen zwischen den Rebsorten. Die drei Sorten Silvaner, Müller-Thurgau und Portugieser sind im Gesamtdurchschnitt mit etwa 100 hl/ha sich fast gleich. Mit etwa zwei Drittel dieses Ertrages erscheint der Riesling. Beim Silvaner sind die Erträge etwa doppelt so groß wie in den beiden Vorjahren 1962 und 1961. Der Riesling hat im Vergleich zu den beiden anderen Hauptsorten des weißen Gewächses recht schlecht abgeschnitten. Jedoch hat er besonders im Rheingau, an der Obermosel und ver-schiedenen Teilen von Baden-Württemberg etwas bessere Erträge erbracht als der Silvaner.

In Baden-Württemberg wurden die höchsten Durchschnittserträge beim Gutedel fest-gestellt, die mit 116,5 hl den Müller-Thurgau mit 102,9 hl in den Schatten stel-len.

Aufgrund der verbesserten Hektarerträge stieg die gesamte Erntemenge auf 6,03 Mill. hl Weinmost, davon 5,07 Mill. hl Weißmost, 0,74 Mill. hl Rotmost und 0,22 Mill. hl Most aus gemischten Beständen. Die Gesamtmenge bleibt um 1,4 Mill. hl hinter der endgültigen Schätzung für 1960 zurück und übertrifft das Ernteer-gebnis von 1958 um 1,2 Mill. hl, von 1959 um 1,7 Mill. hl und von 1962 um 2,1 Mill. hl. Die letztjährige Erntemenge wird um 54 % übertroffen. Mit diesen Fest-stellungen ist das Ergebnis von 1963 als besonders reichlich gekennzeichnet.

Entwicklung der Schätzungen beim Wein-most in hl je ha (Bundesgebiet)

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.
1953	-	40,4	45,1	-	43,0	48,2	-	45,5	48,8
1954	-	52,6	52,6	-	54,0	54,0	-	58,9	58,9
1955	-	40,0	40,1	-	40,9	40,7	-	44,2	46,5
1956	-	14,7	15,6	-	16,9	17,9	-	5,8	6,2
1957	38,2	37,4	38,5	38,5	37,9	39,3	43,7	40,9	41,0
1958	63,9	75,8	81,1	64,5	76,6	81,4	68,8	82,1	88,8
1959	61,9	67,3	70,5	62,6	68,5	72,0	67,7	71,9	73,3
1960	82,0	107,4	115,8	82,3	107,5	116,0	88,2	121,4	127,1
1961	49,1	52,5	53,9	48,9	52,9	54,2	54,0	55,6	58,0
1962	57,3	59,5	58,5	57,5	60,1	58,7	61,2	62,2	63,8
1963	70,1	80,0	88,3	70,6	80,0	89,3	70,9	84,1	86,6

In der Beurteilung der Güte des Mostes traten gegenüber den Ermittlungen vom Oktober nur ganz leichte Verbesserungen ein. Das Gesamtbild erfuhr praktisch keine Veränderung. Der Anteil der sehr guten Moste ist mit 8 % nur etwa halb so groß wie im Vorjahr. Der Anteil der guten Moste kam auf 36 % gegen 46 % 1962. Die sehr guten und guten Moste zusammen machen demnach 44 % der Gesamtmenge aus gegenüber 60 % 1962. Trotzdem dürfte die Menge derartiger Moste in diesem Jahr ein wenig größer gewesen sein als im Vorjahr. Der Anteil der mittleren Moste ist mit 41 % um ein Drittel größer als 1962 mit 30 %. Die dazugehörige Mostmenge dürfte mehr als das Doppelte betragen als im letzten Jahr. 13 % der Gesamtmenge wurde als geringer Most und 2 % als sehr geringer Most bewertet, zusammen 15 % gegen 10 % im Jahr 1962.

Das mittlere Mostgewicht wurde auf 69° Oechsle beim Weißmost und 72° Oechsle beim Rotmost errechnet. Das ist für den Rotmost ein recht gutes Ergebnis, das dem von 1962 gleicht und alle weiteren Vorjahre mit Ausnahme von 1959 übertrifft. Für den Weißmost entspricht das mittlere Mostgewicht einem guten Durchschnitt. Fast genau die Hälfte der Weißmostmenge bleibt unter 70° Oechsle und nur 14 % liegen über 80°. Vom Rotmost hat die größte Menge, nämlich 42 %, ein Mostgewicht zwischen 70 und 80°. Daneben haben 21 % höhere und 37 % geringere Oechslegrade. Der mittlere Säuregehalt ist mit 10,5 Promille beim Weißmost und 9,0 Promille beim Rotmost nur unwesentlich kleiner als 1962, aber höher als 1961.

Die Angaben über die Mostausbeute bestätigen die Berichte über eine besonders gute Brühigkeit der Trauben. Besonders hoch ist die Ausbeute beim Portugieser mit 41 l je 50 kg.

Ein Verkauf von Weinmost während der Lese wurde für 17 % der Erntemenge berichtet. Die Erlöse sind dabei insgesamt mit 87,-- DM je hl um ein Viertel kleiner als vor einem Jahr, wofür die Entwicklung beim Weißmost in Rheinland-Pfalz im besonderen Maße ausschlaggebend war.

Die als Speisetrauben verkauften Mengen sind in diesem Jahr besonders klein. Aus Baden-Württemberg wurden überhaupt keine Verkäufe gemeldet und in Rheinland-Pfalz wurde trotz einer leichten Zunahme bei den weißen Trauben die vorjährige Menge nicht erreicht. Die erzielten geringeren Erlöse lassen vermuten, daß die Qualität im Jahre 1962 besser war.

Die Zusammenstellung für Weinbaulandschaften vermittelt in der bekannten Weise einen Überblick nach der für die Kennzeichnung der Weine maßgebenden Einteilung. Dabei zeigt der Vergleich mit 1962, daß die Landschaft Mosel, Saar, Ruwer in diesem Jahr eine kleinere Ernte hatte, während mehrere andere Landschaften doppelt so viel ernteten wie im Vorjahr.

Verkauf und Verkaufserlöse von Speisevrauben

Land	Weiß				Rot			
	Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM		Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM	
	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962
Rheinland-Pfalz	244	151	60	65	555	847	55	61
Baden-Württemberg	-	3 575	-	79	-	1 200	-	80
Zusammen	-	3 726	-	78	-	2 047	-	72

**Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese
in DM je hl**

Land	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
	1963	1962	1963	1962	1963	1962
Hessen	133	136	92	135	183	200
Rheinland-Pfalz	79	117	82	130	65	68
Baden-Württemberg	130	135 ²⁾	123	128	147	173
Bayern	168	194	168	194	160	180
Saarland	100	101	100	101	-	-
Bundesgebiet ¹⁾	87	121	88	130	81	78

1) Weinbautreibende Länder. - 2) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

Weinmosternte 1963 nach Weinbaulandschaften

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weinmost insgesamt 1)				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
		1963	1962		1963	1962
		ha	hl		1 000 hl	
1	Rheingau u.Mainmündung	2 590	73,6	42,1	190	110
2	Mittelrh.m.Siebengebirge/Lahn	1 276	62,7	41,2	80	52
3	Ahr	572	12,1	35,0	7	20
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 513	68,6	74,6	652	693
5	Nahe	4 515	90,9	45,1	411	200
6	Rheinhessen ²⁾	15 496	96,1	46,8	1 489	714
7	Pfalz 2)	16 348	107,0	77,0	1 749	1 230
8	Bergstraße 3)	805	83,3	40,0	67	32
9	Südbaden u.Kraichgau	7 445	96,6	75,2	719	540
10	Württemberg, Neckar u. Nebenflüsse 4)	6 833	75,0	38,5	512	264
11	Franken (Main oberh.Hanau) ⁵⁾	2 961	53,0	24,9	157	72
12	<u>Bundesgebiet</u> (Weinbautreibende Länder)	68 354	88,3	58,5	6 034	3 928

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Ohne Nahe. - 3) Hessische u. nordbadische Bergstraße. - 4) Oberes u. unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-, Pfalz-, Enz- u. Albtal, Zabergäu. - 5) Unter-, Mittel- und Oberfranken, Tauberggend, Tauber- und Maintal.

noch: Weinmosternte 1963 nach Weinbaulandschaften

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weißmost				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
		1963		1962	1963	1962
		ha	hl		1 000 hl	
1	Rheingau u. Mainmündung	2 539	73,8	42,2	187	109
2	Mittelrhein m. Siebenge- birge/Lahn	1 253	63,3	41,3	79	51
3	Ahr	185	15,8	36,5	3	7
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 513	68,6	74,6	652	693
5	Nahe	4 449	91,3	45,0	406	197
6	Rheinhessen 1)	14 111	97,3	46,2	1 374	639
7	Pfalz 1)	13 282	106,3	73,2	1 412	944
8	Bergstraße 2)	612	84,1	39,4	51	24
9	Südbaden u. Kraichgau	5 745	101,0	25,8	580	429
10	Württemberg, Neckar u. Nebenflüsse 3)	2 222	77,6	40,4	172	88
11	Franken (Main oberhalb Hanau) 4)	2 852	53,1	24,6	151	68
12	<u>Bundesgebiet</u> (Weinbautreibende Länder)	56 763	89,3	58,7	5 070*	3 254

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Rotmost				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
		1963		1962	1963	1962
		ha	hl		1 000 hl	
1	Rheingau u. Mainmündung	51	65,1	25,0	3	1
2	Mittelrhein m. Siebenge- birge / Lahn	23	25,7	32,6	1	0
3	Ahr	387	10,4	34,3	4	13
4	Mosel, Saar, Ruwer	0	27,0	-	0	0
5	Nahe	66	63,9	52,6	4	4
6	Rheinhessen 1)	1 385	83,5	53,4	116	75
7	Pfalz 1)	3 066	109,7	92,9	336	285
8	Bergstraße 2)	56	72,4	43,8	4	2
9	Südbaden u. Kraichgau	1 011	83,0	67,0	84	71
10	Württemberg, Neckar u. Nebenflüsse 3)	2 466	75,9	39,3	187	96
11	Franken (Main oberhalb Hanau) 4)	69	50,9	30,9	4	2
12	<u>Bundesgebiet</u> (Weinbautreibende Länder)	8 580	86,6	63,8	743	552

1) Ohne Nahe. - 2) Hessische u. nord-
badische Bergstraße. - 3) Oberes u. unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-,
Pfinz-, Enz- und Albtal, Zabergäu. - 4) Unter-, Mittel- u. Oberfranken, Tauber-
egend, Tauber- u. Maintal.

Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in % der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	66	34	-	-	-
Hessen	-	-	15	55	25	5	-	-
Rheinland-Pfalz	1	4	21	42	22	9	0	1
Baden-Württemberg	-	-	23	47	20	10	-	-
Bayern	1	13	49	25	4	4	2	2
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
Bundesgebiet	0	5	27	41	18	8	0	1
<u>Riesling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	25	50	25	-	-
Hessen	-	-	10	26	22	32	-	10
Rheinland-Pfalz	-	2	8	24	25	27	5	5
Baden-Württemberg	-	-	12	55	22	11	-	-
Bayern	-	10	40	35	5	-	10	-
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
Bundesgebiet	-	1	10	34	26	22	3	4
<u>Müller-Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	25	25	50	-	-	-	-
Hessen	-	52	33	5	-	10	-	-
Rheinland-Pfalz	5	28	48	15	4	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	75	18	4	3	-	-
Bayern	3	52	36	6	1	1	1	-
Saarland	-	50	-	50	-	-	-	-
Bundesgebiet	3	26	53	14	3	1	0	-
<u>Ruländer</u>								
Hessen	-	-	100	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	20	57	20	3	-	-
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
Bundesgebiet	-	-	20	58	19	3	-	-
<u>Gutedel</u>								
Baden-Württemberg	-	-	26	36	29	9	-	-

noch: Ende der Lese (einschließlich Spätleso)
in % der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Elbling</u>								
Rheinland-Pfalz	-	-	32	50	18	-	-	-
Bayern	-	21	58	21	-	-	-	-
Saarland	-	-	20	80	-	-	-	-
Bundesgebiet	-	7	39	44	10	-	-	-
<u>Sonstige Weißweinsorten</u>								
Hessen	-	-	100	-	-	-	-	-
Bayern	-	13	53	20	7	7	-	-
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
Bundesgebiet	-	10	45	35	5	5	-	-
Rotes Gewächs								
<u>Portugieser</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	25	25	-	50	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	100	-	-	-
Rheinland-Pfalz	7	41	42	8	1	1	-	-
Baden-Württemberg	-	-	65	29	1	5	-	-
Bayern	-	50	50	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	5	30	48	13	2	2	-	-
<u>Burgunder</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	33	33	-	34	-	-	-
Hessen	-	-	33	-	33	34	-	-
Rheinland-Pfalz	9	27	35	26	3	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	28	45	23	4	-	-
Bayern	50	50	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	3	8	30	38	18	3	-	-
<u>Trollinger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	14	52	26	8	-	-
<u>Schwarzriesling</u>								
Baden-Württemberg	-	-	68	32	-	-	-	-
<u>Limberger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	18	59	20	3	-	-

Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen (Rheingeb.)</u>	1963	34	33,2	1 130
2		1962	35	21,8	762
3	<u>Hessen</u>	1963	2 800	73,5	205 673
4		1962	2 830	41,6	117 611
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1963	210	71,3	14 970
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1963	2 590	73,6	190 703
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1963	47 629	92,0	4 380 007
8		1962	46 687	62,2	2 902 362
9	Rheinland-Nassau	1963	14 453	72,0	1 040 195
10	Mittelrhein	1963	1 218	64,0	78 012
11	Nahe (RB Konlenz)	1963	3 183	97,0	308 803
12	Obermosel	1963	800	124,0	99 200
13	Saar	1963	1 021	53,6	54 726
14	Ruwer	1963	331	56,6	18 735
15	Mittelmosel	1963	4 655	63,7	296 524
16	Untermosel	1963	2 649	66,6	176 423
17	Ahr	1963	572	12,1	6 948
18	Lahn	1963	24	34,3	824
19	Rheinhessen	1963	16 106	95,4	1 537 185
20	Worms u. Umgegend	1963	4 750	90,9	431 678
21	Oppenheim u. Umgegend	1963	1 535	84,2	129 037
22	Mainz u. Umgegend	1963	1 062	106,8	113 369
23	Ingelheim u. Umgegend	1963	1 466	96,9	141 996
24	Wiesbach	1963	1 696	104,8	177 663
25	Bingen u. Umgegend	1963	373	75,0	27 990
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1963	610	78,8	48 039
27	Alzey u. Umgegend	1963	4 616	101,3	467 413
28	Pfalz	1963	17 070	105,6	1 802 627
29	Mittelhaardt	1963	5 275	94,7	499 333
30	Oberhaardt	1963	8 970	114,7	1 028 820
31	Unterhaardt m. Zellertal	1963	2 103	105,0	220 720
32	Nahe (RF Pfalz)	1963	722	74,5	53 754

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

ernte 1963
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
4	5	6	7	8	
-	50	41	9	-	1
-	30	49	14	7	2
8	37	41	13	1	3
12	56	26	6	-	4
0	58	39	3	-	5
8	37	41	13	1	6
7	34	43	14	2	7
12	43	32	11	2	8
4	28	47	18	3	9
3	25	58	13	1	10
6	33	40	19	2	11
-	9	83	8	0	12
1	7	34	42	16	13
-	11	41	46	2	14
4	29	43	19	5	15
4	37	45	12	2	16
5	45	45	5	-	17
-	8	14	78	-	18
7	35	46	11	1	19
11	40	41	7	1	20
3	22	40	33	2	21
3	29	55	12	1	22
4	47	44	5	1	23
7	37	43	11	2	24
14	65	19	2	1	25
1	37	57	5	-	26
7	29	53	10	1	27
9	36	58	14	3	28
16	40	31	12	1	29
5	34	41	16	4	30
7	38	45	9	1	31
8	30	54	24	4	32

noch: Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha		hl
			1	2	3
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1963	15 311	85,4	1 307 818
34		1962	15 084	56,2	848 455
35	Nordwürttemberg	1963	6 652	73,7	490 230
36	Oberes Neckartal	1963	47	20,3	956
37	Unteres Neckartal	1963	3 824	73,6	281 439
38	Remstal	1963	720	71,4	52 065
39	Enztal	1963	534	82,9	44 261
40	Zabergäu	1963	961	71,8	68 952
41	Kocher- u. Jagsttal	1963	422	84,6	35 692
42	Tauber- u. Jagsttal	1963	135	50,9	6 865
43	Nordbaden	1963	1 835	67,7	160 907
44	Tauber- u. Maintal	1963	303	57,2	17 332
45	Neckar- u. Jagsttal	1963	57	73,2	4 170
46	Bergstraße	1963	595	87,5	52 088
47	Kraichgau	1963	698	95,1	66 368
48	Pfinz-, Enz- u. Albatal	1963	182	115,0	20 929
49	Südbaden	1963	6 740	96,8	652 684
50	Seegegend	1963	149	73,6	10 971
51	Oberes Rheintal	1963	27	62,3	1 682
52	Markgräflerland	1963	1 466	112,6	165 076
53	Kaiserstuhl	1963	2 167	97,9	212 232
54	Breisgau	1963	1 565	93,8	146 801
55	Ortenau u. Bühler- u. Jagsttal	1963	1 366	84,9	115 922
56	Südwestfalen-Lippe-Hohenzollern	1963	84	47,6	3 997
57	Oberes Neckartal	1963	69	46,4	3 200
58	Enztal	1963	8	66,0	528
59	Bodenseegebiet	1963	7	38,4	269
60	<u>Bayern</u>	1963	2 523	52,7	132 878
61		1962	2 444	21,7	53 029
62	RB Unterfranken	1963	2 253	52,4	118 004
63	RB Mittelfranken	1963	266	55,6	14 790
64	Übrige Gebiete	1963	4	21,0	84
65	<u>Saarland</u>	1963	57	116,5	6 641
66		1962	57	100,0	5 700
67	<u>Bundesgebiet</u> ²⁾	1963	68 354	88,3	6 034 147
68	Oktober	1963	68 354	80,0	5 467 738
69	November	1962	67 137	58,5	3 927 919
70		JD 1957/62	62 757	69,9	4 383 714

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.-2) Weinbautreibende Länder.

ernte 1963
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
4	5	6	7	8	
14	44	33	9	0	33
19	55	23	3	0	34
13	54	29	4	-	35
-	19	66	15	-	36
16	55	26	3	-	37
2	46	44	8	-	38
1	73	23	3	-	39
17	49	26	8	-	40
3	46	46	5	-	41
44	49	7	-	-	42
16	51	28	5	-	43
16	61	22	1	-	44
10	62	28	-	-	45
28	34	29	9	-	46
11	63	22	4	-	47
3	45	45	7	-	48
14	35	37	13	1	49
3	25	46	16	10	50
-	66	34	-	-	51
7	39	40	13	1	52
26	34	26	12	2	53
6	29	50	14	1	54
12	39	35	14	0	55
6	36	29	13	16	56
4	26	34	16	20	57
-	89	11	-	-	58
42	48	10	-	-	59
12	44	36	8	0	60
15	50	27	7	1	61
12	44	36	8	0	62
8	49	36	7	-	63
-	-	11	-	89	64
2	56	15	27	-	65
4	81	15	-	-	66
8	36	41	13	2	67
6	35	43	13	3	68
14	46	30	9	1	69
19	38	34	8	1	70

noch: Weinmost

(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1963	30	33,9	1 017
2		1962	31	21,8	675
3	<u>Hessen</u>	1963	2 745	73,6	202 148
4		1962	2 774	41,9	116 227
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1963	205	71,7	14 770
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1963	2 539	73,8	187 378
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1963	42 706	91,8	3 919 293
8		1962	41 729	60,5	2 525 746
9	Rheinland-Nassau	1963	14 025	73,7	1 033 629
10	Mittelrhein	1963	1 201	64,6	77 585
11	Nahe (RB Koblenz)	1963	3 159	97,1	306 739
12	Obermosel	1963	800	124,0	99 200
13	Saar	1963	1 021	53,6	54 726
14	Ruwer	1963	331	56,6	18 735
15	Mittelmosel	1963	4 655	63,7	296 524
16	Untermosel	1963	2 649	66,6	176 423
17	Ahr	1963	185	15,8	2 923
18	Lahn	1963	22	35,2	774
19	Rheinhessen	1963	14 681	96,7	1 419 540
20	Worms u. Umgegend	1963	4 351	90,3	392 895
21	Oppenheim u. Umgegend	1963	1 525	84,3	128 558
22	Mainz und Umgegend	1963	958	107,7	103 177
23	Ingelheim und Umgegend	1963	1 061	103,6	109 920
24	Wiesbach	1963	1 515	105,8	160 287
25	Bingen und Umgegend	1963	350	76,1	26 635
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1963	570	80,7	45 999
27	Alzey und Umgegend	1963	4 351	103,9	452 069
28	Pfalz	1963	14 002	104,7	1 466 124
29	Mittelhaardt	1963	3 726	91,9	342 419
30	Oberhaardt	1963	8 148	114,1	929 687
31	Unterhaardt mit Zellertal	1963	1 408	99,7	140 378
32	Nahe (RB Pfalz)	1963	720	74,5	53 640

ernte 1963
Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
12	13	14	15	16	
-	49	41	10	-	1
-	30	47	16	7	2
8	37	41	13	1	3
12	56	26	6	-	4
0	58	39	3	-	5
8	37	41	13	1	6
7	33	43	14	3	7
13	43	31	11	2	8
4	28	47	18	3	9
3	25	58	13	1	10
6	33	40	19	2	11
-	9	83	8	0	12
1	7	34	42	16	13
-	11	41	46	2	14
4	29	43	19	5	15
4	37	45	12	2	16
-	20	68	12	-	17
-	2	15	83	-	18
7	34	47	11	1	19
12	39	41	7	1	20
3	22	40	33	2	21
3	28	56	12	1	22
4	46	45	5	-	23
5	38	44	11	2	24
15	64	19	2	-	25
1	36	58	5	-	26
7	29	53	10	1	27
8	37	37	15	3	28
17	43	25	13	2	29
5	34	41	16	4	30
9	38	43	9	1	31
8	30	34	24	4	32

noch: Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr	noch: Weißmost				
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge		
						ha	hl
						9	10
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1963	8 741	92,6	809 157		
34		1962	8 469	65,5	554 979		
35	Nordwürttemberg	1963	2 200	75,6	166 338		
36	Oberes Neckartal	1963	45	19,9	896		
37	Unteres Neckartal	1963	1 184	78,0	92 354		
38	Remstal	1963	312	67,0	20 904		
39	Enztal	1963	77	100,8	7 762		
40	Zabergäu	1963	229	77,6	17 765		
41	Kocher- u. Jagsttal	1963	253	85,7	21 687		
42	Tauberregion	1963	100	49,7	4 970		
43	Nordbaden	1963	1 215	86,5	105 065		
44	Tauber- u. Maintal	1963	268	56,2	15 062		
45	Neckar- u. Jagsttal	1963	25	68,6	1 716		
46	Bergstraße	1963	406	90,4	36 693		
47	Kraichgau	1963	447	98,2	43 897		
48	Pfinz-, Enz- u. Albthal	1963	69	111,6	7 697		
49	Südbaden	1963	5 293	101,3	535 993		
50	Seegegend	1963	79	78,2	6 175		
51	Oberes Rheintal	1963	11	40,0	440		
52	Markgräflerland	1963	1 414	113,7	160 788		
53	Kaiserstuhl	1963	1 635	101,8	166 474		
54	Breisgau	1963	1 193	96,1	114 647		
55	Ortenau u. Bühlerregion	1963	961	91,0	87 469		
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1963	33	53,4	1 761		
57	Oberes Neckartal	1963	28	54,9	1 536		
58	Enztal	1963	0	.	.		
59	Bodenseegebiet	1963	5	45,0	225		
60	<u>Bayern</u>	1963	2 484	52,9	131 330		
61		1962	2 400	21,7	52 197		
62	RB Unterfranken	1963	2 214	52,6	116 456		
63	RB Mittelfranken	1963	266	55,6	14 790		
64	Übrige Gebiete	1963	4	21,0	84		
65	<u>Saarland</u>	1963	57	116,4	6 614		
66		1962	57	100,0	5 682		
67	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	1963	56 763	89,3	5 069 559		
68	Oktober	1963	56 763	80,0	4 543 804		
69	November	1962	55 466	58,7	3 253 506		
70		JD 1957/62	51 171	70,4	3 603 871		

1) Weinbautreibende Länder

ernte 1963
Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
12	13	14	15	16	
13	40	35	11	1	33
21	53	23	3	0	34
13	48	34	5	-	35
-	19	66	15	-	36
15	53	29	3	-	37
1	39	53	7	-	38
1	64	33	2	-	39
20	47	24	9	-	40
2	40	52	6	-	41
59	31	10	-	-	42
15	53	26	6	-	43
18	64	17	1	-	44
6	67	27	-	-	45
24	33	33	10	-	46
9	67	20	4	-	47
8	48	37	7	-	48
13	34	38	14	1	49
4	25	45	16	10	50
-	-	100	-	-	51
7	39	40	13	1	52
25	35	25	12	3	53
5	25	53	16	1	54
11	38	37	14	0	55
11	31	42	7	9	56
5	29	47	9	10	57
.	58
50	40	10	-	-	59
12	44	36	8	0	60
14	50	28	7	1	61
12	44	36	8	0	62
8	49	36	7	-	63
-	-	11	-	89	64
3	13	29	55	-	65
8	62	30	-	-	66
8	35	41	13	3	67
5	34	44	14	3	68
14	45	40	9	2	69
20	38	33	8	1	70

noch: Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1963	4	28,3	113
2		1962	4	21,8	87
3	<u>Hessen</u>	1963	55	64,1	3 525
4		1962	56	24,7	1 384
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1963	4	50,0	200
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1963	51	65,2	3 325
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1963	4 923	93,6	460 714
8		1962	4 958	76,4	378 616
9	Rheinland-Nassau	1963	430	15,3	6 566
10	Mittelrhein	1963	17	25,1	427
11	Nahe (RB Koblenz)	1963	24	86,0	2 064
12	Obermosel	1963	-	-	-
13	Saar	1963	-	-	-
14	Ruwer	1963	-	-	-
15	Mittelmosel	1963	-	-	-
16	Untermosel	1963	-	-	-
17	Ahr	1963	387	10,4	4 025
18	Lahn	1963	2	25,0	50
19	Rheinhessen	1963	1 425	82,6	117 645
20	Worms	1963	399	97,2	38 783
21	Oppenheim und Umgegend	1963	8	59,9	479
22	Mainz und Umgegend	1963	104	98,0	10 192
23	Ingelheim und Umgegend	1963	405	79,2	32 076
24	Wiesbach	1963	181	96,0	17 376
25	Bingen u. Umgegend	1963	23	58,9	1 355
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1963	40	51,0	2 040
27	Alzey u. Umgegend	1963	265	57,9	15 344
28	Pfalz	1963	3 068	109,7	336 503
29	Mittelhaardt	1963	1 549	101,3	156 914
30	Oberhaardt	1963	822	120,6	99 133
31	Unterhaardt mit Zellertal	1963	695	115,6	80 342
32	Nahe (RB Pfalz)	1963	2	56,8	114

ernte 1963
Ergebnisse)

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
20	21	22	23	24	
-	60	40	-	-	1
-	29	65	6	-	2
10	40	41	9	-	3
20	45	22	13	-	4
-	60	40	-	-	5
11	39	41	9	-	6
9	37	44	9	1	7
10	44	41	5	0	8
4	46	42	8	0	9
0	33	46	17	4	10
-	28	56	16	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
7	56	35	2	-	17
-	100	-	-	-	18
7	44	42	7	0	19
5	52	38	5	0	20
-	-	100	-	-	21
-	44	48	8	-	22
3	50	42	5	-	23
28	30	32	8	2	24
3	73	24	-	-	25
3	51	46	-	-	26
2	27	56	15	0	27
10	35	45	9	1	28
13	33	44	9	1	29
10	35	44	11	0	30
5	38	48	8	1	31
-	96	4	-	-	32

noch: Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr	noch: Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1963	3 559	77,8	276 882
34		1962	3 597	47,6	171 210
35	Nordwürttemberg	1963	2 406	75,2	180 879
36	Oberes Neckartal	1963	0	.	.
37	Unteres Neckartal	1963	1 554	73,6	114 304
38	Remstal	1963	322	71,9	23 152
39	Enztal	1963	178	95,1	16 935
40	Zabergau	1963	308	74,1	22 811
41	Kocher- und Jagsttal	1963	42	84,7	3 557
42	Tauberregion	1963	2	60,0	120
43	Nordbaden	1963	225	85,7	19 277
44	Tauber- und Maintal	1963	28	65,8	1 842
45	Neckar- und Jagsttal	1963	3	74,7	224
46	Bergstraße	1963	52	74,1	3 855
47	Kraichgau	1963	92	84,7	7 790
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1963	50	111,3	5 566
49	Südbaden	1963	918	82,9	76 090
50	Seegegend	1963	35	66,3	2 320
51	Oberes Rheintal	1963	15	79,3	1 190
52	Markgräflerland	1963	39	81,1	3 161
53	Kaiserstuhl	1963	371	95,2	35 334
54	Breisgau	1963	165	81,0	13 361
55	Ortenau und Bühlergegend	1963	293	70,7	20 724
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1963	10	63,6	636
57	Oberes Neckartal	1963	3	45,1	135
58	Enztal	1963	6	78,0	468
59	Bodenseegebiet	1963	1	33,0	33
60	<u>Bayern</u>	1963	39	39,7	1 548
61		1962	38	21,9	832
62	RB Unterfranken	1963	39	39,7	1 548
63	RB Mittelfranken	1963	-	-	-
64	Übrige Gebiete	1963	-	-	-
65	<u>Saarland</u>	1963	0	150,0	27
66		1962	0	100,0	18
67	<u>Bundesgebiet¹⁾</u>	1963	8 580	86,6	742 809
68	Oktober	1963	8 580	84,1	721 601
69	November	1962	8 653	63,8	552 147
70		JD1957/62	7 892	75,6	596 753

1) Weinbautreibende Länder

ernte 1963
Ergebnisse)

noch Rotmost					Most aus gemischten Beständen			Lfd. Nr.
Güte des Mostes					Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering				
%					ha	hl		
20	21	22	23	24	25	26	27	
16	51	27	6	0	3 011	73,7	221 779	33
16	58	24	2	0	3 018	40,5	122 266	34
13	56	26	5	-	2 046	69,9	143 013	35
.	2	30,0	60	36
17	55	24	4	-	1 086	68,9	74 781	37
3	52	37	8	-	95	84,3	8 009	38
1	76	19	4	-	279	70,1	19 564	39
16	48	28	8	-	424	66,9	28 376	40
3	57	37	3	-	127	82,3	10 448	41
-	100	-	-	-	33	53,8	1 775	42
13	48	36	3	-	395	92,6	36 565	43
3	40	57	-	-	7	61,1	428	44
14	55	31	-	-	29	76,9	2 230	45
27	48	19	6	-	137	84,2	11 540	46
18	53	27	2	-	159	92,5	14 701	47
-	43	53	4	-	63	121,7	7 666	48
24	37	29	9	1	529	76,8	40 601	49
2	24	53	13	8	35	70,7	2 476	50
-	91	9	-	-	1	52,0	52	51
4	46	40	5	5	13	86,7	1 127	52
35	27	28	9	1	161	64,7	10 424	53
13	49	30	8	-	207	90,8	18 793	54
18	45	26	11	-	112	69,0	7 729	55
-	74	9	7	10	41	39,0	1 600	56
-	14	7	33	46	38	40,2	1 529	57
-	89	11	-	-	2	30,0	60	58
-	100	-	-	-	1	11,0	11	59
14	61	22	3	-	-	-	-	60
36	35	14	15	-	-	-	-	61
14	61	22	3	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	100	-	-	-	-	-	-	65
-	100	-	-	-	-	-	-	66
12	42	37	8	1	3 011	73,7	221 779	67
9	41	42	8	-	3 011	67,2	202 333	68
12	48	36	4	-	3 018	40,5	122 266	69
17	39	35	8	1	3 694	49,6	183 090	70

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost						
			Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt ‰
			Anteil des Mostertrages						
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
					%				
1	<u>Nordrhein-Westfalen (Rheingeb.)</u>	1963	-	47	32	19	2	73	11,3
2		1962	21	39	26	14	-	67	14,1
3	<u>Hessen</u>	1963	2	27	47	21	3	75	11,1
4		1962	-	11	43	40	6	79	11,6
5	RB Darmstadt	1963	-	26	40	32	2	77	11,6
6	RB Wiesbaden	1963	2	27	48	20	3	75	11,1
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1963	16	42	30	10	2	68	10,6
8		1962	15	21	33	26	5	73	11,3
9	Rheinland-Nassau	1963	29	42	22	6	1	65	12,9
10	Mittelrhein	1963	14	55	24	7	0	66	12,5
11	Nahe (Reg.Bez. Koblenz)	1963	6	47	31	12	4	69	11,4
12	Obermosel	1963	95	5	-	-	-	52	14,9
13	Saar	1963	49	39	11	1	-	63	14,5
14	Ruwer	1963	49	38	12	1	-	62	14,1
15	Mittelmosel	1963	30	45	20	5	0	65	13,4
16	Untermosel	1963	28	46	23	3	0	65	13,4
17	Ahr	1963	6	56	35	3	-	67	11,0
18	Lahn	1963	-	83	15	2	-	70	12,0
19	Rheinhessen	1963	7	41	39	11	2	70	9,7
20	Worms und Umgegend	1963	6	35	39	16	4	72	9,5
21	Oppenheim und Umgegend	1963	5	34	46	12	3	69	8,8
22	Mainz und Umgegend	1963	11	32	38	15	4	71	9,1
23	Ingelheim und Umgegend	1963	5	38	52	5	-	71	9,5
24	Wiesbach	1963	7	50	38	5	-	68	10,2
25	Bingen und Umgegend	1963	-	12	43	32	13	78	8,8
26	Nahe und Umgegend	1963	-	42	49	9	-	72	9,7
27	Alzey und Umgegend	1963	8	51	33	7	1	68	10,1
28	Pfalz	1963	16	42	27	12	3	69	10,0
29	Mittelhaardt	1963	1	16	39	35	9	78	8,9
30	Oberhaardt	1963	23	53	20	3	1	65	10,5
31	Unterhaardt	1963	3	30	41	20	6	73	8,6
32	Nahe (RB Pfalz.)	1963	27	42	25	5	1	65	10,7

(Ergebnisse)

noch: Weißmost		Rotmost									Lfd. Nr.
Säuregehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt			
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages		
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	
%							Grad	‰	%		
18	82	-	27	42	31	-	74	11,2	24	76	1
20	80	-	86	-	14	-	68	12,6	15	85	2
.	.	-	2	38	36	24	78	10,8	.	.	3
.	.	-	-	27	34	39	83	11,3	-	-	4
.	.	-	-	100	-	-	70	9,0	.	.	5
.	.	-	2	34	38	26	79	10,9	.	.	6
49	51	8	43	37	11	1	69	8,7	77	23	7
41	59	8	47	33	11	1	69	9,1	79	21	8
14	86	2	43	32	22	1	68	11,5	11	89	9
12	88	21	45	30	4	-	66	11,7	2	98	10
32	68	2	32	48	18	-	73	9,8	46	54	11
1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
4	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
2	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
10	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
11	89	-	49	25	25	1	66	12,3	8	92	17
-	100	-	-	-	100	-	90	10,0	-	100	18
62	38	7	47	36	10	0	70	9,0	76	24	19
65	35	12	51	28	8	1	69	9,3	74	26	20
82	18	-	50	50	-	-	70	8,5	85	15	21
72	28	4	54	39	3	-	70	9,1	82	18	22
83	17	4	43	42	11	0	70	8,9	80	20	23
41	59	5	37	39	18	1	73	8,6	83	17	24
79	21	-	12	65	20	3	75	7,9	100	-	25
51	49	-	46	41	13	-	73	9,5	56	44	26
53	47	8	53	35	4	-	67	9,0	83	17	27
61	39	8	42	38	11	1	69	8,5	82	18	28
89	11	5	34	42	17	2	71	8,5	83	17	29
50	50	12	55	31	2	-	66	8,6	81	19	30
75	25	8	40	38	12	2	69	8,5	80	20	31
33	67	-	4	83	13	-	78	9,5	68	32	32

Mostgewicht und Säuregehalt
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost						
			Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
			Anteil des Mostertrages						
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
%					Grad	%			
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1963	1	21	57	19	2	74	9,8
34		1962	-	5	54	37	4	79	8,7
35	Nordwürttemberg	1963	-	23	64	12	1	73	10,4
36	Oberes Neckartal	1963	-	83	17	-	-	65	11,5
37	Unteres Neckartal	1963	-	20	63	17	-	74	10,7
38	Remstal	1963	-	60	40	-	-	68	11,4
39	Enztal	1963	-	11	72	17	-	73	9,3
40	Zabergäu	1963	-	9	74	13	4	75	9,6
41	Kocher- u. Jagsttal	1963	-	22	78	-	-	72	9,4
42	Tauber- und Jagsttal	1963	-	16	67	17	-	75	10,0
43	Nordbaden	1963	1	8	51	34	6	77	9,6
44	Tauber- und Maintal	1963	-	4	26	65	5	80	8,2
45	Neckar- u. Jagsttal	1963	-	-	50	50	-	76	7,8
46	Bergstraße	1963	5	5	58	27	5	76	10,3
47	Kraichgau	1963	-	9	61	21	9	77	9,5
48	Pfinz-, Enz- u. Alb- u. Albtal	1963	-	25	58	9	8	74	9,4
49	Südbaden	1963	1	25	53	19	2	74	9,7
50	See- und Oberrhein- gegend	1963	-	67	33	-	-	67	12,6
51	Oberes Rheintal	1963	-	50	50	-	-	65	-
52	Markgräflerland	1963	2	33	63	2	-	69	9,5
53	Kaiserstuhl	1963	-	-	47	47	6	79	9,7
54	Breisgau	1963	-	22	50	25	3	73	9,4
55	Ortenau u. Bühler- gegend	1963	-	23	50	25	2	74	10,4
56	Südwestfalen-Lippe	1963	9	27	55	9	-	69	11,1
57	Oberes Neckartal	1963	12	38	50	-	-	67	11,1
58	Enztal	1963	-	-	100	-	-	78	6,0
59	Bodenseegebiet	1963	-	-	50	50	-	86	11,0
60	<u>Bayern</u>	1963	0	18	54	22	6	76	9,0
61		1962	1	9	46	38	6	79	9,3
62	RF Unterfranken	1963	0	19	51	24	6	76	8,8
63	RF Mittelfranken	1963	0	12	78	8	2	75	10,4
64	Übrige Gebiete	1963	89	-	4	7	-	53	9,3
65	<u>Saarland</u>	1963	79	17	4	-	-	55	15,0
66		1962	-	-	-	-	-	-	-
67	<u>Bundesgebiet (Weinbautreibende Länder)</u>	1963	13	37	36	13	2	69	10,5
68		1962	11	18	37	29	5	74	10,8
69		1961	5	24	47	21	3	73	9,3
70		1960	14	47	30	8	1	68	9,8
71		1959 ¹⁾	0	2	7	31	60	92	7,4
72		1958 ¹⁾	13	41	35	9	2	69	11,2
73		1957 ¹⁾	11	47	32	9	1	69	13,0
74		1956 ¹⁾	41	44	14	1	-	62	13,6
75		1955 ¹⁾	13	48	33	6	0	69	12,2
76		1954 ¹⁾	32	45	18	4	1	.	12,7

1) Ohne Saarland. - 2) Ohne Hessen.

der Weinmosternte 1963
Ergebnisse)

noch: Weißmost		Rotmost									Lfd. Nr.
Säuregehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt			
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil d. Mostertrages		
unter 10 °/∞	10 °/∞ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10 %	10 % und mehr	
%							Grad	°/∞	%		
89	11	1	14	50	29	6	75	9,7	90	10	33
78	22	-	14	43	31	12	77	9,6	63	37	34
81	19	1	20	68	11	-	72	9,6	89	11	35
90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
76	24	-	19	70	11	-	71	9,5	86	14	37
94	6	-	50	50	-	-	70	11,8	94	6	38
94	6	-	16	74	10	-	74	9,7	100	-	39
81	19	-	8	72	20	-	75	8,2	93	7	40
82	18	-	17	74	9	-	73	9,3	82	18	41
92	8	20	60	20	-	-	64	9,7	100	-	42
79	21	1	15	41	36	7	77	9,9	77	23	43
90	10	-	-	15	77	8	82	8,6	87	13	44
50	50	-	-	86	14	-	75	9,0	64	36	45
77	23	6	29	35	24	6	73	9,1	100	0	46
69	31	-	12	44	36	8	78	10,4	50	50	47
97	3	-	27	45	18	10	76	10,2	97	3	48
95	5	-	4	25	56	15	82	10,0	98	2	49
100	-	-	-	75	25	-	76	13,7	100	-	50
95	5	-	-	67	33	-	74	14,0	100	-	51
100	-	-	18	23	53	6	78	9,9	100	-	52
98	2	-	-	13	80	7	83	10,0	99	1	53
97	3	-	-	26	48	26	84	9,3	98	2	54
72	28	-	2	22	59	17	82	10,0	95	5	55
74	26	9	-	64	27	-	76	11,0	61	39	56
71	29	15	-	71	14	-	72	10,7	53	47	57
74	26	-	-	50	50	-	79	11,0	75	25	58
100	-	-	-	50	50	-	83	14,0	100	-	59
55	45	-	4	41	48	7	82	8,3	76	24	60
58	42	-	14	16	43	27	83	9,2	69	31	61
59	41	-	4	41	48	7	82	8,3	76	24	62
37	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	100	-	-	100	-	-	77	6,4	100	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
56 ²⁾	44 ²⁾	5	32	42	18	3	72	9,0	82 ²⁾	18 ²⁾	67
48 ²⁾	52 ²⁾	5	37	36	17	5	72	9,5	74 ²⁾	26 ²⁾	68
64 ²⁾	32 ²⁾	6	41	39	11	3	70	7,8	93 ²⁾	7 ²⁾	69
.	.	16	49	25	9	1	66	9,3	.	.	70
.	.	-	5	24	45	26	85	6,6	.	.	71
.	.	13	48	26	17	2	68	9,7	.	.	72
.	.	10	54	30	6	0	68	12,3	.	.	73
.	.	9	59	28	4	0	66	11,2	.	.	74
.	.	18	51	25	5	1	65	11,3	.	.	75
.	.	19	57	20	4	0	.	10,3	.	.	76

Mosterträge wichtiger Rebsorten 1963

hl je ha

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller- Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1963	38,0	33,5	33,3	31,7	18,0
	1962	18,0	21,7	23,6	25,0	12,0
	1961	19,8	19,0	18,9	20,3	25,0
<u>Hessen</u>	1963	69,4	73,7	77,8	88,3	59,7
	1962	31,6	44,0	42,2	36,3	23,2
	1961	27,3	48,8	41,3	14,7	19,1
RB Darmstadt	1963	74,0	70,3	68,8	50,0	-
RB Wiesbaden	1963	68,4	73,9	78,4	96,0	59,7
<u>Rheinland-Pfalz</u>	1963	103,0	65,0	106,0	97,0	42,0
	1962	51,6	61,7	74,7	79,0	34,0
	1961	53,0	61,0	67,0	74,0	27,0
Rheinland-Nassau	1963	107,0	62,0	91,0	13,0	15,0
Mittelrhein	1963	73,0	64,0	66,0	21,0	28,0
Nahe (RB Koblenz)	1963	109,0	77,0	100,0	86,0	-
Obermosel	1963	58,0	70,0	113,0	-	-
Saar	1963	55,0	53,0	62,0	-	-
Ruwer	1963	57,0	56,0	89,0	-	-
Mittelmosel	1963	-	62,0	110,0	-	-
Untermosel	1963	62,0	61,0	99,0	-	-
Ahr	1963	-	51,0	16,0	6,0	14,0
Lahn	1963	-	40,0	25,0	-	25,0
Rheinhessen	1963	97,0	74,0	104,0	83,0	80,0
Worms und Umgegend	1963	88,0	71,0	103,0	97,0	105,0
Oppenheim u. Umgegend	1963	86,0	78,0	84,0	60,0	58,0
Mainz u. Umgegend	1963	107,0	74,0	122,0	98,0	-
Ingelheim u. Umgegend	1963	109,0	66,0	103,0	79,0	81,0
Wiesbach	1963	108,0	90,0	101,0	96,0	90,0
Bingen u. Umgegend	1963	80,0	63,0	64,0	59,0	56,0
Nahe (RB Rheinhessen)	1963	80,0	68,0	86,0	51,0	48,0
Alzey u. Umgegend	1963	103,0	81,0	108,0	58,0	55,0
Pfalz	1963	109,0	75,0	116,0	110,0	79,0
Mittelhaardt	1963	105,0	65,0	94,0	102,0	62,0
Oberhaardt	1963	115,0	92,0	121,0	121,0	104,0
Unterhaardt mit						
Zellertal	1963	103,0	72,0	111,0	116,0	81,0
Nahe (RB Pfalz)	1963	77,0	68,0	73,0	65,0	58,0
<u>Baden-Württemberg</u>	1963	81,6	77,8	102,9	83,0	80,6
	1962	42,9	45,2	76,8	41,4	62,7
	1961	38,6	42,5	55,9	50,4	34,6
Nordwürttemberg	1963	74,6	74,1	79,5	81,4	46,5
Oberes Neckartal	1963	19,3	-	-	50,0	-
Unteres Neckartal	1963	75,8	74,1	80,8	75,3	46,5
Remstal	1963	74,8	66,2	69,7	72,2	-
Enztal	1963	81,0	84,8	150,6	103,1	-
Zabergäu	1963	76,4	75,6	78,6	79,0	-
Kocher- u. Jagsttal	1963	87,1	78,4	76,5	62,2	-
Tauber- u. Jagsttal	1963	49,4	72,9	64,6	60,0	-
Nordbaden	1963	73,6	84,4	93,5	99,1	85,3
Tauber- u. Maintal	1963	54,4	50,0	52,8	39,7	-
Neckar- u. Jagsttal	1963	72,3	87,0	75,2	38,0	80,0

noch: Mosterträge wichtiger Rebsorten 1963

hl je ha

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller- Thurgau	Portugieser	Burgunder
noch:						
<u>Baden-Württemberg</u>						
Bergstraße	1963	88,5	69,5	97,5	77,5	76,4
Kraichgau	1963	82,6	86,1	113,4	102,1	90,5
Pfinz-, Enz- u. Albtal	1963	77,9	91,6	121,3	130,7	80,0
Südbaden	1963	116,8	89,4	112,6	.	82,9
Seegegend	1963	.	-	84,1	-	61,6
Oberes Rheintal	1963	-	-	40,0	-	80,0
Markgräflerland	1963	108,2	.	104,7	.	86,3
Kaiserstuhl	1963	119,6	140,0	126,9	.	95,5
Breisgau	1963	95,2	.	101,9	.	78,6
Ortenau- u. Bühler- gegend	1963	114,0	88,4	102,0	.	73,1
Südwürttemberg-Hohen- zollern	1963	47,8	45,0	52,8	43,3	46,2
Oberes Neckartal	1963	48,7	45,0	60,8	43,3	50,0
Enztal	1963	10,0	-	30,0	-	.
Bodenseegebiet	1963	-	-	37,0	-	40,0
<u>Bayern</u>	1963	53,0	45,2	54,2	47,1	34,0
	1962	20,4	21,6	25,3	22,6	20,9
	1961	15,8	24,3	20,2	23,0	26,6
RB Unterfranken	1963	52,7	45,2	54,1	47,1	34,0
RB Mittelfranken	1963	55,2	-	57,5	-	-
Übrige Gebiete	1963	-	-	21,0	-	-
<u>Saarland</u>	1963	.	.	152,5	.	150,0
	1962	.	.	99,7	-	100,0
	1961	72,5	71,0	69,3	-	-
<u>Bundesgebiet</u>	1963	98,9	66,1	100,6	96,7	44,3
(Weinbautreibende	1962	50,0	58,9	68,9	78,7	32,0
Länder)	1961	49,2	56,9	60,5	70,4	32,1
	1960	121,2	99,4	130,5	148,8	93,4

noch: Mosterträge wichtiger Rebsorten 1963

hl je ha

Weinbaugebiet	Jahr	Gutedel	Ruländer	Trollinger	Schwarz- riesling	Limberger
<u>Baden-Württemberg</u>	1963	116,5	87,3	77,2	80,4	80,7
	1962	66,7	55,7	41,0	31,8	30,5
	1961	46,5	38,3	39,4	32,8	13,7
Nordwürttemberg	1963	59,9	63,8	77,1	74,8	80,6
Oberes Neckartal	1963	.	-	.	.	-
Unteres Neckartal	1963	50,0	65,0	76,1	72,7	79,2
Remstal	1963	-	55,0	73,2	.	.
Enztal	1963	70,0	-	103,8	101,1	93,5
Zabergäu	1963	-	-	67,6	74,1	71,3
Kocher- u. Jagsttal	1963	64,0	.	88,9	81,2	92,3
Tauber- u. Jagsttal	1963	70,0	-	-	-	-
Nordbaden	1963	74,3	84,5	96,5	122,2	86,6
Tauber- u. Maintal	1963	75,2	.	.	-	-
Neckar- u. Jagsttal	1963	60,6	-	77,7	64,7	74,4
Bergstraße	1963	.	63,9	.	.	.
Kraichgau	1963	.	87,5	110,0	80,8	88,8
Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	1963	.	113,1	.	140,0	.
Südbaden	1963	120,5	88,6	-	100,0	-
Saargegend	1963	.	53,7	-	-	-
Oberes Rheintal	1963	-	-	-	-	-
Markgräflerland	1963	128,5	109,0	-	.	-
Kaiserstuhl	1963	.	93,9	-	-	-
Breisgau	1963	102,4	83,8	-	100,0	-
Ortenau u. Bühler- gend	1963	170,0	75,3	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	1963	49,7	60,0	.	74,2	45,0
Oberes Neckartal	1963	50,7	.	.	49,0	45,0
Enztal	1963	20,0	-	-	80,9	.
Bodenseegebiet	1963	.	60,0	.	.	-

Mostausbeute nach Rebsorten 1963
Liter Most je 50 kg Trauben

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller- Thurgau	Portu- gieser	Burgunder
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1963	33,0	31,0	34,0	35,0	25,0
	1962	30,0	31,0	32,0	35,0	30,0
<u>Hessen</u>	1963	39,0	39,0	40,0	.	43,0
	1962	36,0	35,0	37,0	40,0	34,0
RB Darmstadt	1963	39,0	40,0	40,0	.	"
RB Wiesbaden	1963	39,0	39,0	40,0	.	43,0
<u>Rheinland-Pfalz</u>	1963	39,0	37,0	39,0	41,0	36,0
	1962	37,0	35,0	38,0	39,0	35,0
Rheinland-Nassau	1963	39,0	37,0	40,0	35,0	34,0
Mittelrhein	1963	38,0	36,0	38,0	35,0	30,0
Nahe (RB Koblenz)	1963	39,0	36,0	40,0	38,0	"
Obermosel	1963	.	40,0	44,0	-	-
Saar	1963	.	36,0	38,0	-	-
Ruwer	1963	.	33,0	41,0	-	-
Mittelmosel	1963	-	38,0	43,0	-	-
Untermosel	1963	.	38,0	38,0	-	-
Ahr	1963	-	36,0	35,0	35,0	34,0
Lahn	1963	-	35,0	38,0	-	35,0
Rheinhessen	1963	40,0	36,0	40,0	41,0	38,0
Worms u. Umgegend	1963	40,0	37,0	40,0	41,0	38,0
Oppenheim u. Umgegend	1963	39,0	36,0	40,0	40,0	.
Mainz u. Umgegend	1963	40,0	35,0	40,0	40,0	-
Ingelheim u. Umgegend	1963	40,0	35,0	40,0	40,0	38,0
Wiesbaden	1963	40,0	37,0	40,0	41,0	38,0
Bingen u. Umgegend	1963	39,0	36,0	37,0	38,0	.
Nahe (RB Rheinhessen)	1963	40,0	.	41,0	41,0	.
Alzey u. Umgegend	1963	40,0	37,0	41,0	41,0	38,0
Pfalz	1963	39,0	37,0	38,0	41,0	39,0
Mittelhaardt	1963	38,0	38,0	40,0	42,0	40,0
Oberhaardt	1963	39,0	36,0	38,0	40,0	39,0
Unterhaardt m. Zellertal	1963	38,0	37,0	39,0	40,0	39,0
Nahe (RB Pfalz)	1963	39,0	36,0	38,0	39,0	36,0
<u>Baden-Württemberg</u>	1963	36,7	37,8	37,4	37,5	38,1
	1962	37,6	36,2	37,4	37,8	36,3
<u>Nordwürttemberg</u>	1963	38,4	37,5	38,5	38,5	36,3
Oberes Neckartal	1963	38,5
Unteres Neckartal	1963	37,7	36,3	36,9	38,6	36,3
Remstal	1963	39,4	38,1	38,1	38,8	.
Enztal	1963	35,8	37,0	39,5	35,4	.
Zabergäu	1963	39,6	41,0	39,4	38,6	.
Kocher- und Jagsttal	1963	38,9	37,4	38,0	38,7	.
Tauber- und Jagsttal	1963	38,8	35,0	39,1	40,9	.
<u>Nordbaden</u>	1963	36,2	34,9	37,2	36,7	37,6
Tauber- und Maintal	1963	36,8	37,5	38,1	36,5	39,8
Neckar- und Jagsttal	1963	36,3	30,0	35,5	36,0	35,0
Bergstraße	1963	37,0	35,4	37,0	37,7	37,5
Kraichgau	1963	34,3	35,6	37,6	36,9	36,5
Pfinz-, Enz- und Alb- und Albtal	1963	36,7	35,8	37,9	36,3	39,0

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Porto-riesling	Burgunder
<u>noch: Baden-Württemberg</u>						
<u>Südbaden</u>	1963	36,9	36,6	37,3	.	37,1
Seegegend	1963	31,0	34,0	35,0	.	32,5
Oberes Rheintal	1963	-	-	.	.	45,0
Markgräflerland	1963	37,7	38,8	37,9	.	38,7
Kaiserstuhl	1963	37,3	36,5	36,2	.	32,9
Breisgau	1963	37,9	37,7	38,3	.	36,3
Ortenau u. Bühlergegend	1963	37,4	35,8	38,9	.	37,4
Südwestfalen-Hohenzollern	1963	35,3	42,3	36,5	37,2	41,5
Oberes Neckartal	1963	35,3	42,3	38,0	39,4	41,5
Enztal	1963	.	-	35,0	35,0	.
Bodenseegebiet	1963	-	-	.	.	.
<u>Bayern</u>	1963	36,1	35,7	36,7	36,8	36,7
	1962	36,6	33,4	36,9	35,5	35,3
RB Unterfranken	1963	36,9	35,7	37,4	36,8	36,7
RB Mittelfranken	1963	29,7	-	32,6	-	-
Übrige Gebiete	1963	-	-	33,5	-	-
<u>Saarland</u>	1963	.	.	37,7	.	40,0
	1962	.	.	39,2	.	35,0
<u>Bundesgebiet</u>	1963	38,8	37,2	38,9	41,0	36,9
(Weinbautr. Länder)	1962	37,1	35,1	37,6	38,8	35,9

Weinbaugebiet	Jahr	Gutedel	Ruländer	Trollinger	Schwarz-riesling	Limberger
<u>Baden-Württemberg</u>	1963	36,5	36,7	37,4	36,6	35,7
	1962	37,3	36,0	39,6	36,7	36,7
	1961	37,6	35,7	40,0	37,7	35,9
<u>Nordwestfalen</u>	1963	39,4	38,6	38,8	36,7	36,7
Oberes Neckartal	1963	.	-	.	.	.
Unteres Neckartal	1963	.	38,6	39,5	37,9	37,2
Romstal	1963	.	.	40,0	.	.
Enztal	1963	.	.	39,9	35,3	35,0
Zabergäu	1963	.	.	37,8	35,4	36,0
Kocher- und Jagsttal	1963	39,8	.	40,8	38,1	38,7
Tauber- und Jagsttal	1963	38,9
<u>Nordbayer</u>	1963	37,3	36,3	36,0	36,3	37,5
Tauber- und Maintal	1963	38,0
Neckar- und Jagsttal	1963	36,5	.	36,0	32,0	33,5
Bergstraße	1963	.	38,3	.	.	.
Kraichgau	1963	.	36,5	.	37,0	37,9
Pfingst-, Enz- u. Albtal	1963	.	34,0	.	40,0	41,0
<u>Südbayer</u>	1963	39,2	35,3	.	40,0	.
Seegegend	1963	.	33,0	.	.	.
Oberes Rheintal	1963	-	-	.	.	.
Markgräflerland	1963	38,6	35,8	.	.	.
Kaiserstuhl	1963	.	33,1	.	.	.
Breisgau	1963	38,9	36,8	.	40,0	.
Ortenau und Bühlergegend	1963	40,0	37,8	.	.	.
<u>Südwestfalen-Hohenzollern</u>	1963	30,0	.	.	33,5	33,0
Oberes Neckartal	1963	30,0	.	.	37,0	33,0
Enztal	1963	30,0	-	.	30,0	.
Bodenseegebiet	1963