

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Stand der Reben

Juni 1964



Bestellnummer: B 2/III - 4/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Textliche Erläuterung zum Tabellenteil	3
Allgemeine Angaben über Witterungsverhältnisse und Entwicklung der Reben	4
Beginn der Blüte	5
Durchschnittliche Dauer der Blüte	6
Stand der Reben	7

Erschienen im Juli 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -, 50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II.4 veröffentlicht.

Die Berichterstattung über den Stand der Reben von Ende Juni bestätigte die bereits allgemein verbreiteten Nachrichten über die bis dahin guten Voraussetzungen für den neuen Jahrgang. In den allgemeinen Angaben trat dies mit Anteilen von 75 bis 95 % bei der Beurteilung als günstig oder gut auch im Vergleich mit früheren Feststellungen sehr augenfällig hervor. Dies betrifft im besonderen die Beurteilung der Witterung, des Gescheinansatzes und des Verlaufes der Blüte und auch die Durchführung der Pflegearbeiten. Als Ausnahme sind die Niederschläge hervorzuheben, die für 49 % der Berichterstatter zu gering waren. Aber für immerhin 51 % der Bezirke wurden die Niederschläge im Juni noch als ausreichend angesehen.

Die Angaben über den allgemeinen Beginn der Blüte beweisen den erheblichen Vorsprung in der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. Während 1963 alle wichtigen Rebsorten praktisch erst nach dem 10. Juni zu blühen begannen, hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr bereits in mehr als der Hälfte bis in drei Viertel der Bezirke begonnen, wobei nur der Elbling mit 32 % eine Ausnahme macht. Bis zum 20. 6. hatte nur in ganz unerheblichen Teilen der Weinbaugebiete die Blüte noch nicht allgemein begonnen gegenüber etwa der Hälfte und mehr vor einem Jahr.

Aus den Meldungen über die Dauer der Blüte ist für alle wichtigen Rebsorten eine kurze Blütendauer ersichtlich. Hierzu ist anzumerken, daß eine Dauer von etwa 8 Tagen als besonders günstig gilt. Über eine Dauer der Blüte von mehr als 10 Tagen wurde bei den einzelnen Rebsorten nur in 9 bis 17 % der Meldungen berichtet. Das sind wesentlich kleinere Anteile als im Vorjahr. Vom Burgunder abgesehen finden sich die höchsten Anteile bei einer Dauer von 8 bis 10 Tagen.

Besonders bemerkenswert ist die Note über den Stand der Reben zu Ende Juni. Sie übertrifft mit 1,8 - gleich etwas besser als gut - die bisher beste Note für den Juni seit 1950 im Jahre 1960 mit 1,9 und bedeutet eine Verbesserung um zwei Zehntelnoten gegenüber dem glatten gut (2,0) von Ende Mai 1964.

Von den einzelnen Weinbaugebieten haben viele bessere Noten als 2,0. Die besten unter ihnen betreffen das Saarland mit 1,4 und die Taubergegend mit 1,6. Als schlechteste Note erscheint 3,0. Sie bezieht sich auf Weinbaugebiete mit unbedeutenden Rebflächen.

Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben Juni 1964

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Jun	Ma	Jun
							1964		1963
in % der Meldungen mit einschläg. Angaben									
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	-	-	-	-	-	.	10
mittel	-	7	6	8	7	-	7	.	65
gut	100	93	94	92	93	100	93	.	25
Wetterschäden									
keine	75	90	86	92	87	100	89	95	65
schwache	25	10	10	5	7	-	8	4	22
mittlere	-	-	2	2	5	-	2	1	8
starke	-	-	2	1	1	-	1	0	5
Niederschläge									
zu gering	50	70	64	30	64	-	49	37	7
ausreichend	50	30	36	70	36	100	51	62	74
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	1	19
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	-	-	1	-	0	1	25
normal	-	7	15	22	23	-	18	52	60
günstig	100	93	85	78	76	100	82	47	15
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	.	37
genügend	25	23	19	33	21	-	25	.	60
reichlich	75	77	81	67	79	100	75	.	3
Verlauf der Blüte									
schlecht	-	-	-	-	-	-	-	.	12
mittel	-	4	3	8	6	-	5	.	68
gut	100	96	97	92	94	100	95	.	20
Geschehensansatz									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	.	3
mittel	-	-	12	28	12	-	18	.	35
gut	100	100	88	72	88	100	82	.	62
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	75	93	77	84	76	100	80	77	66
unvollständig	25	7	23	16	24	-	20	23	34

Allgemeiner Beginn der Blüte 1964

Rebsorte	Datum	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württemberg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								Juni	
								1964	1963
in % der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
Silvaner	bis 10. 6.	-	63	60	54	39	-	55	1
	vom 11. - 20. 6.	100	37	39	45	60	100	44	40
	" 21. - 30. 6.	-	-	1	1	1	-	1	55
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	4
Riesling	bis 10. 6.	-	57	54	64	48	-	57	1
	vom 11. - 20. 6.	100	43	45	36	52	100	43	35
	" 21. - 30. 6.	-	-	1	0	-	-	0	57
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	7
Müller-Thurgau	bis 10. 6.	50	72	71	69	57	-	68	1
	vom 11. - 20. 6.	50	28	28	30	43	100	31	51
	" 21. - 30. 6.	-	-	1	1	-	-	1	43
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	5
Elbling	bis 10. 6.	100	-	41	-	25	-	32	-
	vom 11. - 20. 6.	-	100	59	-	75	100	68	18
	" 21. - 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	61
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	21
Portugieser	bis 10. 6.	50	75	78	66	50	-	72	2
	vom 11. - 20. 6.	50	25	21	33	50	100	27	57
	" 21. - 30. 6.	-	-	1	1	-	-	1	38
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	3
Burgunder	bis 10. 6.	67	100	66	67	83	-	69	2
	vom 11. - 20. 6.	33	-	34	27	17	100	29	47
	" 21. - 30. 6.	-	-	-	6	-	-	2	45
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	6
Zahl der Meldungen mit Angaben über Beginn der Blüte									
Silvaner		3	24	377	280	92	7	783	640
Riesling		4	30	450	265	27	7	783	673
Müller-Thurgau		4	29	460	274	97	7	871	742
Elbling		1	1	39	-	20	7	68	82
Portugieser		4	4	267	155	10	7	447	377
Burgunder		3	5	47	33	6	1	95	167

Durchschnittliche Dauer der Blüte 1964

Rebsorte	Datum	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württemberg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								Juni	
								1964	1963
in % der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
Silvaner	bis 4 Tage	-	21	13	14	11	-	13	4
	5 " 7 "	50	21	36	24	28	-	30	20
	8 " 10 "	50	58	39	48	46	100	44	41
	11 " 14 "	-	-	12	13	14	-	12	21
	15 Tage und mehr	-	-	0	1	1	-	1	14
Riesling	bis 4 Tage	-	17	5	13	7	-	8	4
	5 " 7 "	33	33	32	29	26	-	30	12
	8 " 10 "	67	50	43	45	56	100	45	41
	11 " 14 "	-	-	18	11	11	-	15	25
	15 Tage und mehr	-	-	2	2	-	-	2	18
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	21	9	9	14	-	10	3
	5 bis 7 "	33	38	39	33	30	-	36	18
	8 " 10 "	67	38	39	44	45	100	41	44
	11 " 14 "	-	3	11	13	9	-	11	22
	15 Tage und mehr	-	-	2	1	2	-	2	13
Elbling	bis 4 Tage	-	-	8	-	10	-	7	3
	5 " 7 "	-	-	25	-	20	-	21	12
	8 " 10 "	100	100	49	-	55	100	57	24
	11 " 14 "	-	-	13	-	15	-	12	20
	15 Tage und mehr	-	-	5	-	-	-	3	41
Portugieser	bis 4 Tage	-	25	9	14	20	-	11	5
	5 " 7 "	33	25	45	22	10	-	35	20
	8 " 10 "	67	50	35	49	60	100	41	41
	11 " 14 "	-	-	11	14	10	-	12	20
	15 Tage und mehr	-	-	0	1	-	-	1	14
Burgunder	bis 4 Tage	-	40	4	18	17	-	12	3
	5 " 7 "	-	20	45	44	33	-	41	16
	8 " 10 "	100	40	40	29	33	100	38	42
	11 " 14 "	-	-	11	9	17	-	9	20
	15 Tage und mehr	-	-	-	-	-	-	-	19
Zahl der Meldungen mit Angaben über Dauer der Blüte									
Silvaner		2	24	377	280	89	7	779	373
Riesling		3	30	450	266	27	7	783	388
Müller-Thurgau		3	29	460	275	96	7	870	470
Elbling		1	1	39	-	20	7	68	34
Portugieser		3	4	267	154	10	7	445	265
Burgunder		2	5	47	34	6	1	95	101

Stand der Reben Ende Juni 1964

Noten: 1 = sehr gut: mehr als 3/4 Herbst, 2 = gut: mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3 = mittel: 1/2 Herbst, 4 = gering: 1/4 bis 1/2 Herbst, 5 = sehr gering: weniger als 1/4 Herbst.

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note 1964	
		Juni	Mai
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	2,3	2,6
2	<u>Hessen</u>	1,8	2,0
3	RB Darmstadt (Bergstraße)	2,0	2,2
4	Wiesbaden (Rheingau)	1,8	1,9
5	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1,8	2,0
6	Rheinland-Nassau	1,8	2,0
7	davon: Mittelrhein	1,9	2,1
8	Nahe (RB Koblenz)	1,9	2,0
9	Obermosel	2,1	2,2
10	Saar	1,8	2,1
11	Ruwer	2,0	2,1
12	Mittelmosel	1,7	1,8
13	Untermosel	1,9	2,1
14	Ahr	2,0	2,0
15	Lahn	2,2	2,7
16	Rheinhessen	1,8	2,0
17	davon: Worms und Umgegend	1,7	1,9
18	Oppenheim und Umgegend	1,8	2,0
19	Mainz und Umgegend	2,0	2,2
20	Ingelheim und Umgegend	1,8	2,4
21	Wiesbach	1,7	1,9
22	Bingen und Umgegend	1,8	2,1
23	Nahe (RB Rheinhessen)	1,8	1,9
24	Alzey und Umgegend	1,9	2,1
25	Pfalz	1,9	2,1
26	davon: Mittelhaardt	1,7	1,9
27	Oberhaardt	1,9	2,1
28	Unterhaardt mit Zellertal	2,0	2,2
29	Nahe (RB Pfalz)	2,0	2,2
30	<u>Baden-Württemberg</u>	2,0	2,2
31	<u>Nordwürttemberg</u>	1,9	2,2
32	davon: Oberes Neckartal	2,0	2,8
33	Unteres Neckartal	1,9	2,2
34	Remstal	1,9	2,3
35	Enztal	1,9	2,0
36	Zabergäu	1,8	2,1
37	Kocher- u. Jagsttal	1,9	2,3
38	Taubergergend	1,6	1,7

noch: Stand der Reben Ende Juni 1964

Noten: 1 = sehr gut: mehr als 3/4 Herbst, 2 = gut: mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3 = mittel: 1/2 Herbst, 4 = gering: 1/4 bis 1/2 Herbst, 5 = sehr gering: weniger als 1/4 Herbst.

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note 1964	
		Juni	Mai
39	Nordbaden	2,0	2,2
40	davon: Tauber- und Maintal	2,1	2,2
41	Neckar- und Jagsttal	1,9	2,0
42	Bergstraße	2,0	2,4
43	Kraichgau	2,0	2,2
44	Pfinz-, Enz- und Albthal	2,1	2,1
45	Südbaden	2,1	2,3
46	davon: Seegegend	2,0	2,1
47	Oberes Rheintal	2,0	2,0
48	Markgräflerland	2,4	2,5
49	Kaiserstuhl	1,9	2,2
50	Breisgau	2,3	2,4
51	Ortenau und Bühlergegend	2,0	2,2
52	Südwestfalen-Hohenzollern	2,2	2,6
53	davon: Oberes Neckartal	2,0	2,5
54	Enztal	3,0	3,0
55	Bodenseegebiet	2,9	2,9
56	<u>Bayern</u>	1,7	1,9
57	RB Unterfranken	1,7	1,9
58	Mittelfranken	1,9	2,0
59	Schwaben	2,0	2,0
60	Oberpfalz	2,0	2,0
61	Niederbayern	3,0	3,0
62	<u>Saarland</u>	1,4	2,0
63	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	1,8	2,0
64	1963	2,5	2,9
65	1962	2,3	2,4
66	1961	2,4	2,4
67	1960	1,9	2,1
68	1959	2,2	2,3
69	1958	2,1	2,1
70	1957	3,0	3,2
71	1956	3,8	3,9
72	1955	2,7	2,7
73	1954	2,4	2,5
74	1953	3,0	3,0
75	1952	2,4	2,3
76	1951	2,1	2,1
77	1950	2,1	2,1

1) Weinbautreibende Länder, 1959 und früher ohne Saarland.