

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung**

**September 1967**



Bestellnummer : B 2/III - 5/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhaltsübersicht

	Seite
Erläuterung zum Tabellenteil . . . . .	3
Allgemeine Angaben über die Witterung . . . . .	5
Güte der Trauben im September . . . . .	6
Vorschätzung der Weinmosternte 1967 . . . . .	8

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in  
"Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206 erschienen.

Erschienen im Oktober 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen  
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4  
veröffentlicht.

## Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung

September 1967

Die Beurteilung der einzelnen Witterungskennzeichen in der Berichtszeit vom 25. August bis 24. September 1967 zeigt eine erhebliche Verschlechterung gegenüber den beiden Vormonaten. In den Jahren seit 1963 wurden nur 1965 die einzelnen Witterungskennzeichen im September noch ungünstiger bewertet.

%-Anteile an den Meldungen über die einzelnen  
Witterungskennzeichen

Berichtsdaten	Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Witterung für die Reben und Trauben <sup>1)</sup>		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	schlecht	mittel	gut
Sept. 1963	16	78	6	10	36	54	14	58	28	5	37	58
" 1964	43	57	-	2	33	65	0	45	55	-	25	75
" 1965	-	46	54	71	24	5	83	16	1	56	41	3
" 1966	8	88	4	3	28	69	5	58	37	1	27	72
" 1967	1	58	41	37	47	16	48	47	5	20	53	27
Aug. 1967	7	90	3	1	29	70	1	49	50	0	15	85
Juli 1967	12	88	0	0	11	89	0	18	82	-	5	95

1) August und Juli 1967: Witterung für die Reben

Auch die zusammenfassende Bewertung der Witterung für Reben und Trauben war ungünstiger als in den Monaten Juli und August 1967 und im September der meisten Vorjahre. Die Regenfälle der Berichtszeit hatten eine weite Verbreitung von Fäulnis der Trauben zur Folge, die zu einer übereilten Lese, besonders bei den frühen Sorten, zwang und für die Qualität des Erntegutes nachteilig war. Die Noten für die Güte der Trauben sind für die weißen wie für die roten Sorten schlechter als 1966, jedoch erheblich besser als 1965. Sie sind den Noten für die Güte der Trauben von 1963 ähnlich.

Berichtsdaten	% -Anteile an den Meldungen mit Angaben über Entwicklung der Trauben mit einer Bewertung als			Benotung der Güte der Trauben	
	schlecht	mittel	gut	Weißer Sorten	Rote Sorten
Sept. 1963	2	33	65	2,4	2,5
" 1964	1	25	74	2,0	2,0
" 1965	36	59	5	3,0	3,1
" 1966	1	23	76	2,1	2,1
" 1967	6	48	46	2,5	2,4
Aug. 1967	0	12	88	-	-

Die Vorschätzung des Hektarertrages ist trotz der Beeinträchtigung durch Fäulnis fast genau so hoch wie die vom Jahr 1964, die mit 89,6 hl für Weinmost insgesamt bisher das größte Ergebnis der Septembervorschätzung erbrachte. Die Unterschiede in den geschätzten Erträgen sind auf Länderebene beim Rotmost größer als beim Weißmost. Die Erntemenge an Weinmost ist nach der Vorschätzung mit rd. 6,2 Mill. hl anzunehmen, wovon 5,2 Mill. hl auf Weißmost und 1,0 Mill. hl auf Rotmost und Most aus gemischten Beständen entfallen.

Vorschätzung der Weinmosternte 1967  
nach dem Stand vom Ende September in den Ländern mit Weinbau

Land	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost <sup>1)</sup>		
	Ertragf. Reb- fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertragf. Reb- fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertragf. Reb- fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
	ha	hl		ha	hl		ha	hl	
Nordrhein-Westfalen	27	69,3	1 870	25	70,0	1 750	2	60,0	120
Hessen	3 267	70,5	230 184	3 205	71,0	227 184	62	48,0	3 000
Rheinland-Pfalz	48 675	94,4	4 594 962	43 868	94,0	4 113 934	4 807	100,0	481 028
Baden-Württemberg	15 165	80,9	1 227 007	8 941	83,9	749 166	6 224	76,8	477 841
Bayern	2 257	51,7	116 788	2 227	51,9	115 669	30	37,3	1 119
Saarland	69	83,1	5 737	69	82,9	5 717	0	140,0	20
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	69 460	88,9	6 176 548	58 335	89,4	5 213 420	11 125	86,6	963 128
dagegen: 1966 end- gültiges Ergebnis	69 166	69,5	4 809 358	57 918	70,1	4 060 845	11 248	66,5	748 513

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - 2) Länder mit Weinbau.

Allgemeine Angaben über Witterung und Weinbau  
in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württembg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet <sup>1)</sup>		
							Sept. 1967	Aug. 1967	Sept. 1966
<b>Wetterschäden</b>									
keine	50	80	71	84	74	100	77	62	95
schwache	25	7	13	10	10	-	11	22	4
mittlere	-	-	10	4	12	-	7	10	1
starke	25	13	6	2	4	-	5	6	0
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	-	-	-	2	3	-	1	7	8
ausreichend	75	67	48	63	76	14	58	90	88
zu hoch	25	33	52	35	21	86	41	3	4
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig	25	23	44	33	25	-	37	1	3
normal	50	57	48	45	50	43	47	29	28
günstig	25	20	8	22	25	57	16	70	69
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering	25	33	56	44	35	57	48	1	5
genügend	50	60	44	49	55	43	47	49	58
reichlich	25	7	-	7	10	-	5	50	37
<b>Witterung für die Reben und Trauben</b>									
schlecht	-	20	26	17	11	-	20	0	1
mittel	50	40	56	50	55	100	53	15	27
gut	50	40	18	33	34	-	27	85	72
<b>Entwicklung der Trauben</b>									
schlecht	-	3	8	5	1	-	6	0	1
mittel	25	20	51	47	48	100	48	12	23
gut	75	77	41	48	51	-	46	88	76
<b>Durchführung der Pflegearbeiten</b>									
unvollständig	25	10	9	6	8	-	7	15	15
vollständig	75	90	91	94	92	100	93	85	85

1) Länder mit Weinbau.

Güte der Trauben im September 1967

Noten: 1 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3 (mittel) = 1/2 Herbst,  
4 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	September			
	1967		1966	
	Weißer Sorten	Rote Sorten	Weißer Sorten	Rote Sorten
Noten				
Nordrhein-Westfalen	1,7	2,0	2,3	2,3
Hessen	2,3	2,8	2,1	1,7
RB Darmstadt (Bergstraße)	1,8	2,0	2,1	2,0
RB Wiesbaden (Rheingau)	2,4	2,8	2,1	1,7
Rheinland-Pfalz	2,5	2,6	2,1	2,1
Rheinland-Nassau	2,4	2,3	2,1	2,0
davon: Mittelrhein	2,4	2,1	2,2	2,2
Nahe (RB Koblenz)	2,3	2,6	2,0	2,5
Obermosel	2,8	.	2,4	.
Saar	2,7	.	2,1	.
Ruwer	2,4	.	2,0	.
Mittelmosel	2,3	.	2,0	.
Untermosel	2,4	.	2,1	.
Ahr	2,1	2,3	2,1	2,0
Lahn	2,0	2,0	2,4	.
Rheinhessen	2,5	2,7	2,1	2,2
davon: Worms und Umgegend	2,5	2,7	2,1	2,4
Oppenheim und Umgegend	2,2	2,3	2,0	2,0
Mainz und Umgegend	2,3	2,3	1,7	1,8
Ingelheim und Umgegend	2,4	2,7	2,1	2,0
Wiesbach	2,5	2,8	2,3	2,4
Bingen und Umgegend	2,3	2,3	2,0	2,0
Nahe (RB Rheinhessen)	2,8	2,8	2,1	2,0
Alzey und Umgegend	2,5	2,6	2,0	2,1
Pfalz	2,6	2,6	2,1	2,1
davon: Mittelhaardt	2,5	2,6	1,9	2,0
Oberhaardt	2,7	2,7	2,1	2,1
Unterhaardt mit Zellertal	2,6	2,6	2,3	2,4
Nahe (RB Pfalz)	2,5	2,0	2,3	2,4
Baden-Württemberg	2,3	2,2	2,3	2,2
Nordwürttemberg	2,1	2,2	2,3	2,2
davon: Oberes Neckartal	2,2	3,0	3,0	3,0
Unteres Neckartal	2,1	2,2	2,2	2,2
Remstal	2,2	2,3	2,2	2,3
Enzta	2,0	2,3	2,5	2,2
Zabergäu	2,3	2,1	2,3	2,1
Kocher- und Jagsttal	2,1	2,2	2,4	2,3
Taubergengegend	2,2	2,8	2,6	2,7

Güte der Trauben im September 1967

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	September			
	1967		1966	
	Weißer Sorten	Rote Sorten	Weißer Sorten	Rote Sorten
	Noten			
noch:				
Baden-Württemberg				
Nordbaden	2,2	2,5	2,4	2,4
davon: Tauber- und Maintal	2,1	2,5	2,4	2,4
Neckar- und Jagsttal	2,4	2,4	2,5	2,4
Bergstraße	2,1	2,5	2,4	2,4
Kraichgau	2,3	2,4	2,3	2,4
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	2,4	2,7	2,4	2,4
Südbaden	2,3	2,1	2,2	2,2
davon: Seegegend	3,1	2,3	2,3	2,1
Oberes Rheintal	4,0	2,5	2,0	1,5
Markgräflerland	2,3	2,3	2,2	2,3
Kaiserstuhl	2,3	2,1	2,2	2,1
Breisgau	2,5	2,0	2,3	2,2
Ortenau und Bühlergegend	2,2	2,2	2,2	2,2
Südwestfalen-Hohenzollern	2,2	2,3	2,3	2,3
davon: Oberes Neckartal	2,0	2,1	2,3	2,3
EnztaI	-	4,0	3,0	3,0
Bodenseegebiet	2,4	2,1	2,0	2,0
Bayern	2,5	2,6	2,4	2,0
RB Unterfranken	2,5	2,6	2,3	2,0
RB Mittelfranken	2,5	-	3,1	-
RB Schwaben	3,0	-	2,0	-
RB Oberpfalz	3,0	-	4,0	-
RB Niederbayern	.	.	.	.
Saarland	2,0	2,0	1,9	2,0
Bundesgebiet <sup>1)</sup>	2,5	2,4	2,1	2,1
1965			3,3	3,1
1964			2,0	2,0
1963			2,4	2,5
1962			2,8	2,6
1961				2,8
1960				2,7
1959				1,6
1958				2,4
1957				3,0
1956				3,6
1955				2,9

1) Länder mit Weinbau

Vorschätzung der Weinmosternte 1967 nach dem Stand September

Land	Weißmost			Rotmost 2)		
	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
	ha	h]		ha	h]	
Nordrhein-Westfalen	25	70,0	1 750	2	60,0	120
Hessen	3 205	71,0	227 184	62	48,0	3 000
RB Wiesbaden	3 002	71,0	213 142	60	48,0	2 880
RB Darmstadt	203	69,0	14 042	2	60,0	120
Rheinland-Pfalz	43 868	94,0	4 113 934	4 807	100,0	481 028
Rheinland-Nassau	14 155	89,0	1 254 504	354	69,0	24 281
Mittelrhein	970	63,0	61 110	15	60,0	900
Nahe (RB Koblenz)	3 013	82,0	247 066	20	89,0	1 780
Obermosel	794	88,0	69 872	0	.	.
Saar	1 023	80,0	81 840	0	.	.
Ruwer	302	85,0	25 670	0	.	.
Mittelmosel	5 139	99,0	508 761	1	.	.
Untermosel	2 689	91,0	244 335	0	.	.
Ahr	217	70,0	15 190	317	68,0	21 556
Lahn	12	55,0	660	1	45,0	45
Rheinhessen	14 894	92,0	1 368 790	1 335	89,0	118 861
Worms und Umgegend	4 454	98,0	436 492	410	102,0	41 820
Oppenheim und Umgegend	1 362	93,0	126 666	6	55,0	330
Mainz und Umgegend	959	85,0	81 515	104	76,0	7 904
Ingelheim und Umgegend	1 003	83,0	83 249	354	72,0	25 488
Wiesbach	1 610	99,0	159 390	151	101,0	15 251
Bingen und Umgegend	332	78,0	25 896	20	71,0	1 420
Nahe (RB Rheinhessen)	613	81,0	49 653	36	77,0	2 772
Alzey und Umgegend	4 561	89,0	405 929	254	94,0	23 876
Pfalz	14 819	101,0	1 490 640	3 118	108,0	337 886
Mittelhaardt	4 000	95,0	380 000	1 612	106,0	170 872
Oberhaardt	8 944	106,0	948 064	753	113,0	85 089
Unterhaardt mit Zellertal	1 347	96,0	129 312	749	109,0	81 641
Nahe (RB Pfalz)	528	63,0	33 264	4	71,0	284
Baden-Württemberg	8 941	83,9	749 166	6 224	76,8	477 841
Bayern	2 227	51,9	115 669	30	37,3	1 119
Unterfranken	2 001	53,5	107 054	30	37,3	1 119
Mittelfranken	224	38,1	8 534	-	-	-
Übrige Gebiete	2	40,5	81	-	-	-
Saarland	69	82,9	5 717	0	140,0	20
Bundesgebiet <sup>1)</sup>	58 335	89,4	5 213 420	11 125	86,6	963 128

1) Länder mit Weinbau. - 2) Rotmost einschließlich Most aus gemischten Beständen.