

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Stand der Reben**

**Juni 1968**



Bestellnummer : 210230 - 680002

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben . . . . .	4
2. Allgemeiner Beginn der Blüte . . . . .	5
3. Durchschnittliche Dauer der Blüte . . . . .	6
4. Begutachtung des Standes der Reben . . . . .	7

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau.

Erschienen im Juli 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

In reichlich der Hälfte der Bezirksbezirke wurde die Sonnenscheindauer als zu gering und in mehr als einem Drittel der Bezirke der Temperaturverlauf als ungünstig bezeichnet. Die Niederschläge wurden in 81 % der Meldungen als ausreichend bezeichnet. Die Veränderungen gegenüber Mai 1968 waren also geringfügig. Im Juni 1967 war die Beurteilung dagegen deutlich günstiger gewesen. Die Wetterschäden hatten - bei einem Anstieg gegenüber dem Vormonat - etwa den gleichen Umfang wie vor einem Jahr. Der Anteil der Bezirke mit vollständiger Durchführung der laufenden Pflegearbeiten hat sich nur wenig verändert.

Der Gescheinansatz wurde besser bewertet als 1967, und zwar in rd. zwei Dritteln der Meldungen gut und in einem Drittel mittel. Der Verlauf der Blüte hingegen wurde nur von rd. einem Viertel der Berichterstatter als gut, von beinahe zwei Drittel aber als mittel und von 10 % als schlecht beurteilt. Im Juni 1967 überwog hier die Einstufung gut.

Der allgemeine Beginn der Blüte lag bei den meisten in die Feststellung einbezogenen Rebsorten etwas früher als 1967, und zwar überwiegend in der Zeit vom 11. bis 20. Juni, vom Riesling und Silvaner abgesehen, bei denen sich etwas größere Anteile für die Tage vom 21. bis 30. Juni ergaben. Die durch geographische und klimatische Gegebenheiten bedingten Unterschiede zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kommen in den Angaben deutlich zum Ausdruck.

Die durchschnittliche Dauer der Blüte war - vom Elbling abgesehen - länger als 1967. Rd. 50 % der Meldungen nannten eine durchschnittliche Dauer von 8 bis 10 Tagen.

Die Note für den Stand der Reben ist im Durchschnitt der weinbaureisenden Länder mit 2,3 trotz mancher Änderungen in den einzelnen Weinbaugebieten gegenüber dem Mai unverändert geblieben. Schlechtere Noten als im vorigen Monat haben von den größeren Gebieten nur Nordrhein-Westfalen und Südbaden. Vor einem Jahr waren bei der Note 2,1 die Aussichten besser.

## 1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

Juni 1968

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Juni	Mai	Juni
							1968		1967
in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben									
Witterung für die Reben									
schlecht	-	9	18	10	7	-	13	.	10
mittel	100	60	72	72	60	100	71	.	61
gut	-	31	10	18	33	-	16	.	29
Wetterschäden									
keine	75	63	74	71	58	100	71	84	76
schwache	25	26	16	18	24	-	18	11	17
mittlere	-	9	8	8	13	-	8	4	5
starke	-	2	2	3	5	-	3	1	2
Niederschläge									
zu gering	25	-	1	0	1	-	1	2	1
ausreichend	50	80	83	80	80	100	81	79	90
zu hoch	25	20	16	20	19	-	18	19	9
Temperaturverlauf									
ungünstig	75	26	45	33	13	-	37	40	28
normal	25	63	51	60	69	100	56	50	54
günstig	-	11	4	7	18	-	7	10	18
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	40	58	47	28	100	51	.	36
genügend	-	57	42	52	68	-	48	.	60
reichlich	-	3	-	1	4	-	1	.	4
Geschehensansatz									
schlecht	-	-	1	2	3	-	1	.	3
mittel	75	20	39	26	22	-	31	.	37
gut	25	80	60	72	75	100	68	.	60
Verlauf der Blüte									
schlecht	75	3	13	8	7	-	10	.	3
mittel	25	69	68	64	55	-	64	.	32
gut	-	28	19	28	38	100	26	.	65
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	50	91	72	82	65	100	77	76	80
unvollständig	50	9	28	18	35	-	23	24	20

2. Allgemeiner Beginn der Blüte  
Juni 1968

Rebsorte	Datum	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1968	1967
in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben									
Silvaner	bis 10. 6.	-	3	0	3	-	-	1	0
	vom 11. - 20. 6.	100	75	37	56	45	-	47	20
	" 21. - 30. 6.	-	22	58	40	54	100	49	76
	nach dem 30. 6.	-	-	5	1	1	-	3	4
Riesling	bis 10. 6.	-	3	-	3	-	-	1	0
	vom 11. - 20. 6.	50	69	28	62	38	-	43	21
	" 21. - 30. 6.	50	28	64	35	59	100	51	74
	nach dem 30. 6.	-	-	8	0	3	-	5	5
Müller Thurgau	bis 10. 6.	-	3	1	5	1	-	3	1
	vom 11. - 20. 6.	50	86	49	70	65	-	60	40
	" 21. - 30. 6.	50	11	46	25	34	100	35	56
	nach dem 30. 6.	-	-	4	0	-	-	2	3
Elbling	bis 10. 6.	-	-	-	-	-	-	-	-
	vom 11. - 20. 6.	-	-	9	-	-	-	7	7
	" 21. - 30. 6.	-	-	67	-	-	100	75	88
	nach dem 30. 6.	-	-	24	-	-	-	18	5
Ruländer	bis 10. 6.	-	-	-	4	-	-	4	2
	vom 11. - 20. 6.	-	-	-	71	-	-	69	44
	" 21. - 30. 6.	-	-	-	25	-	100	27	53
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	1
Portugieser	bis 10. 6.	-	-	1	4	-	-	2	0
	vom 11. - 20. 6.	25	100	64	68	50	-	66	37
	" 21. - 30. 6.	75	-	32	28	50	-	31	61
	nach dem 30. 6.	-	-	3	-	-	-	1	2
Burgunder	bis 10. 6.	-	-	-	4	-	-	3	0
	vom 11. - 20. 6.	100	100	49	69	67	-	66	28
	" 21. - 30. 6.	-	-	49	26	33	100	30	65
	nach dem 30. 6.	-	-	2	1	-	-	1	7

Zahl der Meldungen mit Angaben über Beginn der Blüte

Silvaner	2	32	355	313	89	3	794	686
Riesling	4	35	425	298	32	3	797	731
Müller-Thurgau	4	35	457	454	94	7	1 051	939
Elbling	-	-	21	-	-	7	28	67
Ruländer	-	-	-	215	-	7	222	164
Portugieser	3	4	263	208	14	-	492	472
Burgunder	1	3	49	258	9	1	321	148

3. Durchschnittliche Dauer der Blüte  
Juni 1968

Rebsorte	Dauer	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1968	1967
in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben									
Silvaner	bis 4 Tage	-	4	3	9	2	-	5	12
	5 " 7 "	100	19	21	21	21	-	21	42
	8 " 10 "	-	44	54	37	46	100	46	38
	11 " 14 "	-	22	22	26	20	-	23	8
	15 Tage u. m.	-	11	0	7	11	-	5	0
Riesling	bis 4 Tage	-	-	2	6	9	-	4	11
	5 " 7 "	100	21	18	17	37	-	19	36
	8 " 10 "	-	36	50	43	27	100	45	41
	11 " 14 "	-	29	26	27	18	-	26	11
	15 Tage u. m.	-	14	4	7	9	-	6	1
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	-	8	8	3	-	7	14
	5 " 7 "	100	14	23	20	29	-	21	44
	8 " 10 "	-	59	50	44	42	100	48	36
	11 " 14 "	-	17	17	24	19	-	20	6
	15 Tage u. m.	-	10	2	4	7	-	4	0
Elbling	bis 4 Tage	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 " 7 "	-	-	-	-	-	-	-	9
	8 " 10 "	-	-	50	-	-	100	82	71
	11 " 14 "	-	-	50	-	-	-	18	20
	15 Tage u. m.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	bis 4 Tage	-	-	-	4	-	-	4	14
	5 " 7 "	-	-	-	24	-	-	23	34
	8 " 10 "	-	-	-	44	-	100	47	46
	11 " 14 "	-	-	-	21	-	-	20	5
	15 Tage u. m.	-	-	-	7	-	-	6	1
Portugieser	bis 4 Tage	-	-	7	9	-	-	8	15
	5 " 7 "	-	-	24	23	36	-	24	45
	8 " 10 "	-	50	54	43	55	-	49	34
	11 " 14 "	-	50	15	20	-	-	17	5
	15 Tage u. m.	-	-	-	5	9	-	2	1
Burgunder	bis 4 Tage	-	-	3	6	-	-	5	14
	5 " 7 "	-	-	20	22	12	-	21	44
	8 " 10 "	-	-	47	50	50	100	49	38
	11 " 14 "	-	100	27	18	38	-	21	4
	15 Tage u. m.	-	-	3	4	-	-	4	-

Zahl der Meldungen mit Angaben über durchschnittliche Dauer der Blüte

Silvaner	1	27	214	214	56	3	515	416
Riesling	1	28	213	214	22	3	481	442
Müller-Thurgau	1	29	271	333	62	7	703	627
Elbling	-	-	4	-	-	7	11	37
Ruländer	-	-	-	166	-	7	173	111
Portugieser	-	4	191	138	11	-	344	320
Burgunder	-	3	30	192	8	1	234	98

#### 4. Begutachtung des Standes der Reben 1968

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1968		1967
	Juni	Mai	Juni
Nordrhein-Westfalen	2,4	2,1	2,5
Hessen	2,1	2,1	2,0
RB Darmstadt (Bergstraße)	2,1	2,1	2,3
Wiesbaden (Rheingau)	2,1	2,1	2,0
Rheinland-Pfalz	2,3	2,4	2,1
Rheinland-Nassau	2,3	2,3	2,3
davon: Mittelrhein	2,2	2,1	2,4
Nahe (RB Koblenz)	2,3	2,6	2,1
Obermosel	2,4	2,2	3,0
Saar	2,3	2,2	2,5
Ruwer	2,5	2,4	2,4
Mittelmosel	2,2	2,2	2,1
Untermosel	2,3	2,3	2,4
Ahr	2,1	2,0	2,3
Lahn	2,3	2,6	2,8
Rheinhessen	2,3	2,5	2,0
davon: Worms und Umgegend	2,3	2,4	1,8
Oppenheim und Umgegend	2,2	2,3	2,0
Mainz und Umgegend	2,1	2,1	2,0
Ingelheim und Umgegend	2,3	2,7	2,1
Wiesbach	2,4	2,5	1,9
Bingen und Umgegend	2,3	2,3	2,1
Nahe (RB Rheinhessen)	2,2	2,9	1,9
Alzey und Umgegend	2,2	2,5	2,1
Pfalz	2,3	2,6	2,1
davon: Mittelhaardt	2,2	2,5	2,1
Oberhaardt	2,4	2,6	2,2
Unterhaardt mit Zellertal	2,1	2,4	1,9
Nahe (RB Pfalz)	2,6	2,9	2,5
Baden-Württemberg	2,2	2,2	2,2
Nordwürttemberg	2,2	2,4	2,4
davon: Oberes Neckartal	2,7	2,4	2,3
Unteres Neckartal	2,3	2,5	2,5
Remstal	2,1	2,1	2,1
Enztal	2,2	2,2	2,5
Zabergäu	2,2	2,4	2,4
Kocher- und Jagsttal	2,4	2,6	2,4
Tauberggegend	1,6	1,9	2,9

#### 4. Begutachtung des Standes der Reben 1968

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Note		
	1968		1967
	Juni	Mai	Juni
Nordbaden	2,2	2,2	2,2
davon: Tauber- und Maintal	2,7	3,2	2,4
Neckar- und Jagsttal	2,9	3,6	2,5
Bergstraße	2,1	2,0	2,1
Kraichgau	2,1	2,0	2,2
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,3	2,0	2,5
Südbaden	2,2	2,0	2,1
davon: Seegegend	1,8	1,8	2,3
Oberes Rheintal	1,7	2,2	3,0
Märkgräflerland	2,2	2,3	2,3
Kaiserstuhl	2,3	2,0	2,0
Breisgau	2,2	1,9	2,2
Ortenau und Bühlergegend	2,1	1,9	2,1
Südwestfalen-Lippe	2,8	3,0	2,1
davon: Oberes Neckartal	3,0	3,2	2,0
Enztal	2,5	2,5	2,5
Bodenseegebiet	2,0	2,0	2,1
Bayern	2,2	2,3	2,4
RB Unterfranken	2,1	2,4	2,4
Mittelfranken	2,4	2,2	2,8
Schwaben	3,0	4,0	3,0
Oberpfalz	2,0	2,0	.
Niederbayern	.	.	2,0
Saarland	1,8	2,1	1,7
Bundesgebiet <sup>1)</sup>	2,3	2,3	2,1
1950	2,1	2,1	
1951	2,1	2,1	
1952	2,4	2,3	
1953	3,0	3,0	
1954	2,4	2,5	
1955	2,7	2,7	
1956	3,8	3,9	
1957	3,0	3,2	
1958	2,1	2,1	
1959	2,2	2,3	
1960	1,9	2,1	
1961	2,4	2,4	
1962	2,3	2,4	
1963	2,5	2,9	
1964	1,8	2,0	
1965	2,1	2,1	
1966	2,3	2,4	
1967	2,1	2,2	

1) 1959 und früher ohne Saarland