

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung

September 1968



Bestellnummer : 210230 - 680005
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
2. Güte der Trauben im September	5
3. Vorschätzung der Weinmosternte September 1968 . .	7
4. Witterungseinflüsse und Weinmosternten 1963-1968	9

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Oktober 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 25. August bis zum 24. September wurde der Witterungsverlauf für die diesjährige Weinmosternte noch schlechter beurteilt als in den beiden Vormonaten. Es war der in dieser Beziehung unbefriedigendste September der letzten 12 Jahre.

Das schlägt sich auch in den Noten über die Güte der Trauben nieder, die im Bundesdurchschnitt für weiße Sorten mit 3,1 und für rote Sorten mit 3,0 nur mittel ausfielen. Sie entsprechen damit etwa der Einstufung des Jahres 1965. Die Vorschätzung der Hektarerträge - 75,1 hl je ha für Weißmost und 80,8 hl je ha für Rotmost - läßt trotz der mengenmäßigen Beeinträchtigungen durch Fäulnis insgesamt eine Weinmosternte erwarten, die mit voraussichtlich 5,3 Mill. hl Weinmost, die des Jahres 1965 (5,0 Mill. hl) übertreffen wird. Allerdings wird die Vorjahresmenge von fast 6,1 Mill. hl Weinmost wahrscheinlich nicht erreicht werden. Von der diesjährigen Erntemenge werden voraussichtlich 4,4 Mill. hl auf Weißmost und 0,9 Mill. hl auf Rotmost entfallen.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand Beurteilung	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
							September	August	September
							1968		1967
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	50	71	81	65	78	100	73	61	20
mittel	50	29	19	34	22	-	26	38	53
gut	-	-	-	1	-	-	1	1	27
Wetterschäden									
keine	25	48	68	60	50	100	62	56	77
schwache	-	26	20	24	25	-	22	27	11
mittlere	-	17	9	11	21	-	11	12	7
starke	75	9	3	5	4	-	5	5	5
Niederschläge									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	0	1
ausreichend	-	6	8	6	3	-	6	11	58
zu hoch	100	94	92	94	97	100	94	89	41
Temperaturverlauf									
ungünstig	100	77	89	86	90	100	87	87	37
normal	-	20	11	13	9	-	12	13	47
günstig	-	3	-	1	1	-	1	0	16
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	97	97	95	99	100	96	96	48
genügend	-	3	3	5	1	-	4	4	47
reichlich	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	54	45	25	43	100	36	15	6
mittel	75	46	52	64	51	-	57	72	48
gut	25	-	3	11	6	-	7	13	46
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	25	49	49	77	76	100	64	63	93
unvollständig	75	51	51	23	24	-	36	37	7

2. Güte der Trauben September 1968

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißer Sorten	Rote Sorten	Weißer Sorten	Rote Sorten
	1968		1967	
Nordrhein-Westfalen	2,4	2,8	1,7	2,0
Hessen	3,5	3,4	2,3	2,8
RB Darmstadt (Bergstraße)	3,1	3,5	1,8	2,0
RB Wiesbaden (Rheingau)	3,5	3,4	2,4	2,8
Rheinland-Pfalz	3,1	3,2	2,5	2,6
Rheinland-Nassau	3,0	2,5	2,4	2,3
Mittelrhein	3,2	3,0	2,4	2,1
Nahe (RB Koblenz)	3,0	3,0	2,3	2,6
Obermosel	3,1	.	2,8	.
Saar	3,2	-	2,7	.
Ruwer	3,3	-	2,4	.
Mittelmösel	3,0	3,0	2,3	.
Untermösel	3,0	.	2,4	.
Ahr	2,5	2,4	2,1	2,3
Lahn	3,0	3,0	2,0	2,0
Rheinhessen	3,0	2,9	2,5	2,7
Worms und Umgegend	3,1	3,1	2,5	2,7
Oppenheim und Umgegend	3,2	2,9	2,2	2,3
Mainz und Umgegend	2,9	2,5	2,3	2,3
Ingelheim und Umgegend	2,6	2,6	2,4	2,7
Wiesbach	3,2	3,4	2,5	2,8
Bingen und Umgegend	2,3	2,1	2,3	2,3
Nahe (RB Rheinhessen)	3,4	3,1	2,8	2,8
Alzey und Umgegend	3,0	3,0	2,5	2,6
Pfalz	3,1	3,4	2,6	2,6
Mittelhaardt	3,1	3,4	2,5	2,6
Oberhaardt	3,1	3,2	2,7	2,7
Unterhaardt mit Zellertal	3,2	3,4	2,6	2,6
Nahe (RB Pfalz)	3,1	3,5	2,5	2,0
Baden-Württemberg	3,0	2,9	2,3	2,2
Nordwürttemberg	3,1	2,9	2,1	2,2
Oberes Neckartal	2,4	3,0	2,2	3,0
Unteres Neckartal	3,1	2,9	2,1	2,2
Remstal	2,9	2,2	2,2	2,3
Enztal	3,1	2,9	2,0	2,3
Zabergäu	3,4	3,1	2,3	2,1
Kocher- und Jagsttal	3,2	3,1	2,1	2,2
Tauber- und Jagsttal	3,3	3,4	2,2	2,8

2. Güte der Trauben September 1968

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißer Sorten	Rote Sorten	Weißer Sorten	Rote Sorten
	1968		1967	
Nordbaden	3,2	3,3	2,2	2,5
Tauber- und Maintal	3,2	3,5	2,1	2,5
Neckar- und Jagsttal	2,9	3,1	2,4	2,4
Bergstraße	3,2	3,6	2,1	2,5
Kraichgau	3,1	3,3	2,3	2,4
Pfinz-, Enz- und Albtal	3,3	3,1	2,4	2,7
Südbaden	2,9	2,7	2,3	2,1
Seegegend	2,3	2,0	3,1	2,3
Oberes Rheintal	3,1	3,0	4,0	2,5
Markgräflerland	2,9	3,0	2,3	2,3
Kaiserstuhl	2,9	2,7	2,3	2,1
Breisgau	2,8	2,7	2,5	2,0
Ortenau und Bühlergegend	3,0	2,7	2,2	2,2
Südwestfalen-Hohenzollern	2,8	2,9	2,2	2,3
Oberes Neckartal	2,7	2,8	2,0	2,1
Enztal	-	3,5	-	4,0
Bodenseegebiet	3,0	3,0	2,4	2,1
Bayern	3,3	3,3	2,5	2,6
RB Unterfranken	3,3	3,3	2,5	2,6
RB Mittelfranken	3,4	-	2,5	-
RB Schwaben	3,0	-	3,0	-
RB Oberpfalz	3,0	-	3,0	-
RB Niederbayern	.	-	.	-
Saarland	3,0	3,0	2,0	2,0
Bundesgebiet	3,1	3,0	2,5	2,4
1955				2,9
1956				3,6
1957				3,0
1958				2,4
1959				1,6
1960				2,7
1961				2,8
1962			2,8	2,6
1963			2,4	2,5
1964			2,0	2,0
1965			3,3	3,1
1966			2,1	2,1

3. Vorschätzung der Weinmosternte September 1968

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost			Rotmost 1)		
	Ertragfähige	Ertrag	Erntemenge	Ertragfähige	Ertrag	Erntemenge
	Rebfläche	je ha		Rebfläche	je ha	
	ha	hl		ha	hl	
Nordrhein-Westfalen	22	40,0	880	2	40,0	80
Hessen	3 230	61,0	198 462	60	47,0	2 791
RB Wiesbaden	3 010	61,0	184 772	59	46,0	2 731
RB Darmstadt	220	62,0	13 690	1	60,0	60
Rheinland-Pfalz	44 470	77,0	3 418 936	4 717	92,0	433 107
Rheinland-Nassau	14 252	76,0	1 083 441	350	65,0	22 694
Mittelrhein	928	53,0	49 184	11	62,0	682
Nahe (RB Koblenz)	3 019	53,0	160 007	20	65,0	1 300
Obermosel	808	109,0	88 072	0	.	.
Saar	1 034	74,0	76 516	-	-	-
Ruwer	304	59,0	17 936	-	-	-
Mittelmosel	5 246	89,0	466 894	1	69,0	69
Untermosel	2 687	78,0	209 586	0	.	.
Ahr	214	69,0	14 766	317	65,0	20 605
Lahn	12	40,0	480	1	38,0	38
Rheinhessen	15 085	72,0	1 080 740	1 288	78,0	100 549
Worms und Umgegend	4 503	76,0	342 228	404	89,0	35 956
Oppenheim und Umgegend	1 373	76,0	104 348	7	81,0	567
Mainz und Umgegend	950	75,0	71 250	96	77,0	7 392
Ingelheim und Umgegend	1 024	75,0	76 800	346	72,0	24 912
Wiesbach	1 634	60,0	98 040	146	66,0	9 636
Bingen und Umgegend	349	66,0	23 034	23	66,0	1 518
Nahe (RB Rheinhessen)	604	58,0	35 032	36	73,0	2 628
Alzey und Umgegend	4 648	71,0	330 008	230	78,0	17 940
Pfalz	15 133	83,0	1 254 755	3 079	101,0	309 864
Mittelhaardt	4 092	81,0	331 452	1 608	94,0	151 152
Oberhaardt	9 163	87,0	797 181	737	116,0	85 492
Unterhaardt mit Zellertal	1 364	74,0	100 936	730	100,0	73 000
Nahe (RB Pfalz)	514	49,0	25 186	4	55,0	220

3. Vorschätzung der Weinmosternte September 1968

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost			Rotmost 1)		
	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
	ha	hl		ha	hl	
Baden-Württemberg	9 062	77,1	698 511	6 256	73,0	456 692
Nordwürttemberg	2 383	64,9	154 582	3 944	74,8	294 941
Oberes Neckartal	40	44,4	1 777	6	55,7	334
Unteres Neckartal	1 255	64,7	81 191	2 308	76,1	175 680
Remstal	328	69,6	22 817	382	75,9	29 011
Enztal	77	55,5	4 271	463	73,0	33 798
Zabergäu	235	66,0	15 502	576	72,5	41 737
Kocher- und Jagsttal	327	59,5	19 442	189	68,6	12 958
Tauber- und Jagsttal	121	79,2	9 582	20	71,2	1 423
Nordbaden	1 396	58,6	81 863	501	56,4	28 241
Tauber- und Maintal	274	42,8	11 726	20	39,8	795
Neckar- und Jagsttal	28	46,3	1 297	19	50,2	953
Bergstraße	455	63,9	29 088	154	59,9	9 221
Kraichgau	563	59,9	33 716	240	55,7	13 362
Pfinz-, Enz- u. Alb- u. Oberrhein	76	79,4	6 036	68	57,5	3 910
Südbaden	5 270	87,5	461 219	1 776	74,0	131 415
Seegegend	56	85,0	4 758	111	77,4	8 594
Oberes Rheintal	6	94,2	565	18	89,5	1 611
Markgräflerland	1 294	92,5	119 729	80	70,5	5 638
Kaiserstuhl	1 723	91,6	157 879	648	78,4	50 783
Breisgau	1 205	91,6	110 379	498	78,9	39 300
Ortenau u. Bühler- u. Oberrhein	986	68,9	67 909	421	60,5	25 489
Südwestfalen-Lippe	13	65,2	847	35	59,9	2 095
Oberes Neckartal	9	62,7	564	28	60,9	1 705
Enztal	-	-	-	5	62,0	310
Bodenseegebiet	4	70,8	283	2	40,0	80
Bayern	2 290	50,9	116 603	32	36,7	1 174
RB Unterfranken	2 052	51,6	105 883	32	36,7	1 174
RB Mittelfranken	234	44,9	10 507	-	-	-
Übrige Gebiete	4	53,3	213	-	-	-
Saarland	73	108,7	7 932	0	130,8	18
Bundesgebiet	59 147	75,1	4 441 324	11 067	80,8	893 862

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen

4. Witterungseinflüsse und Weinmosternten 1963 - 1968

Berichtsgegenstand	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Beurteilung	% der ausgewerteten Meldungen					
Witterung für die Reben und Trauben						
schlecht	5	-	56	1	20	73
mittel	37	25	41	27	53	26
gut	58	75	3	72	27	1
Niederschläge						
zu gering	16	43	-	8	1	-
ausreichend	78	57	46	88	58	6
zu hoch	6	-	54	4	41	94
Temperaturverlauf						
ungünstig	10	2	71	3	37	87
normal	36	33	24	28	47	12
günstig	54	65	5	69	16	1
Sonnenscheindauer						
zu gering	14	0	83	5	48	96
genügend	58	45	16	58	47	4
reichlich	28	55	1	37	5	-
Entwicklung der Trauben						
schlecht	2	1	36	1	6	36
mittel	33	25	59	23	48	57
gut	65	74	5	76	46	7
	hl					
Weinmost insgesamt	6 034 147	7 185 349	5 035 473	4 809 358	6 069 362	5 335 186 ²⁾
Weißmost	5 069 559	6 006 052	4 160 536	4 060 845	5 120 717	4 441 324 ²⁾
Rotmost ¹⁾	964 588	1 179 297	874 937	748 513	948 645	893 862 ²⁾

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen

2) Verschätzung