

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Weinmosternte**

**(Berichterstatterschätzung)**

**1968**



Bestellnummer : 210230 - 680007

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Angaben über Witterung . . . . .	5
2. Schätzung der Weinmosternte in hl je ha . . . . .	5
3. Verkauf und Verkaufserlöse von Speisetrauben . . . . .	6
4. Verkaufserlös für Most bei Verkäufen während der Lese . . . . .	7
5. Ergebnisse nach Weinbaulandschaften . . . . .	6
6. Ende der Lese (einschl. Spätlese) . . . . .	8
7. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes	
Weinmost insgesamt . . . . .	10
Weißmost . . . . .	12
Rotmost . . . . .	14
8. Mostgewicht und Säuregehalt der Weinmosternte 1968	16
9. Mosterträge und Mostausbeute wichtiger Rebsorten .	20

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau

Erschienen im Januar 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C. II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Witterungsverhältnisse in der Berichtszeit vom 16. 10. bis zum 24. 11. 1968 fanden eine wesentlich bessere Beurteilung als in der vorigen Berichtsperiode.

Sie gestatteten daher, die infolge reichlicher Niederschläge rasch begonnene Lese bei gesundem Lesegut hinauszuzögern, um höhere Mostgewichte und stärkeren Säureabbau zu erreichen. Trotzdem war die Lese noch früher als im Vorjahr abgeschlossen.

Die gesamte Erntemenge (5,65 Mill. hl) setzt sich aus ca 82,3 % Weißmost (4,65 Mill. hl) und 17,7 % Rotmost und Most aus gemischten Beständen (1,0 Mill. hl) zusammen. Die Gesamtmenge liegt damit um 2,5 % über dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre, ist aber um 6,9 % niedriger als im vorigen Jahr.

Die endgültige Ernteschätzung für Weinmost ergab entgegen aller Befürchtungen ein mengenmäßig zufriedenstellendes Ergebnis. Mit einem Hektarertrag von 80,5 hl und einem Gesamtertrag von 5,65 Mill. hl liegt das diesjährige Ergebnis fast auf derselben Höhe wie der 6jährige Durchschnitt der Jahre 1962/67.

Die Erträge für Weißmost erreichten 78,6 hl/ha und bei Rotmost 90,5 hl/ha. Während das Ergebnis für Weißmost etwas unter den 6jährigen Durchschnitt 1962/67 von 80,6 hl/ha abgesunken ist, übertrifft der Rotmost den 6jährigen Durchschnitt von 78,8 hl/ha erheblich. Der Ertrag an Rotmost des Jahres 1968 ist somit der drittgrößte nach den Jahren 1960 (115,2 hl/ha) und 1964 (102,0 hl/ha) in der Geschichte des Weinbaus der Bundesrepublik.

Die Schätzungen der Hektarerträge für wichtige Rebsorten wiesen für den Portugieser mit 100,6 hl/ha hohe Werte nach, obwohl der Portugieser als frühreifende Sorte in der Zeit hoher Niederschläge gelesen werden mußte. Beim Müller-Thurgau, dessen Lese wegen Fäulnisgefahr beschleunigt durchgeführt wurde, sind angesichts der bekannten Botrytisanfälligkeit mit 85,5 hl/ha noch beachtenswerte Ergebnisse erreicht worden. Die Angaben schwanken für die einzelnen Weinbaugebiete erheblich. Die Erträge für den Silvaner, Riesling und Burgunder zeigen etwa gleichmäßig hohe Werte.

Die Angaben über die Mostausbeute nach Rebsorten bilden eine Ergänzung zu den Meldungen über die Hektarerträge. Sie geben Auskunft über die Brühigkeit der Trauben, bzw. über das Reifestadium der Beeren. Deshalb ist

es nicht weiter verwunderlich, daß die Werte allgemein bis auf die vom Müller-Thurgau unter denen des Vorjahres, aber bedeutend über denen des vergleichbaren Jahres 1965 liegen.

Die Beurteilung der Güte des Mostes läßt eine Verbesserung gegenüber der Oktobervorschätzung erkennen, erreicht aber nicht die Werte des vorigen Jahres und des 6jährigen Durchschnitts 1962/67.

Die einzelnen Mostgewichts- und Säurestufen für Weiß- und Rotmost liegen deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre. Für Weiß- und Rotmost beträgt das durchschnittliche Mostgewicht 62 Grad Öchsle. Die durchschnittlichen Säuregehalte sind wie gewöhnlich für den Rotmost (11,9 %) niedriger als für den Weißmost (12,6 %). Diese Werte bewegen sich infolge des Mangels an Sonne und Wärme in der Nähe der Angaben für das Jahr 1965, sind jedoch dank der langen Vegetationsperiode und der durchschnittlich höheren Monats-temperaturen geringfügig besser eingestuft.

Im Anschluß an diesen abschließenden Bericht über die Berichterstatter-schätzung wird erstmalig für dieses Jahr außerdem ein Mengenergebnis der Weinmosternte veröffentlicht werden, das aufgrund repräsentativer Erntemessungen (sog. Ergänzende Ernteermittlung für Weinmost) ermittelt wurde; dadurch können die eingangs genannten Mengenangaben noch Änderungen erfahren.

1. Allgemeine Angaben über Witterung  
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand		Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
								November	Oktober	November
								1968		1967
Witterung f. d. Reben und Trauben										
	schlecht	-	18	18	21	41	57	22	73	7
	mittel	100	61	66	56	50	43	60	26	39
	gut	-	21	16	23	9	-	18	1	54
Wetterschäden										
	keine	75	97	100	95	82	100	95	84	93
	schwache	25	-	-	3	3	-	2	6	5
	mittlere	-	3	-	2	10	-	2	6	1
	starke	-	-	-	0	5	-	1	4	1
Niederschläge										
	zu gering	-	9	-	0	1	-	1	0	2
	ausreichend	100	73	85	74	58	100	77	8	84
	zu hoch	-	18	15	26	41	-	22	92	14
Temperaturverlauf										
	ungünstig	-	18	24	29	45	57	28	84	8
	normal	100	52	62	51	49	43	56	15	56
	günstig	-	30	14	20	6	-	16	1	36
Sonnenscheindauer										
	zu gering	25	45	47	46	70	57	49	97	16
	genügend	75	52	53	50	29	43	49	3	68
	reichlich	-	3	-	4	1	-	2	-	16

2. Schätzung der Weinmosternte in hl je ha

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	September	Oktober	November	September	Oktober	November	September	Oktober	November
1954	.	52,6	52,6	.	54,0	54,0	.	58,9	58,9
1955	.	40,0	40,1	.	40,9	40,7	.	44,2	46,5
1956	.	14,7	15,6	.	16,9	17,9	.	5,8	6,2
1957	38,2	37,4	38,5	38,5	37,9	39,3	43,7	40,9	41,0
1958	63,9	75,8	81,1	64,5	76,6	81,4	68,8	82,1	88,8
1959	61,9	67,3	70,5	62,6	68,5	72,0	67,7	71,9	73,3
1960	82,0	107,4	115,8	82,3	107,5	116,0	88,2	121,4	127,1
1961	49,1	52,5	53,9	48,9	52,9	54,2	54,0	55,6	58,0
1962	57,3	59,5	58,5	57,5	60,1	58,7	61,2	62,2	63,8
1963	70,1	80,0	88,3	70,6	80,0	89,3	70,9	84,1	86,6
1964	89,6	101,5	104,7	89,7	101,9	105,3	94,9	108,1	110,0
1965	79,3	79,6	73,2	79,1	79,1	72,3	84,7	87,0	84,2
1966	71,9	66,9	69,5	72,1	66,9	70,1	71,8	68,5	67,5
1967	88,9	88,2	87,4	89,4	88,5	87,8	86,6	86,3	85,3
1968	76,0	77,7	80,5	75,1	76,3	78,6	80,8	84,8	90,5

### 3. Verkauf und Verkaufserlöse von Speisetrauben

Land	Weiß				Rot			
	Menge in dz		Durchschnittserlös je dz in DM		Menge in dz		Durchschnittserlös je dz in DM	
	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967
Rheinland-Pfalz	143	10	56	120	70	243	60	70
Baden-Württemberg	13	29	131	156	-	1	-	140
Insgesamt	156	39	62	147	70	244	60	70

### 5. Ergebnisse nach

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weinmost insgesamt				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
			1968	1967	1968	1967
			ha	hl	1 000 hl	
1	Rheingau u. Mainmündung	3 069	54,2	54,5	166	167
2	Mittelrhein mit Sieben- gebirge/Lahn	976	54,3	61,6	53	63
3	Ahr	531	74,6	74,4	40	40
4	Mosel, Saar, Ruwer	10 153	85,0	92,2	863	923
5	Nahe	4 197	58,4	80,4	245	339
6	Rheinhessen <sup>2)</sup>	15 733	79,1	92,8	1 244	1 446
7	Pfalz <sup>2)</sup>	17 694	92,1	100,0	1 630	1 741
8	Bergstraße <sup>3)</sup>	830	65,9	83,0	55	69
9	Südbaden u. Kraichgau	7 855	86,3	87,0	678	666
10	Württbg., Neckar und Nebenflüsse 4)	6 419	79,5	73,8	510	477
11	Franken (Main oberhalb Hanau) <sup>5)</sup>	2 757	60,3	52,0	166	140
12	Bundesgebiet	70 214	80,5	87,4	5 651	6 069

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Ohne Nahe.- 3) Hessische und nordbadische Bergstraße.- 4) Oberes und gegend, Tauber- und Maintal.

#### 4. Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamt- ernte	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1968	1967	1968	1967	1968	1967
	%	DM je hl					
Hessen	12	97	107	94	105	197	285
Rheinland-Pfalz	25	91	90	97	94	69	72
Baden-Württemberg	9	159	172	139	158	183	190
Bayern	12	153	183	153	183	139	167
Saarland	82	90	100	90	100	-	-
Insgesamt	21	99	102	101	102	91	103

#### Weinbaulandschaften

Weißmost					Rotmost <sup>1)</sup>					Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge		
1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	
ha	hl	1 000 hl	1 000 hl	ha	hl	1 000 hl	1 000 hl	ha	hl	
3 010	54,3	54,7	163	164	59	51,8	44,4	3	3	1
962	54,1	61,7	52	62	14	68,1	56,2	1	1	2
214	83,1	77,5	18	17	317	68,8	72,2	22	23	3
10 152	85,0	92,2	863	923	1	72,0	95,0	0	0	4
4 137	58,2	80,4	241	334	60	68,2	84,1	4	5	5
14 481	78,2	93,1	1 133	1 330	1 252	89,0	89,0	111	116	6
14 619	88,6	99,2	1 296	1 418	3 075	108,8	103,8	335	323	7
675	65,5	82,7	44	53	155	67,6	84,1	10	16	8
5 837	88,5	90,8	516	527	2 018	79,8	75,1	161	139	9
2 375	67,4	68,0	160	158	4 044	86,6	77,0	350	318	10
2 685	60,4	51,8	162	135	72	57,6	58,5	4	5	11
59 147	78,6	87,8	4 649	5 121	11 067	90,5	85,3	1 002	949	12

unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-, Pfalz-, Enz- und Alb- und Tauber-, Zabergäu.- 5) Unter-, Mittel- und Oberfranken, Tauber-

6. Ende der Lese (einschließlich Spätlese)

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Bundesgebiet 1964	2	9	38	31	14	4	1	1
1965	-	-	2	24	54	18	1	1
1966	0	4	34	45	15	2	0	0
1967	1	13	58	24	3	1	-	-
1968	1	9	53	32	5	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Hessen	-	12	40	48	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	2	14	55	23	6	-	-	-
Baden-Württemberg	-	3	50	43	4	-	-	-
Bayern	3	12	55	25	5	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Riesling</u>								
Bundesgebiet 1964	1	5	24	28	27	11	2	2
1965	-	-	2	12	46	33	4	3
1966	-	1	18	40	31	10	0	0
1967	0	6	39	35	16	4	0	-
1968	1	4	31	39	16	8	1	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	75	25	-	-	-
Hessen	3	-	19	56	22	-	-	-
Rheinland-Pfalz	0	7	26	30	23	13	1	-
Baden-Württemberg	-	-	40	53	6	1	-	-
Bayern	3	14	42	27	14	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Müller-Thurgau</u>								
Bundesgebiet 1964	7	19	53	15	4	2	0	0
1965	-	1	15	54	25	4	0	1
1966	3	12	63	18	3	1	0	-
1967	15	22	51	9	2	1	0	0
1968	20	45	26	7	2	0	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	25	75	-	-	-	-
Hessen	37	37	20	6	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	22	47	24	5	2	-	-	-
Baden-Württemberg	16	47	27	8	1	1	-	-
Bayern	19	43	30	6	2	-	-	-
Saarland	57	-	-	43	-	-	-	-
<u>Elbling</u>								
Rheinland-Pfalz	5	11	26	50	8	-	-	-
Saarland	-	-	57	43	-	-	-	-



## 6. Ende der Lese (einschließlich Spätlese)

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
<u>Ruländer</u>								
Hessen	-	100	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	57	38	4	1	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
<u>Gutedel</u>								
Baden-Württemberg	-	3	53	39	5	-	-	-
<u>Auxerrois</u>								
Baden-Württemberg	-	10	64	24	2	-	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
Rotes Gewächs								
<u>Portugieser</u>								
Bundesgebiet 1964	15	26	46	10	2	1	-	-
1965	-	2	20	49	26	3	0	0
1966	10	21	52	15	2	0	-	-
1967	22	22	46	10	0	0	-	-
1968	18	38	33	10	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	-	-	-	-
Hessen	33	-	17	33	17	-	-	-
Rheinland-Pfalz	34	44	20	2	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	34	47	18	1	-	-	-
Bayern	13	40	34	13	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Burgunder</u>								
Bundesgebiet 1964	7	5	53	27	6	2	-	-
1965	1	1	6	40	42	10	-	-
1966	1	6	52	34	5	2	-	-
1967	3	5	66	22	3	1	-	-
1968	2	10	48	35	5	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	-	-	-	-
Hessen	-	-	50	50	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	19	34	38	9	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	6	49	39	6	-	-	-
Bayern	-	33	45	22	-	-	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
<u>Trollinger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	32	58	9	1	-	-
<u>Schwarzriesling</u>								
Baden-Württemberg	-	20	52	25	3	-	-	-
<u>Limberger</u>								
Baden-Württemberg	-	4	35	55	6	-	-	-

7. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weinmost insgesamt							
	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
				%				
Nordrhein-Westfalen	24	47,9	1 150	1	2	65	30	2
	27	45,3	1 223	10	58	31	1	-
Hessen	3 290	55,0	180 786	1	8	46	36	9
	3 267	55,4	180 845	17	44	28	10	1
	221	65,2	14 417	-	1	72	27	0
	3 069	54,2	166 369	1	9	44	37	9
Rheinland-Pfalz	49 187	82,7	4 066 357	1	10	47	34	8
	48 675	93,4	4 544 235	10	37	42	10	1
Rheinland-Nassau	14 602	76,2	1 112 508	0	10	39	42	9
Mittelrhein	939	54,6	51 314	0	8	47	34	11
Nahe (Koblenz)	3 039	54,6	165 891	1	12	51	30	6
Obermosel	808	106,3	85 917	-	5	46	43	6
Saar	1 034	69,9	72 267	-	7	31	37	25
Ruwer	304	60,1	18 264	-	0	11	56	33
Mittelmosel	5 247	85,6	448 896	0	10	33	46	11
Untermosel	2 687	85,5	229 802	0	10	39	46	5
Ahr	531	74,6	39 589	-	10	64	23	3
Lahn	13	43,7	568	-	-	14	67	19
Rheinhessen	16 373	79,0	1 294 015	0	9	52	30	9
Worms u. Umgegend	4 907	79,4	389 655	1	6	47	32	14
Oppenheim u. Umgegend	1 380	85,8	118 412	-	12	31	40	17
Mainz u. Umgegend	1 046	81,6	85 310	-	12	60	27	1
Ingelheim u. Umgegend	1 370	82,8	113 480	0	8	63	24	5
Wiesbach	1 780	73,5	130 874	-	10	44	30	16
Bingen u. Umgegend	372	71,3	26 507	-	10	45	39	6
Nahe (Rheinhessen)	640	77,7	49 743	-	7	57	34	2
Alzey u. Umgegend	4 878	77,9	380 034	0	11	58	28	3
Pfalz	18 212	91,1	1 659 834	1	12	47	33	7
Mittelhaardt	5 700	91,9	523 947	1	11	39	36	13
Oberhaardt	9 900	90,5	895 497	1	12	51	31	5
Unterhaardt m. Zellertal	2 094	100,8	210 996	1	10	53	32	4
Nahe (Pfalz)	518	56,7	29 394	-	11	40	41	8
Baden-Württemberg	15 318	81,9	1 253 950	1	26	55	16	2
	15 165	80,8	1 225 261	21	57	20	2	0
Nordwürttemberg	6 327	79,9	505 728	1	25	58	15	1
Oberes Neckartal	46	46,8	2 154	-	2	77	16	5
Unteres Neckartal	3 563	80,6	287 177	1	28	57	14	0
Remstal	710	83,3	59 161	-	21	66	13	-
Enztal	540	87,1	47 042	-	11	63	23	3
Zabergäu	811	77,3	62 712	6	36	48	9	1
Kocher- u. Jagsttal	516	68,8	35 499	0	16	60	22	2
Tauber- u. Jagsttal	141	85,0	11 983	-	10	50	36	4

7. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weinmost insgesamt							
	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
				%				
	ha	hl						
Nordbaden	1 897	67,8	128 664	1	11	50	29	9
Tauber- u. Maintal	294	47,6	14 000	0	18	54	23	5
Neckar- u. Jagsttal	47	50,6	2 379	-	2	61	31	6
Bergstraße	609	66,2	40 304	0	14	43	30	13
Kraiohgau	803	76,2	61 167	3	7	56	29	5
Pfinz-, Enz- u. Alb tal	144	75,1	10 814	0	13	37	32	18
Südbaden	7 046	87,4	616 015	2	29	53	14	2
Seegegend	167	102,6	17 139	5	16	75	4	0
Oberes Rheintal	24	65,9	1 582	-	13	54	33	-
Markgräflerland	1 374	91,7	126 007	0	37	52	11	0
Kaiserstuhl	2 371	92,7	219 689	1	26	57	14	2
Breisgau	1 703	94,3	160 530	2	27	56	14	1
Ortenau u. Bühlergegend	1 407	64,7	91 068	6	32	38	19	5
Südwestfalen-Hohenzollern	48	73,8	3 543	4	45	39	10	2
Oberes Neckartal	37	78,5	2 906	6	46	34	12	2
Enztal	5	54,4	272	-	96	4	-	-
Bodenseegebiet	6	60,8	365	-	-	100	-	-
Bayern	2 322	60,4	140 228	1	18	47	29	5
1967	2 257	49,4	111 404	30	47	21	2	0
RB Unterfranken	2 084	60,4	125 893	1	18	48	28	5
RB Mittelfranken	234	60,2	14 097	6	14	43	36	1
Übrige Gebiete	4	59,5	238	-	15	35	50	-
Saarland	73	112,4	8 215	-	-	22	78	-
1967	69	92,5	6 394	1	27	60	12	-
Bundesgebiet	70 214	80,5	5 650 686	0	14	49	30	7
Oktober 1968	70 214	77,7	5 453 902	0	11	44	36	9
November 1967	69 460	87,4	6 069 362	13	41	37	8	1
D 1962/67	68 592	80,3	5 510 267	14	40	33	11	2
1955	59 996	40,1	2 408 102	3	27	49	19	2
1956	59 729	15,6	930 228	1	17	43	30	9
1957	58 784	38,5	2 264 128	6	37	46	10	1
1958	59 177	81,1	4 799 854	12	43	36	8	1
1959	60 995	70,5	4 302 661	68	27	4	1	-
1960	64 180	115,8	7 433 246	6	35	45	12	2
1961	66 265	53,9	3 574 479	13	46	34	7	0
1962	67 137	58,5	3 927 919	14	46	30	9	1
1963	68 654	88,3	6 034 147	8	36	41	13	2
1964	68 623	104,7	7 185 349	23	49	24	4	0
1965	68 816	73,2	5 035 473	1	14	44	32	9
1966	69 166	69,5	4 809 358	21	52	24	3	0

## 7. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost							
	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
				%				
	ha	hl						
Nordrhein-Westfalen	22	45,0	990	1	2	65	29	3
	25	46,7	1 168	11	60	29	-	-
Hessen	3 230	55,0	177 661	1	8	46	36	9
	3 205	55,6	178 060	17	44	28	10	1
	220	65,2	14 347	-	1	72	27	0
	3 010	54,3	163 314	1	9	44	37	9
Rheinland-Pfalz	44 470	80,8	3 593 621	0	11	46	34	9
	43 868	92,9	4 076 507	10	37	42	10	1
Rheinland-Nassau	14 252	76,4	1 088 895	0	10	39	42	9
Mittelrhein	928	54,5	50 558	0	8	47	34	11
Nahe (Koblenz)	3 019	54,6	164 937	1	12	51	30	6
Obermosel	808	106,3	85 917	-	5	46	43	6
Saar	1 034	69,9	72 267	-	7	31	37	25
Ruwer	304	60,1	18 264	-	0	11	56	33
Mittelmosel	5 246	85,6	448 842	0	10	33	46	11
Untermosel	2 687	85,5	229 802	0	10	39	46	5
Ahr	214	83,1	17 778	-	9	66	18	7
Lahn	12	44,2	530	-	-	10	70	20
Rheinhessen	15 085	78,2	1 179 603	0	10	51	30	9
Worms u. Umgegend	4 503	77,9	350 870	1	7	47	31	14
Oppenheim u. Umgegend	1 373	85,8	117 833	-	12	31	40	17
Mainz u. Umgegend	950	81,4	77 284	-	13	60	26	1
Ingelheim u. Umgegend	1 024	82,4	84 384	0	7	61	27	5
Wiesbach	1 634	72,2	117 944	-	11	44	29	16
Bingen u. Umgegend	349	71,2	24 845	-	11	43	40	6
Nahe (Rheinhessen)	604	77,5	46 815	-	7	57	34	2
Alzey u. Umgegend	4 648	77,4	359 628	0	11	58	28	3
Pfalz	15 133	87,6	1 325 123	1	12	48	31	8
Mittelhaardt	4 092	87,4	357 567	1	12	36	35	16
Oberhaardt	9 163	88,9	814 622	1	13	53	28	5
Unterhaardt m. Zellertal	1 364	90,7	123 749	1	12	50	32	5
Nahe (Pfalz)	514	56,8	29 185	-	11	40	41	8
Baden-Württemberg	9 062	80,6	729 954	1	25	55	17	2
	8 941	83,7	748 420	21	56	21	2	0
Nordwürttemberg	2 383	68,0	162 002	0	20	61	18	1
Oberes Neckartal	40	45,1	1 804	-	2	87	11	-
Unteres Neckartal	1 255	67,5	84 650	1	23	60	16	0
Remstal	328	74,2	24 338	-	17	73	10	-
Enztal	77	74,0	5 695	-	9	74	14	3
Zabergäu	235	67,7	15 906	1	33	47	17	2
Kocher- u. Jagsttal	327	58,9	19 250	-	8	60	30	2
Taubergergend	121	85,6	10 359	-	11	53	32	4

7. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost							
	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
				%				
	ha	hl						
Nordbaden	1 396	67,7	94 460	1	11	52	30	6
Tauber- u. Maintal	274	48,2	13 212	0	19	55	22	4
Neckar- u. Jagsttal	28	49,9	1 396	-	4	66	21	9
Bergstraße	455	65,7	29 896	0	15	46	32	7
Kraichgau	563	77,5	43 646	1	7	57	31	4
Pfinz-, Enz- u. Alb tal	76	83,0	6 310	0	9	43	29	19
Südbaden	5 270	89,7	472 591	1	30	52	15	2
Seegegend	56	104,1	5 828	9	13	70	7	1
Oberes Rheintal	6	94,8	569	-	-	86	14	-
Markgräflerland	1 294	92,7	120 016	0	36	52	11	1
Kaiserstuhl	1 723	94,5	162 759	1	26	56	15	2
Breisgau	1 205	97,3	117 248	1	29	54	15	1
Ortenau u. Bühlergegend	986	67,1	66 171	6	32	37	20	5
Südwestfalen-Hohenzollern	13	69,3	901	1	24	56	17	2
Oberes Neckartal	9	72,9	656	1	34	40	23	2
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodenseegebiet	4	61,3	245	-	-	100	-	-
Bayern	2 290	60,5	138 493	1	18	47	29	5
1967	2 227	49,5	110 189	30	47	21	2	0
RB Unterfranken	2 052	60,5	124 158	1	18	48	28	5
RB Mittelfranken	234	60,2	14 097	6	14	43	36	1
Übrige Gebiete	4	59,5	238	-	15	35	50	-
Saarland	73	112,3	8 197	-	-	22	78	-
1967	69	92,4	6 373	1	27	60	12	-
Bundesgebiet	59 147	78,6	4 648 916	0	13	48	31	8
Oktober 1968	59 147	76,3	4 515 412	0	10	44	37	9
November 1967	58 335	87,8	5 120 717	12	40	38	9	1
D 1962/67	57 187	80,6	4 611 870	14	40	33	11	2
1955	47 118	40,7	1 918 590	3	27	49	19	2
1956	47 156	17,9	842 945	1	15	44	31	9
1957	47 058	39,3	1 849 371	6	37	46	10	1
1958	47 660	81,4	3 878 922	13	40	37	9	1
1959	49 478	72,0	3 562 671	68	27	4	1	-
1960	52 786	116,0	6 120 632	6	33	46	13	2
1961	54 574	54,2	2 958 128	13	46	34	6	1
1962	55 466	58,7	3 253 506	14	45	30	9	2
1963	56 763	89,3	5 069 559	8	35	41	13	3
1964	57 062	105,3	6 006 052	23	49	24	4	0
1965	57 576	72,3	4 160 536	1	12	45	33	9
1966	57 918	70,1	4 060 845	21	53	23	3	0

## 7. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Rotmost 1)							
	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge hl	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
				%				
Nordrhein-Westfalen	2	80,0	160	-	-	63	37	-
1967	2	27,5	55	-	-	73	27	-
Hessen	60	52,1	3 125	-	5	51	27	17
1967	62	44,9	2 785	27	53	12	8	-
Hess. Bergstraße	1	70,0	70	-	-	80	20	-
Rheingau	59	51,8	3 055	-	5	50	27	18
Rheinland-Pfalz	4 717	100,2	472 736	0	7	50	38	5
1967	4 807	97,3	467 728	6	38	47	8	1
Rheinland-Nassau	350	67,5	23 613	-	10	61	28	1
Mittelrhein	11	68,7	756	-	2	47	34	17
Nahe (Koblenz)	20	47,7	954	-	10	62	28	-
Obermosel	0	.	.	.	.	.	.	.
Saar	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruwer	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelmosel	1	54,3	54	-	10	50	35	5
Untermosel	0	.	.	.	.	.	.	.
Ahr	317	68,8	21 811	-	10	62	28	-
Lahn	1	38,0	38	-	-	80	20	-
Rheinhessen	1 288	88,8	114 412	0	4	59	30	7
Worms u. Umgegend	404	96,0	38 785	-	0	51	37	12
Oppenheim u. Umgegend	7	82,7	579	-	-	20	80	-
Mainz u. Umgegend	96	83,6	8 026	-	6	62	30	2
Ingelheim u. Umgegend	346	84,1	29 096	0	10	69	16	5
Wiesbach	146	88,6	12 930	-	4	49	35	12
Bingen u. Umgegend	23	72,3	1 662	-	-	83	17	-
Nahe (Rheinhessen)	36	81,3	2 928	-	4	60	34	2
Alzey u. Umgegend	230	88,7	20 406	-	2	67	30	1
Pfalz	3 079	108,7	334 711	0	9	45	41	5
Mittelhaardt	1 608	103,5	166 380	-	9	47	37	7
Oberhaardt	737	109,7	80 875	2	8	31	58	1
Unterhaardt m. Zellertal	730	119,5	87 247	-	8	56	33	3
Nahe (Pfalz)	4	52,3	209	-	-	20	80	-
Baden-Württemberg	6 256	83,8	523 996	2	27	55	14	2
1967	6 224	76,6	476 841	20	58	21	1	0
Nordwürttemberg	3 944	87,2	343 726	2	28	56	13	1
Oberes Neckartal	6	58,3	350	-	-	22	46	32
Unteres Neckartal	2 308	87,8	202 527	1	31	56	12	0
Remstal	382	91,2	34 823	-	23	62	15	-
Enztal	463	89,3	41 347	-	11	61	25	3
Zabergäu	576	81,3	46 806	8	37	49	6	0
Kocher- u. Jagsttal	189	86,0	16 249	1	26	59	13	1
Taubergengegend	20	81,2	1 624	-	4	30	60	6

1) Einschl. Most aus gem. Beständen.

## 7. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Rotmost 1)							
	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
	ha	hl		%				
Nordbaden	501	68,3	34 204	3	9	44	27	17
Tauber- u. Maintal	20	39,4	788	-	4	28	43	25
Neckar- u. Jagsttal	19	51,7	983	-	1	55	44	-
Bergstraße	154	67,6	10 408	0	10	35	23	32
Kraichgau	240	73,0	17 521	6	6	54	25	9
Pfinz-, Enz- u. Albthal	68	66,2	4 504	-	17	28	37	18
Südbaden	1 776	80,8	143 424	3	27	56	12	2
Seegegend	111	101,9	11 311	3	17	77	3	-
Oberes Rheintal	18	56,3	1 013	-	21	35	44	-
Markgräflerland	80	74,9	5 991	5	50	40	5	-
Kaiserstuhl	648	87,9	56 930	3	26	57	12	2
Breisgau	498	86,9	43 282	3	23	60	12	2
Ortenau u. Bühlergegend	421	59,1	24 897	5	34	41	17	3
Südwürttemberg-Hohenzollern	35	75,5	2 642	6	52	33	7	2
Oberes Neckartal	28	80,4	2 250	7	49	33	9	2
Enztal	5	54,4	272	-	96	4	-	-
Bodenseegebiet	2	60,0	120	-	-	100	-	-
Bayern	32	54,2	1 735	0	23	40	24	13
1967	30	40,5	1 215	22	48	30	0	-
RB Unterfranken	32	54,2	1 735	0	23	40	24	13
RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	0	130,8	18	-	-	100	-	-
1967	0	150,0	21	-	100	-	-	-
Bundesgebiet	11 067	90,5	1 001 770	1	18	53	25	3
Oktober 1968	11 067	84,8	938 490	1	18	44	29	8
November 1967	11 125	85,3	948 645	13	48	34	5	0
D 1962/67	11 406	78,8	898 398	15	44	32	8	1
1955	12 878	38,0	489 512	2	28	48	19	3
1956	12 573	6,9	87 283	2	43	42	11	2
1957	11 726	35,4	414 757	7	41	43	8	1
1958	11 516	80,0	920 927	10	44	36	9	1
1959	11 516	64,3	739 960	61	29	9	1	-
1960	11 394	115,2	1 312 614	5	35	45	13	2
1961	11 691	52,7	616 351	12	43	37	7	1
1962	11 671	57,8	674 413	12	48	36	4	-
1963	11 591	83,2	964 588	12	42	37	8	1
1964	11 561	102,0	1 179 297	23	46	28	3	0
1965	11 240	77,8	874 937	1	16	44	32	7
1966	11 248	66,5	748 513	22	53	24	1	0

1) Einschl. Most aus gem. Beständen.

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weiß						
		Mostgewicht nach Oechsle					Säure	
		Anteil des Mostertrages					Ø	Ø
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Most- gewicht	Säure- gehalt
		%					Grad	‰
1	Nordrhein-Westfalen	61	15	7	10	7	64	12,0
2	1967	7	22	30	32	9	76	9,6
3	Hessen	35	53	11	1	-	65	14,5
4	1967	1	20	44	27	8	75	11,5
5	Hess. Bergstr.	43	51	6	-	-	62	12,5
6	Rheingau	35	53	11	1	-	65	14,6
7	Rheinland-Pfalz	52	38	8	2	0	61	13,0
8	1967	8	33	36	17	6	74	11,0
9	Rheinland-Nassau	64	29	6	1	0	59	14,5
10	Mittelrhein	58	35	6	1	-	60	14,1
11	Nahe (Koblenz)	55	35	7	3	0	61	13,3
12	Obermosel	97	3	-	-	-	55	15,5
13	Saar	72	26	2	-	-	58	15,2
14	Ruwer	89	11	0	-	-	56	15,1
15	Mittelmosel	65	28	7	0	0	59	14,7
16	Untermosel	57	35	7	1	-	60	14,7
17	Ahr	24	58	18	-	-	64	13,1
18	Lahn	100	-	-	-	-	61	14,9
19	Rheinhessen	43	47	9	1	0	62	11,8
20	Worms und Umgegend	38	51	10	1	0	63	11,8
21	Oppenheim und Umgegend	35	37	20	8	-	65	11,6
22	Mainz und Umgegend	33	57	10	-	-	63	12,2
23	Ingelheim und Umgegend	53	43	4	0	-	60	12,5
24	Wiesbach	47	51	2	0	-	61	12,0
25	Bingen und Umgegend	53	36	9	2	-	61	11,5
26	Nahe (Rheinhessen)	58	37	5	-	-	60	12,5
27	Alzey und Umgegend	47	45	7	1	0	61	12,5
28	Pfalz	51	38	8	3	0	62	12,5
29	Mittelhaardt	47	40	10	2	1	62	12,9
30	Oberhaardt	54	36	7	3	0	61	12,4
31	Unterhaardt mit Zellertal	37	48	9	5	1	64	12,4
32	Nahe (Pfalz)	59	37	4	-	-	60	12,3



der Weinmosternte 1968

most		Rotmost										Lfd. Nr.
gehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt				
Anteil des Mostertrages							Z Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10‰	10‰ und mehr		
%		%					Grad	‰	%			
32	68	60	40	-	-	-	59	11,0	18	82	1	
69	31	6	16	78	-	-	78	12,9	-	100	2	
6	94	37	9	52	2	-	68	13,8	11	89	3	
28	72	2	11	51	17	19	80	10,3	34	66	4	
5	95	-	100	-	-	-	68	12,0	-	-	5	
6	94	38	6	54	2	-	68	13,8	11	89	6	
12	88	71	25	4	0	-	59	12,3	8	92	7	
42	58	7	48	36	8	1	70	9,1	69	31	8	
5	95	21	51	28	0	-	66	12,0	22	78	9	
4	96	63	34	3	0	-	59	12,4	0	100	10	
15	85	48	45	7	-	-	61	13,2	36	64	11	
1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
2	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
4	96	50	45	5	-	-	59	13,4	5	95	15	
1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
24	76	18	52	30	-	-	66	11,9	22	78	17	
-	100	-	100	-	-	-	68	12,5	-	100	18	
19	81	76	23	1	0	-	58	12,0	15	85	19	
26	74	80	20	0	-	-	57	11,9	16	84	20	
20	80	80	20	-	-	-	57	12,0	-	100	21	
16	84	87	13	-	-	-	56	11,6	11	89	22	
11	89	66	29	4	1	-	59	12,1	8	92	23	
18	82	70	29	1	-	-	58	13,2	13	87	24	
8	92	87	13	-	-	-	58	10,5	15	85	25	
7	93	88	12	-	-	-	56	11,2	8	92	26	
18	82	78	21	1	-	-	57	11,9	25	75	27	
11	89	73	24	3	0	-	58	12,5	5	95	28	
8	92	76	23	1	0	-	58	12,6	4	96	29	
12	88	81	15	4	-	-	57	11,6	9	91	30	
9	91	60	35	4	1	-	60	13,0	5	95	31	
20	80	83	17	-	-	-	57	14,0	-	100	32	

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Mostgewicht nach Oechsle						Weiß
		Anteil des Mostertrages					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
		%					Grad	‰
33	Baden-Württemberg	14	58	27	1	-	65	10,6
34	1967	-	6	54	36	4	80	9,0
35	Nordwürttemberg	22	70	7	1	-	62	12,0
36	Oberes Neckartal	29	71	-	-	-	60	11,7
37	Unteres Neckartal	16	74	9	1	-	62	12,5
38	Remstal	7	79	14	-	-	63	11,7
39	Enztal	29	71	-	-	-	60	11,8
40	Zabergäu	30	70	-	-	-	60	12,1
41	Kocher- und Jagsttal	18	68	14	-	-	62	11,2
42	Tauber- und Jagsttal	71	29	-	-	-	57	10,7
43	Nordbaden	20	67	12	1	-	63	11,1
44	Tauber- und Maintal	-	75	20	5	-	66	10,1
45	Neckar- und Jagsttal	40	40	20	-	-	64	11,9
46	Bergstraße	11	78	11	-	-	62	10,7
47	Kraichgau	32	65	3	-	-	62	11,5
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	25	58	17	-	-	63	11,7
49	Südbaden	2	40	56	2	-	67	10,0
50	See- und Oberrhein- gegend	-	33	67	-	-	69	9,4
51	Oberes Rheintal	100	-	-	-	-	58	-
52	Markgräflerland	-	39	59	2	-	67	10,4
53	Kaiserstuhl	-	21	79	-	-	67	9,9
54	Breisgau	4	42	50	4	-	68	9,5
55	Ortenau und Bühler- gegend	-	47	53	-	-	68	10,3
56	Südwestfalen-Hoch- sauerland	13	62	25	-	-	65	10,9
57	Oberes Neckartal	17	66	17	-	-	62	11,3
58	Enztal	-	-	-	-	-	-	-
59	Bodenseegebiet	-	50	50	-	-	73	9,8
60	Bayern	30	49	16	4	1	65	10,8
61	1967	0	6	37	36	21	81	8,3
62	Unterfranken	32	50	15	3	0	65	10,7
63	Mittelfranken	17	36	25	19	3	69	11,9
64	Übrige Gebiete	38	62	-	-	-	57	11,0
65	Saarland	77	23	-	-	-	48	16,0
66	1967	19	67	12	2	-	63	15,0
67	Bundesgebiet	45	42	11	2	0	62	12,6
68	1967	6	28	39	21	6	75	10,7
69	D 1962/1967	13	27	34	21	5	72	10,2
70	1956 <sup>1)</sup>	41	44	14	1	-	62	13,6
71	1957 <sup>1)</sup>	11	47	32	9	1	69	13,0
72	1958	13	41	35	9	2	69	11,2
73	1959	0	2	7	31	60	92	7,4
74	1960	14	47	30	8	1	68	9,8
75	1961	5	24	47	21	3	73	9,3
76	1962	11	18	37	29	5	74	10,8
77	1963	13	37	36	12	2	69	10,5
78	1964	2	17	42	30	9	78	7,1
79	1965	45	43	11	1	0	61	13,7
80	1966	2	18	43	31	6	77	8,6

1) Ohne Saarland - 2) Ohne Hessen

most		Rotmost									Lfd. Nr.
gehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt			
Anteil des Mostertrages						Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°			90° und mehr	unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	
%		%						Grad	‰	%	
26	74	15	49	29	6	1	65	11,6	13	87	33
66	34	0	7	52	32	9	78	9,8	60	40	34
15	85	15	80	5	-	-	62	11,7	11	89	35
-	100	-	100	-	-	-	64	11,5	-	100	36
12	88	7	84	9	-	-	63	11,7	10	90	37
17	83	8	92	-	-	-	63	12,1	2	98	38
7	93	9	91	-	-	-	61	11,8	-	100	39
16	84	30	70	-	-	-	59	11,2	19	81	40
27	73	24	70	6	-	-	64	11,5	28	72	41
37	63	67	16	17	-	-	54	12,0	2	98	42
35	65	44	49	6	1	-	59	12,5	18	82	43
42	58	36	55	-	9	-	63	11,2	40	60	44
29	71	50	25	25	-	-	61	11,9	3	97	45
23	77	35	53	12	-	-	58	12,9	18	82	46
33	67	52	48	-	-	-	59	11,7	3	97	47
20	80	45	46	9	-	-	60	14,8	7	93	48
36	64	2	12	69	15	2	74	11,0	16	84	49
57	43	-	17	83	-	-	73	12,0	-	100	50
.	.	-	50	50	-	-	68	14,0	-	100	51
30	70	3	3	68	20	6	77	11,2	8	92	52
55	45	-	22	71	7	-	74	11,8	8	92	53
34	66	3	10	69	18	-	74	10,2	14	86	54
35	65	2	16	68	14	-	75	10,0	32	68	55
36	64	-	70	30	-	-	66	11,4	-	100	56
24	76	-	83	17	-	-	65	11,1	-	100	57
-	-	-	50	50	-	-	73	13,1	-	100	58
60	40	-	50	50	-	-	66	13,5	-	100	59
23	77	23	37	26	10	4	67	11,4	20	80	60
67	33	-	12	31	36	21	81	10,1	56	44	61
25	75	23	37	26	10	4	67	11,4	20	80	62
11	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
15	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	100	-	100	-	-	-	60	7,0	100	-	65
-	100	-	-	100	-	-	72	8,0	100	-	66
14	86	41	38	17	3	1	62	11,9	11	89	67
45	55	4	27	44	20	5	74	9,4	64	36	68
56	44	10	30	40	16	4	72	9,2	69	31	69
.	.	9	59	28	4	0	66	11,2	.	.	70
.	.	10	54	30	6	0	68	12,3	.	.	71
.	.	13	48	26	11	2	68	9,7	.	.	72
.	.	.	5	24	45	26	85	6,6	.	.	73
2)	2)	16	49	25	9	1	66	9,3	2)	2)	74
64	32	6	41	39	11	3	70	7,8	93	7	75
48	52	5	37	36	17	5	72	9,5	74	26	76
56	44	5	32	42	18	3	72	9,0	82	18	77
94	6	2	26	44	17	11	75	6,2	98	2	78
17	83	43	40	15	2	0	61	12,6	12	88	79
79	21	1	20	53	24	2	75	8,3	86	14	80

9. Mosterträge und Mostausbeute wichtiger Rebsorten \*)

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	hl/ha	l/50 kg	hl/ha	l/50 kg	hl/ha	l/50 kg	hl/ha	l/50 kg	hl/ha	l/50 kg
Nordrhein-Westfalen	30,0	32,0	43,6	28,0	52,5	31,0	60,0	30,0	100,0	35,0
	60,0	35,0	49,1	32,0	40,1	30,0	25,0	25,0	30,0	30,0
Hessen	52,3	38,0	54,7	35,0	58,7	38,0	60,0	39,0	50,2	41,0
	56,5	39,0	54,5	38,0	64,0	40,0	72,0	36,0	39,3	35,0
	68,6	39,0	60,3	36,0	72,3	39,0	-	-	-	-
	48,0	38,0	54,3	35,0	57,0	37,0	60,0	39,0	50,2	41,0
Rheinland-Pfalz	79,4	39,0	74,4	35,0	86,9	38,0	102,6	40,0	61,0	33,0
	96,7	39,0	84,4	37,0	97,6	39,0	98,8	40,0	70,9	36,0
Rheinland-Nassau	50,8	37,0	74,4	35,0	85,9	38,0	76,1	40,0	55,8	30,0
Mittelrhein	53,9	37,0	53,6	34,0	62,4	38,0	76,7	39,0	53,1	33,0
Nahe (Koblenz)	50,3	37,0	53,9	35,0	62,0	38,0	46,4	39,0	48,0	32,0
Obermosel	74,2	38,0	73,5	36,0	75,1	33,0	-	-	-	-
Saar	.	.	68,0	35,0	84,2	38,0	-	-	-	-
Ruwer	.	.	59,2	35,0	79,8	39,0	-	-	-	-
Mittelmosel	92,6	40,0	82,3	35,0	113,9	39,0	.	.	.	.
Untermosel	.	.	78,3	37,0	112,2	39,0	-	-	.	.
Ahr	.	.	79,6	30,0	89,2	35,0	78,2	40,0	55,9	30,0
Lahn	.	.	50,0	40,0	40,0	35,0	.	.	38,0	35,0
Rheinhessen	78,4	38,0	61,5	35,0	80,7	38,0	89,9	40,0	65,1	39,0
Worms u. Umgegend	78,3	38,0	55,8	35,0	82,1	38,0	96,6	41,0	63,7	38,0
Oppenheim u. Umgegend	93,5	40,0	62,5	35,0	84,4	38,0	90,0	40,0	75,1	39,0
Mainz u. Umgegend	80,6	39,0	71,1	35,0	83,9	39,0	83,8	40,0	.	.
Ingelheim u. Umgegend	82,7	40,0	67,8	37,0	84,1	40,0	86,2	41,0	62,8	39,0
Wiesbaach	71,1	37,0	70,8	35,0	74,5	37,0	89,0	38,0	70,0	36,0
Bingen u. Umgegend	72,0	39,0	66,0	36,0	72,0	38,0	73,0	42,0	64,5	37,0
Nahe (Rheinhessen)	77,5	39,0	58,5	37,0	80,3	39,0	81,6	41,0	71,8	36,0
Alzey u. Umgegend	76,0	38,0	64,7	36,0	79,5	38,0	89,3	40,0	72,0	40,0
Pfalz	85,4	39,0	79,4	36,0	96,5	38,0	109,5	40,0	71,4	35,0
Mittelhaardt	86,0	39,0	87,8	36,0	92,2	38,0	103,8	40,0	67,9	33,0
Oberhaardt	86,2	39,0	69,0	36,0	98,2	38,0	111,8	40,0	74,4	36,0
Unterhaardt m. Zellertal	92,3	37,0	72,7	35,0	97,5	38,0	120,1	41,0	65,6	36,0
Nahe (Pfalz)	52,5	38,0	61,4	35,0	62,0	40,0	52,6	40,0	51,8	35,0
Baden-Württemberg	82,6	36,5	64,0	35,6	89,1	37,8	91,8	38,2	80,7	37,4
	85,9	36,5	70,4	36,1	99,8	37,8	83,5	37,0	74,5	37,3
Nordwürttemberg	71,6	38,7	66,7	37,4	66,0	38,9	92,3	39,4	86,9	38,6
	45,1	37,1	.	.	45,2	37,5	59,4	.	-	-
Oberes Neckartal	71,0	38,4	67,3	37,7	64,8	39,7	88,2	39,1	87,7	38,6
Unteres Neckartal	78,1	39,9	68,9	38,2	77,6	39,6	80,5	39,7	.	.
Remstal	84,9	38,1	65,1	37,2	78,1	38,3	102,8	39,5	76,8	38,9
Enztal	89,4	37,7	65,2	36,8	52,7	37,9	93,9	39,8	72,5	39,1
Zabergäu	63,0	38,8	60,0	35,4	41,3	38,2	91,9	40,0	99,3	37,9
Kocher- und Jagsttal	85,8	41,2	71,5	39,0	86,9	40,9	129,5	38,0	.	.
Taubergergend	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

\*) Mostertrag hl je ha; Mostausbeute Liter Most je 50 kg Trauben.

9. Mosterträge und Mostausbeute wichtiger Rebsorten \*)

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg
Nordbaden	63,6	36,6	54,4	34,5	74,0	36,4	88,9	37,0	60,5	35,7
Tauber- u. Maintal	45,5	36,1	26,1	34,3	45,9	36,3	54,3	38,5	.	.
Neckar- u. Jagsttal	43,8	40,0	58,2	37,5	52,6	38,0	42,9	39,0	40,2	36,3
Bergstraße	78,6	34,3	43,3	32,1	73,1	34,1	64,0	33,2	65,5	35,1
Kraichgau	71,5	35,9	62,0	35,4	92,2	36,7	109,9	37,7	58,0	36,5
Pfinz-, Enz- u. Albthal	82,8	36,6	65,9	33,4	85,6	37,1	110,8	36,4	79,8	34,7
Südbaden	109,9	35,8	60,3	35,4	100,4	37,2	84,7	35,3	81,0	36,1
Seegegend	70,0	.	80,0	38,0	110,3	36,9	95,0	.	102,1	36,9
Oberes Rheintal	80,0	.	-	-	97,0	.	-	-	56,3	35,0
Markgräflerland	92,8	35,9	56,4	34,4	97,8	36,5	80,0	32,0	74,8	35,5
Kaiserstuhl	115,5	36,5	58,7	37,0	100,1	37,9	.	.	88,0	36,1
Breisgau	91,3	35,4	62,7	32,8	106,8	37,9	.	.	87,4	36,5
Ortenau u. Bühlergegend	77,1	35,4	60,6	34,6	88,5	36,9	80,8	38,5	59,0	36,3
Südwestfalen-Hohenzollern	65,4	35,0	68,2	35,0	83,9	38,8	87,3	41,0	64,6	39,0
Oberes Neckartal	65,4	35,0	68,2	35,0	84,4	38,8	87,3	41,0	69,2	39,0
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodenseegebiet	-	-	-	-	83,0	.	-	-	60,0	.
Bayern	60,4	35,0	54,2	33,0	64,2	36,0	62,5	36,0	42,5	30,0
1967	40,0	41,2	42,1	37,6	45,2	41,8	40,1	44,0	32,8	35,5
Unterfranken	60,9	35,0	53,8	33,0	63,6	36,0	62,5	36,0	42,5	30,0
Mittelfranken	57,4	35,0	70,0	37,0	73,8	37,0	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	58,0	33,0	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	98,8	40,0	-	-	130,8	40,0
1967	100,0	40,0	100,0	40,0	101,7	40,0	-	-	150,0	40,0
Bundesgebiet	78,0	38,5	70,7	35,1	85,5	37,9	100,6	39,7	77,6	36,9
1967	91,7	39,0	78,9	37,0	94,6	39,0	96,0	39,5	73,0	37,1
1960	121,2	.	99,4	.	130,5	.	148,8	.	93,4	.
1961	49,2	36,8	56,9	35,9	60,5	37,9	70,4	39,9	32,1	33,8
1962	50,0	37,1	58,9	35,1	68,9	37,6	78,7	38,8	32,0	35,9
1963	98,8	38,8	66,1	37,2	100,6	33,9	96,7	41,0	44,3	36,9
1964	105,2	40,0	97,8	38,0	117,9	41,0	124,1	40,0	76,8	37,0
1965	73,7	33,9	61,4	32,4	80,6	34,9	95,3	37,5	60,4	34,6
1966	60,4	37,0	82,1	37,9	64,8	36,5	73,8	38,8	60,8	37,0

\*) Mostertrag hl je ha; Mostausbeute Liter Most je 50 kg Trauben.

## 9. Mosterträge u. Mostausbeute wichtiger Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet		Gutedel		Ruländer		Trollinger		Schwarz- riesling		Limberger	
		hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg	hl/ha	1/50 kg
Baden-Württemberg	1967	97,8	36,0	69,1	35,8	99,0	38,9	69,9	35,0	48,4	37,3
		87,4	36,4	70,7	36,1	83,0	39,0	69,1	36,1	61,5	37,8
Nordwürttemberg		60,9	36,0	63,7	38,3	99,0	40,3	72,9	38,2	48,9	36,5
Oberes Neckartal		.	.	-	-	90,7	.	-	-	-	-
Unteres Neckartal		.	.	64,4	38,6	98,3	40,6	74,3	38,9	55,7	34,2
Remstal		.	.	.	.	93,7	41,8	.	.	.	.
Enztal		57,1	38,0	68,7	37,5	116,8	38,7	61,3	37,9	40,7	37,2
Zabergäu		.	.	41,5	37,0	95,6	40,3	67,1	36,5	44,0	37,1
Kocher- und Jagsttal		26,0	30,0	.	.	106,2	40,3	54,0	37,5	48,4	37,5
Tauber- und Jagsttal		102,1	40,0	90,0	40,0	-	-	76,4	40,3	-	-
Nordbaden		72,0	35,7	62,0	34,2	84,9	36,4	51,0	34,5	37,4	35,3
Tauber- und Maintal		73,1	37,7	56,1	33,7	.	.	61,2	.	34,9	.
Neckar- und Jagsttal		47,1	39,0	47,7	32,0	81,4	43,8	48,5	33,5	53,6	37,5
Bergstraße		.	.	51,7	34,2	.	.	60,0	.	70,0	35,0
Kraichgau		103,3	30,0	63,6	36,4	94,9	35,3	72,0	36,0	34,6	33,8
Pfinz-, Enz- und Alb- und Taubertal		56,6	36,0	82,7	34,9	70,0	30,0	42,9	34,0	66,7	35,0
Südbaden		98,6	37,1	70,4	35,8	.	.	76,6	35,0	-	-
Seegegend		100,0	38,0	95,0	36,9	-	-	88,2	.	-	-
Oberes Rheintal		-	-	70,3	.	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland		96,2	36,7	63,5	34,8	.	.	-	-	-	-
Kaiserstuhl		.	.	75,6	35,2	-	-	.	.	-	-
Breisgau		104,0	36,7	71,2	35,9	-	-	76,4	35,0	-	-
Ortenau u. Bülhler- und Oberrhein- und Elz- und Glan- und Kyllburg- und Mosel- und Saar- und Rheingau- und Rheingebiet		112,4	37,0	55,3	36,1	.	.	.	.	-	-
Südwestfalen-Lippe		75,0	35,0	48,4	35,0	53,3	40,0	60,2	32,3	58,4	40,0
Oberes Neckartal		80,0	35,0	62,5	35,0	53,3	40,0	65,3	37,0	58,4	40,0
Enztal		-	-	-	-	-	-	55,2	27,5	-	-
Bodenseegebiet		70,0	.	40,0	.	-	-	-	-	-	-

\* ) Mostertrag hl je ja; Mostausbeute Liter Most je 50 kg Trauben.