

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung**

**September 1969**



Bestellnummer : 210230 - 690005

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben . . . . .	4
2. Güte der Trauben im September . . . . .	5
3. Vorschätzung der Weinmosternte September 1969 . . .	7
4. Witterungseinflüsse und Weinmosternten 1964-1969 .	9

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht wird

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Oktober 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 25. August bis zum 24. September wurde die Witterung für die diesjährige Weinmosternte als recht günstig beurteilt. Diese Bewertung liegt zwar geringfügig unter der des Vormonats, übertrifft aber die Beurteilung aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres recht deutlich.

Der Witterungsverlauf schlägt sich in den Noten über die Güte der Trauben nieder, die im Bundesdurchschnitt für weiße Sorten mit 2,4 und für rote Sorten mit 2,2 nahe bei gut liegen. Die Noten entsprechen etwa denen der Jahre 1958 und 1963.

Die erste Vorausschätzung der Hektarerträge - 81,7 hl je ha Weißmost und 77,8 hl je ha Rotmost - läßt insgesamt eine normale bis leicht über dem Durchschnitt der Jahre 1963/68 liegende Weinmosternte erwarten. Sie wird von den Berichterstatern auf ca 5,8 Mill. hl Weinmost geschätzt. Von der diesjährigen Erntemenge werden voraussichtlich 5,0 Mill. hl auf Weißmost und 0,8 Mill. hl auf Rotmost entfallen. Damit werden die Ernteaussichten gegenüber dem gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres für Weißmost erheblich günstiger und für Rotmost weniger gut eingeschätzt.

Diese Ergebnisse enthalten als erste Schätzungen auch Unsicherheitsfaktoren, wie z. B. nicht voraussehbare Witterungseinflüsse, die gewisse Schwankungen in Bezug auf das endgültige Ernteergebnis nicht ausschließen.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
							September	August	September
							1969		1968
Wetterschäden									
keine	75	100	90	88	92	100	89	65	62
schwache	-	-	7	10	5	-	8	21	22
mittlere	25	-	2	2	2	-	2	9	11
starke	-	-	1	0	1	-	1	5	5
Niederschläge									
zu gering	25	13	3	3	12	-	4	10	-
ausreichend	25	84	94	96	82	100	93	85	6
zu hoch	50	3	3	1	6	-	3	5	94
Temperaturverlauf									
ungünstig	25	3	3	1	10	-	3	1	87
normal	50	38	41	33	50	-	38	18	12
günstig	25	59	56	66	40	100	59	81	1
Sonnenscheindauer									
zu gering	50	6	6	3	11	-	5	0	96
genügend	50	69	64	60	63	100	62	27	4
reichlich	-	25	30	37	26	-	33	73	-
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	1	0	4	-	1	0	73
mittel	50	22	33	28	42	-	31	13	26
gut	50	78	66	72	54	100	68	87	1
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	-	-	0	2	-	0	0	36
mittel	50	28	30	26	48	-	29	16	57
gut	50	72	70	74	50	100	71	84	7
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	-	88	88	95	93	100	91	82	64
unvollständig	100	12	12	5	7	-	9	18	36

2. Güte der Trauben September 1969

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;  
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;  
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;  
 4,0 (gering) = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;  
 5,0 (sehr gering) = Weinmost, aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Weißer Sorten	Rote Sorten	Weißer Sorten	Rote Sorten
	1969		1968	
Nordrhein-Westfalen	2,2	2,3	2,4	2,8
Hessen	2,2	2,3	3,5	3,4
Hessische Bergstraße	2,9	3,0	3,1	3,5
Rheingau	2,2	2,3	3,5	3,4
Rheinland-Pfalz	2,4	2,4	3,1	3,2
Rheinland-Nassau	.	.	3,0	2,5
Mittelrhein	2,4	2,3	3,2	3,0
Nahe (Koblenz)	2,3	2,8	3,0	3,0
Obermosel	2,4	.	3,1	.
Saar	2,6	-	3,2	-
Rur	2,6	.	3,3	-
Mittelmosel	2,3	2,4	3,0	3,0
Untermosel	2,3	.	3,0	.
Ahr	2,0	2,1	2,5	2,4
Lahn	2,3	2,1	3,0	3,0
Rheinhessen	.	.	3,0	2,9
Worms und Umgegend	2,3	2,5	3,1	3,1
Oppenheim und Umgegend	2,3	2,5	3,2	2,9
Mainz und Umgegend	2,2	2,4	2,9	2,5
Ingelheim und Umgegend	2,3	2,5	2,6	2,6
Wiesbach	2,3	2,6	3,2	3,4
Bingen und Umgegend	2,2	2,2	2,3	2,1
Nahe (Rheinhessen)	2,2	2,1	3,4	3,1
Alzey und Umgegend	2,3	2,3	3,0	3,0
Pfalz	.	.	3,1	3,4
Mittelhaardt	2,4	2,4	3,1	3,4
Oberhaardt	2,5	2,4	3,1	3,2
Unterhaardt mit Zellertal	2,3	2,6	3,2	3,4
Nahe (Pfalz)	2,5	2,4	3,1	3,5
Baden-Württemberg	2,2	2,1	3,0	2,9
Nordwürttemberg	2,3	2,1	3,1	2,9
Oberes Neckartal	2,7	2,0	2,4	3,0
Unteres Neckartal	2,2	2,2	3,1	2,9
Remstal	2,2	1,9	2,9	2,2
Enztal	2,2	2,1	3,1	2,9
Zabergäu	2,2	2,0	3,4	3,1
Kocher- und Jagsttal	2,5	2,4	3,2	3,1
Tauber- und Jagsttal	2,5	2,1	3,3	3,4

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

## 2. Güte der Trauben September 1969

Land	Weißer	Roter	Weißer	Roter
Verwaltungsbezirk	Sorten	Sorten	Sorten	Sorten
Woinbaugesbiet	1969		1968	
Nordbaden	2,3	2,5	3,2	3,3
Tauber- und Maintal	2,2	2,7	3,2	3,5
Neckar- und Jagsttal	2,2	2,2	2,9	3,1
Bergstraße	2,3	2,3	3,2	3,6
Kraichgau	2,2	2,5	3,1	3,3
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,7	2,7	3,3	3,1
Südbaden	2,2	2,1	2,9	2,7
Seogegend	2,0	2,8	2,3	2,0
Oberes Rheintal	2,0	2,0	3,1	3,0
Markgräflerland	2,3	2,4	2,9	3,0
Kaiserstuhl	2,2	2,1	2,9	2,7
Breisgau	2,2	2,1	2,8	2,7
Ortenau und Bühlergegend	2,3	2,1	3,0	2,7
Südwürttemberg-Hohenzollern	2,1	2,0	2,8	2,9
Oberes Neckartal	2,1	2,0	2,7	2,8
Enztal	3,0	2,5	-	3,5
Bodenseegebiet	.	.	3,0	3,0
Bayern	2,3	2,4	3,3	3,3
Unterfranken	2,4	2,4	3,3	3,3
Mittelfranken	1,8	-	3,4	-
Übrige Gebiete	2,6	-	.	.
Saarland	2,2	2,0	3,0	3,0
Bundesgebiet	2,4	2,2	3,1	3,0
1955			2,9	
1956			3,6	
1957			3,0	
1958			2,4	
1959			1,6	
1960			2,7	
1961			2,8	
1962			2,8	2,6
1963			2,4	2,5
1964			2,0	2,0
1965			3,3	3,1
1966			2,1	2,1
1967			2,5	2,4
1968			3,1	3,0

3. Vorschätzung der Weinmosternte September 1969

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost			Rotmost 1)		
	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
	ha	hl		ha	hl	
Nordrhein-Westfalen	21	48,7	1 023	1	30,0	30
Hessen	3 233	73,0	236 009	61	59,0	3 599
Hessische Bergstraße	226	73,0	16 498	1	59,0	59
Rheingau	3 007	73,0	219 511	60	59,0	3 540
Rheinland-Pfalz	45 367	85,0	3 841 194	4 610	92,0	425 216
Rheinland-Nassau 2)	.	.	.	.	.	.
Mittelrhein	921	69,0	63 549	11	67,0	737
Nahe (Koblenz)	3 034	73,0	221 482	20	78,0	1 560
Obermosel	820	98,0	80 360	0	.	.
Saar	1 052	86,0	90 472	-	-	-
Ruwer	431	78,0	33 618	0	.	.
Mittelmosel	5 208	93,0	484 344	1	74,0	74
Untermosel	2 695	88,0	237 160	0	.	.
Ahr	213	75,0	15 975	320	71,0	22 720
Lahn 2)	11	68,0	748	1	60,0	60
Rheinhessen	.	.	.	.	.	.
Worms und Umgegend	4 659	77,0	358 743	395	73,0	28 835
Oppenheim und Umgegend	1 398	64,0	89 472	5	80,0	400
Mainz und Umgegend	823	75,0	61 725	75	75,0	5 625
Ingelheim und Umgegend	1 052	90,0	94 680	334	76,0	25 384
Wiesbach	1 677	88,0	147 576	140	88,0	12 320
Bingen und Umgegend	352	75,0	26 400	22	63,0	1 386
Nahe (Rheinhessen)	622	71,0	44 162	35	62,0	2 170
Alzey und Umgegend	4 952	78,0	386 256	236	75,0	17 700
Pfalz 2)	.	.	.	.	.	.
Mittelhaardt	4 179	94,0	392 826	1 542	106,0	163 452
Oberhaardt	9 373	92,0	862 316	737	99,0	72 963
Unterhaardt mit Zellertal	1 390	82,0	113 980	733	95,0	69 635
Nahe (Pfalz)	505	70,0	35 350	3	65,0	195

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - 2) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen

## 3. Vorschätzung der Weinmosternte September 1969

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost			Rotmost 1)		
	Ertrugsfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertrugsfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
	ha	hl		ha	hl	
Baden-Württemberg	9 672	76,8	742 798	5 759	66,7	384 302
Nordwürttemberg	2 713	74,4	201 961	3 454	68,5	236 483
Oberes Neckartal	10	49,0	1 960	1	45,0	45
Unteres Neckartal	1 375	73,3	100 735	2 004	68,7	137 576
Remstal	353	78,9	27 857	430	75,3	32 367
Enztal	111	74,3	8 247	418	62,5	26 138
Zabergäu	344	73,6	25 325	518	67,0	34 696
Kocher- und Jagsttal	368	75,3	27 724	69	67,1	4 627
Tauber- und Main	122	82,9	10 113	14	73,9	1 034
Nordbaden	1 397	68,4	95 537	401	61,3	24 592
Tauber- und Main	248	68,9	17 076	32	57,9	1 852
Neckar- und Jagsttal	39	76,0	2 963	10	64,9	649
Bergstraße	480	70,2	33 685	116	65,1	7 550
Kraichgau	572	65,8	37 636	181	56,7	10 256
Pfinz-, Enz- und Alb	58	72,0	4 177	62	69,1	4 235
Südbaden	5 552	80,1	444 690	1 888	64,9	122 535
Seegegend	74	84,1	6 220	63	63,3	3 986
Oberes Rheintal	4	92,8	371	18	51,9	935
Markgräflerland	1 296	78,5	101 760	85	67,9	5 770
Kaiserstuhl	1 981	78,6	155 683	742	61,7	45 801
Breisgau	1 221	91,6	111 841	513	73,0	37 464
Ortenau und Oberrhein	976	70,5	68 815	467	61,2	28 579
Südwestfalen-Hohenzollern	10	61,0	610	16	43,3	692
Oberes Neckartal	9	57,6	518	12	52,9	635
Enztal	1	32,0	32	4	11,3	45
Bodenseegebiet	.	.	.	.	.	.
Bayern	2 320	56,6	131 315	33	43,6	1 439
Unterfranken	2 083	57,0	118 731	33	43,6	1 439
Mittelfranken	231	53,3	12 312	-	-	-
Übrige Gebiete	6	45,3	272	-	-	-
Saarland	73	116,1	8 472	0	140,0	20
Bundesgebiet	60 686	81,7	4 960 811	10 464	77,8	814 606

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen



#### 4. Witterungseinflüsse und Weinmosternten 1964 - 1969

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Niederschläge						
zu gering	43	-	8	1	-	4
ausreichend	57	46	88	58	6	93
zu hoch	-	54	4	41	94	3
Temperaturverlauf						
ungünstig	2	71	3	37	87	3
normal	33	24	28	47	12	38
günstig	65	5	69	16	1	59
Sonnenscheindauer						
zu gering	0	83	5	48	96	5
genügend	45	16	58	47	4	62
reichlich	55	1	37	5	-	33
Witterung für die Reben und Trauben						
schlecht	-	56	1	20	73	1
mittel	25	41	27	53	26	31
gut	75	3	72	27	1	68
Entwicklung der Trauben						
schlecht	1	36	1	6	36	0
mittel	25	59	23	48	57	29
gut	74	5	76	46	7	71
hl						
Weinmost insgesamt	7 185 349	5 035 473	4 809 358	6 069 362	6 047 598 <sup>a)</sup>	5 775 417 <sup>b)</sup>
Weißmost	6 006 052	4 160 536	4 060 845	5 120 717	4 954 766 <sup>a)</sup>	4 960 811 <sup>b)</sup>
Rotmost <sup>1)</sup>	1 179 297	874 937	748 513	948 645	1 092 832 <sup>a)</sup>	814 606 <sup>b)</sup>

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.- a) Endgültiges Ergebnis (Ergänzende Ernteterminnung).- b) Vorschätzung