

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung

September 1970



Bestellnummer: 210230 – 700005

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
2. Güte der Trauben	5
3. Vorschätzung der Weinmosternte	7
4. Witterungseinflüsse und Weinmosternten 1965-1970 .	9

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Oktober 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,-

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 25. August bis zum 24. September wurde die Witterung für die diesjährige Weinmosternte als recht günstig beurteilt. Diese Bewertung liegt geringfügig über der des Vormonats und übertrifft die schon recht gute Beurteilung aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres deutlich.

Der Witterungsverlauf schlägt sich in den Noten über die Güte der Trauben nieder, die im Bundesdurchschnitt für weiße und rote Sorten mit 2,3 nahe bei gut liegen. Die Noten entsprechen etwa denen der Jahre 1958, 1963 und 1969, erreichen aber nicht die guten Einstufungen der Jahre 1964 und 1966. Die sich dieser Berichtsperiode anschließenden Witterungsverhältnisse werden über die Qualität dieses Jahrgangs entscheiden.

Nach der ersten Vorschätzung kann bei einem voraussichtlichen Hektarertrag von 103,8 hl für die weißen und 104,2 hl für die roten Rebsorten mit einer Mosternte von etwa 7,6 Mill. hl gerechnet werden. Die durchschnittliche Flächenleistung wird damit erheblich günstiger als im Vorjahr eingeschätzt und scheint angesichts der Niederschlagsperiode Ende September-Anfang Oktober die Ergebnisse der besonders ertragreichen Jahre 1960 (115,8 hl/ha) und 1964 (104,7 hl/ha) erreichen zu können.

Diese Ergebnisse enthalten als erste Schätzungen noch Unsicherheitsfaktoren, wie z.B. nicht voraussehbare Witterungseinflüsse, die gewisse Schwankungen im Hinblick auf das endgültige Ergebnis nicht ausschließen.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
							September	August	September
							1970		1969
Wetterschäden									
keine	100	91	91	89	89	100	90	77	89
schwache	-	6	7	8	6	-	7	15	8
mittlere	-	3	2	2	4	-	2	6	2
starke	-	-	-	1	1	-	1	2	1
Niederschläge									
zu gering	-	24	31	14	67	-	25	16	4
ausreichend	100	76	69	85	32	100	74	82	93
zu hoch	-	-	-	1	1	-	1	2	3
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	6	-	2	1	-	1	2	3
normal	100	18	38	29	35	-	33	44	38
günstig	-	76	62	69	64	100	66	54	59
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	3	-	4	2	-	2	5	5
genügend	100	53	62	56	54	71	59	64	62
reichlich	-	44	38	40	44	29	39	31	33
Witterung für die Reben u. Trauben									
schlecht	-	3	-	1	-	-	1	1	1
mittel	100	12	24	20	34	-	23	25	31
gut	-	85	76	79	66	100	76	74	68
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	-	-	1	1	-	1	1	0
mittel	25	9	21	17	32	-	20	19	29
gut	75	91	79	82	67	100	79	80	71
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	50	91	92	95	94	100	93	83	91
unvollständig	50	9	8	5	6	-	7	17	9

2. Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;
 4,0 (gering) = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;
 5,0 (sehr gering) = Weinmost, aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißer	Roter	Weißer	Roter
	Sorten	Sorten	Sorten	Sorten
	1970		1969	
Nordrhein-Westfalen	2,2	2,3	2,2	2,3
Hessen	2,2	2,0	2,2	2,3
Hessische Bergstraße	2,0	2,0	2,9	3,0
Rheingau	2,2	2,0	2,2	2,3
Rheinland-Pfalz	2,3	2,4	2,4	2,4
Rheinland-Nassau
Mittelrhein (einschl. Lahn)	2,3	2,3	.	.
Nahe (Koblenz)	2,2	2,4	2,3	2,8
Obermosel	2,4	.	2,4	.
Saar	2,5	.	2,6	-
Ruwer	2,5	.	2,6	.
Mittelmosel	2,4	.	2,3	2,4
Untermosel	2,4	.	2,3	.
Ahr	2,1	2,1	2,0	2,1
Rheinhausen
Worms und Umgegend	2,4	2,6	2,3	2,5
Oppenheim und Umgegend	2,5	2,5	2,3	2,5
Mainz und Umgegend	2,1	2,3	2,2	2,4
Ingelheim und Umgegend	2,2	2,3	2,3	2,5
Wiesbach	2,3	2,3	2,3	2,6
Bingen und Umgegend	2,1	2,1	2,2	2,2
Nahe (Rheinhausen)	2,1	2,3	2,2	2,1
Alzey und Umgegend	2,2	2,2	2,3	2,3
Pfalz
Mittelhaardt	2,3	2,3	2,4	2,4
Oberhaardt	2,4	2,4	2,5	2,4
Unterhaardt mit Zellertal	2,3	2,6	2,3	2,6
Nahe (Pfalz)	2,4	2,3	2,5	2,4
Baden-Württemberg	2,2	2,3	2,2	2,1
Nordwürttemberg	2,1	2,3	2,3	2,1
Oberes Neckartal	2,4	2,1	2,7	2,0
Unteres Neckartal	2,1	2,3	2,2	2,2
Remstal	2,4	2,5	2,2	1,9
Enztal	2,2	2,3	2,2	2,1
Zabergäu	1,9	2,1	2,2	2,0
Kocher- und Jagsttal	2,3	2,4	2,5	2,4
Tauber- und Main-Region	2,6	2,7	2,5	2,1

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

2. Güte der Trauben

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Weißer Sorten	Roter Sorten	Weißer Sorten	Roter Sorten
	1970		1969	
Nordbaden	2,3	2,4	2,3	2,5
Tauber- und Maintal	2,3	2,9	2,2	2,7
Neckar- und Jagsttal	1,9	2,2	2,2	2,2
Bergstraße	2,2	2,4	2,3	2,3
Kraichgau	2,3	2,3	2,2	2,5
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,7	2,7	2,7	2,7
Südbaden	2,3	2,3	2,2	2,1
Seegegend	2,2	2,2	2,0	2,8
Oberes Rheintal	.	.	2,0	2,0
Markgräflerland	2,3	2,3	2,3	2,4
Kaiserstuhl	2,3	2,3	2,2	2,1
Breisgau	2,1	2,1	2,2	2,1
Ortenau und Bühlergegend	2,5	2,4	2,3	2,1
Südwestfalen-Lippe	2,2	2,1	2,1	2,0
Oberes Neckartal	2,1	2,1	2,1	2,0
Enztal	3,0	2,1	3,0	2,5
Bayern	2,2	2,2	2,3	2,4
Unterfranken	2,2	2,2	2,4	2,4
Mittelfranken	2,4	-	1,8	-
Übrige Gebiete	3,6	-	2,6	-
Saarland	1,4	1,0	2,2	2,0
Bundesgebiet	2,3	2,3	2,4	2,2
1960		2,7		
1961		2,8		
1962	2,8	2,6		
1963	2,4	2,5		
1964	2,0	2,0		
1965	3,3	3,1		
1966	2,1	2,1		
1967	2,5	2,4		
1968	3,1	3,0		
1969	2,4	2,2		

3. Vorschätzung der Weinmosternte

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost			Rotmost 1)		
	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
	ha	hl		ha	hl	
Nordrhein-Westfalen	21	45,7	960	1	37,6	38
Hessen	3 250	81,0	262 708	58	64,0	3 712
Hessische Bergstraße	271	79,0	21 409	2	64,0	128
Rheingau	2 979	81,0	241 299	56	64,0	3 584
Rheinland-Pfalz	47 337	109,9	5 204 115	4 546	116,9	530 864
2) Rheinland-Nassau
Mittelrhein						
(einschl. Lahn)	918	94,1	86 384	9	72,1	649
Nahe (Koblenz)	3 134	90,2	282 687	23	99,4	2 286
Obermosel	880	170,9	150 392	0	.	.
Saar	1 014	96,9	98 257	1	.	.
Ruwer	330	91,4	30 162	0	.	.
Mittelmosel	5 688	107,6	612 029	2	.	.
Untermosel	2 718	104,6	284 303	2	.	.
Ahr	197	82,3	16 213	303	82,5	24 998
2) Rheinhessen
Worms und Umgegend	4 844	108,3	524 605	390	113,2	44 148
Oppenheim und Umgegend	1 396	107,3	149 791	7	95,0	665
Mainz und Umgegend	991	108,1	107 127	69	87,5	6 038
Ingelheim und Umgegend	1 102	110,2	121 440	331	102,4	33 894
Wiesbach	1 757	101,1	177 633	140	119,6	16 744
Bingen und Umgegend	291	102,4	29 798	80	91,3	7 304
Nahe (Rheinhessen)	642	112,6	72 289	40	99,5	3 980
Alzey und Umgegend	5 267	116,0	610 972	223	94,6	21 096
2) Pfalz
Mittelhaardt	4 374	107,4	469 768	1 480	131,9	195 212
Oberhaardt	9 879	119,9	1 184 492	731	121,3	88 670
Unterhaardt mit Zellertal	1 444	108,7	156 963	713	119,2	84 990
Nahe (Pfalz)	471	82,4	38 810	2	95,0	190

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - 2) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

3. Vorschätzung der Weinmoststernte

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Weißmost			Rotmost ¹⁾		
	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
	ha	hl		ha	hl	
Baden-Württemberg	9 769	92,5	903 983	5 845	95,0	555 467
Nordwürttemberg	2 743	87,4	239 672	3 507	100,7	353 245
Oberes Neckartal	39	58,1	2 267	1	48,0	48
Unteres Neckartal	1 399	85,5	119 625	2 049	102,6	210 164
Remstal	341	84,8	28 900	425	95,8	40 696
Enztal	108	84,1	9 086	421	98,8	41 582
Zabergäu	342	93,7	32 052	516	98,2	50 679
Kocher- und Jagsttal	393	95,3	37 436	82	109,4	8 972
Tauber- und Jagsttal	121	85,2	10 306	13	84,9	1 104
Nordbaden	1 447	87,4	126 500	409	85,8	35 074
Tauber- und Maintal	285	76,4	21 769	33	70,8	2 335
Neckar- und Jagsttal	38	77,0	2 925	10	70,4	704
Bergstraße	479	88,9	42 589	121	103,2	12 488
Kraichgau	587	91,5	53 717	185	81,2	15 016
Pfingz-, Enz- und Albtal	58	94,8	5 500	60	75,5	4 531
Südbaden	5 569	96,4	537 051	1 913	86,9	166 193
Seegegend	76	99,9	7 590	63	86,2	5 430
Oberes Rheintal	4	87,3	349	22	73,1	1 639
Markgräflerland	1 309	82,5	108 009	96	77,0	7 390
Kaiserstuhl	1 980	105,7	209 324	742	93,5	69 366
Breisgau	1 222	106,0	129 543	512	90,3	46 245
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	978	84,1	82 236	478	75,6	36 123
Südwestfalen-Lippe-Hohenzollern	10	76,0	760	16	59,7	955
Oberes Neckartal	8	84,5	676	12	57,0	684
Enztal	1	20,0	12	4	64,5	258
Bayern	2 592	59,7	154 721	37	59,1	2 188
Unterfranken	2 321	60,3	139 914	37	59,1	2 188
Mittelfranken	266	54,8	14 569	-	-	-
Übrige Gebiete	5	47,6	238	-	-	-
Saarland	79	166,8	13 190	0	120,0	17
Bundesgebiet	63 048	103,8	6 539 677	10 487	104,2	1 092 286

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschließlich Tettnang.

4. Witterungseinflüsse und Weinmosternten 1965 - 1970

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Niederschläge						
zu gering	-	8	1	-	4	25
ausreichend	46	88	58	6	93	74
zu hoch	54	4	41	94	3	1
Temperaturverlauf						
ungünstig	71	3	37	87	3	1
normal	24	28	47	12	38	33
günstig	5	69	16	1	59	66
Sonnenscheindauer						
zu gering	83	5	48	96	5	2
genügend	16	58	47	4	62	59
reichlich	1	37	5	-	33	39
Witterung für die Reben und Trauben						
schlecht	56	1	20	73	1	1
mittel	41	27	53	26	31	23
gut	3	72	27	1	68	76
Entwicklung der Trauben						
schlecht	36	1	6	36	0	1
mittel	59	23	48	57	29	20
gut	5	76	46	7	71	79
<hr/>						
	<hr/>					
Weinmost insgesamt	5 035 473	4 809 358	6 069 362	6 047 598 ^{a)}	5 947 354 ^{a)}	7 631 963 ^{b)}
Weißmost	4 160 536	4 060 845	5 120 717	4 954 766 ^{a)}	5 149 202 ^{a)}	6 539 677 ^{b)}
Rotmost ¹⁾	874 937	748 513	948 645	1 092 832 ^{a)}	798 152 ^{a)}	1 092 286 ^{b)}

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - a) Endgültiges Ergebnis (Ergänzende Ernteermittlung). - b) Vor-
schätzung.