

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung

September 1974



Bestellnummer: 210231 – 740005
VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Tabellenteil: | |
| 1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben . | 4 |
| 2. Güte der Trauben | 5 |
| 3a) Vorschätzung der Weinmosternte | 7 |
| 3b) Endgültige Ergebnisse früherer Jahre | 8 |

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im November 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Meldungen der Berichterstatter aus der Berichtsperiode vom 24.8. bis 24.9. sind überwiegend von mittleren Beurteilungen der für die Entwicklung der Trauben wichtigen Witterungsfaktoren gekennzeichnet. Aus diesen Gründen erfuhr die Entwicklung der Trauben auch keine optimale Bewertung; sie wurde von 55 % der Berichterstatter als mittel, von 41 % als gut und von 2 % als schlecht beurteilt.

Die am Berichtstermin vorgenommene Beurteilung der Güte der Trauben lag mit der Note 2,5 für weiße und rote Rebsorten ungünstiger als im Vorjahr. Die vorjährigen Noten bezifferten sich bei weißen Sorten auf 2,0 und bei roten auf 2,1. Aufgrund der vorliegenden Einstufung und unter Berücksichtigung der seit dem Berichtstermin (24.9.) vorherrschenden Witterung kann davon ausgegangen werden, daß sich die eingebrachten Moste doch zu recht ansprechenden Weinen ausbauen werden.

Die zu erwartende Erntemenge an Weinmost insgesamt liegt niedriger als im vorjährigen Rekordjahr; sie wird voraussichtlich um etwa 30 % unter dem endgültigen Ergebnis von 1973 bleiben. Nach dieser hier veröffentlichten Schätzung kann mit einer Ernte von ca. 7,4 Mill. hl Weinmost insgesamt gerechnet werden. Sie dürfte sich aus 6,5 Mill. hl Weißmost und 0,9 Mill. hl Rotmost zusammensetzen. Dabei ist besonders beachtenswert, daß die Ernteaussichten bei Weißmost um ca. 29 % und bei Rotmost um ca. 43 % niedriger sein werden als 1973.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

| Berichtsgegenstand und Beurteilung | Nord- rhein- Westfalen | Hessen | Rhein- land - Pfalz | Baden- Württem- berg | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet | | |
|--|------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|--------|---------------|--------------|--------|-----------|
| | | | | | | | September | August | September |
| | | | | | | | 1974 | 1973 | 1973 |
| Wetterschäden | | | | | | | | | |
| keine | 100 | 97 | 95 | 88 | 90 | 100 | 91 | 82 | 75 |
| schwache | - | 3 | 3 | 8 | 9 | - | 6 | 12 | 17 |
| mittlere | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 7 |
| starke | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Niederschläge | | | | | | | | | |
| zu gering | - | 68 | 54 | 14 | 38 | 29 | 35 | 6 | 81 |
| ausreichend | 100 | 32 | 45 | 85 | 62 | 71 | 64 | 90 | 19 |
| zu hoch | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - |
| Temperaturverlauf | | | | | | | | | |
| ungünstig | 100 | 21 | 6 | 8 | 13 | - | 8 | 9 | 1 |
| normal | - | 35 | 55 | 57 | 56 | - | 55 | 59 | 16 |
| günstig | - | 44 | 39 | 35 | 31 | 100 | 37 | 32 | 83 |
| Sonnenscheindauer | | | | | | | | | |
| zu gering | 100 | 21 | 11 | 11 | 21 | - | 12 | 14 | 0 |
| genügend | - | 47 | 65 | 72 | 62 | 57 | 67 | 68 | 11 |
| reichlich | - | 32 | 24 | 17 | 17 | 43 | 21 | 18 | 89 |
| Witterung für die Reben und Trauben | | | | | | | | | |
| schlecht | 25 | 12 | 2 | 4 | 7 | - | 4 | 3 | 1 |
| mittel | 75 | 56 | 49 | 57 | 65 | - | 53 | 55 | 29 |
| gut | - | 32 | 49 | 39 | 28 | 100 | 43 | 42 | 70 |
| Entwicklung der Trauben | | | | | | | | | |
| schlecht | 25 | 6 | 1 | 4 | 15 | - | 4 | 2 | 0 |
| mittel | 25 | 56 | 51 | 59 | 63 | - | 55 | 52 | 25 |
| gut | 50 | 38 | 48 | 37 | 22 | 100 | 41 | 46 | 75 |

2. Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;
 4,0 (gering) = Weinmost, aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;
 5,0 (sehr gering) = Weinmost, aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

| Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich | Weiß Sorten | Rote Sorten | Weiß Sorten | Rote Sorten |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1974 | | 1973 | |
| Nordrhein-Westfalen | 3,1 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
| Hessen | 2,7 | 2,6 | 1,7 | 1,8 |
| Hessische Bergstraße | 2,3 | - | 1,6 | 2,0 |
| Rheingau | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 1,7 |
| Rheinland-Pfalz | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |
| Koblenz | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 2,0 |
| Trier | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,0 |
| Rheinhausen-Pfalz | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,2 |
| Ahr | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
| Mittelrhein | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| Bacharach | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 2,0 |
| Rhein-Burgengau | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| Mosel-Saar-Ruwer | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
| Bernkastel | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
| Obermosel | 2,6 | - | 1,9 | - |
| Saar-Ruwer | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Zell/Mosel | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
| Nahe | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,2 |
| Bad-Kreuznach | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,3 |
| Schloß-Böckelheim | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Rheinhausen | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,1 |
| Bingen | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,0 |
| Nierstein | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
| Wonnegau | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 |
| Rheinpfalz | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,3 |
| Südliche Weinstraße | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,2 |
| Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,3 |

2. Güte der Trauben

| Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich | Weiß Sorten | Rote Sorten | Weiß Sorten | Rote Sorten |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1974 | | 1973 | |
| Baden-Württemberg | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |
| Württemberg | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,2 |
| Remstal-Stuttgart | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
| Württembergisch Unterland | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 1,9 |
| Baden | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,8 |
| Badische Bergstraße-Kraichgau | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,0 |
| Badisches Frankenland | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,3 |
| Bodensee | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 1,8 |
| Markgräflerland | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 1,8 |
| Kaiserstuhl-Tuniberg | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 1,8 |
| Breisgau | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
| Ortenau | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Bayern | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,0 |
| Unterfranken | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,0 |
| Mittelfranken | 3,5 | - | 2,3 | - |
| Übrige Gebiete | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
| Saarland | 2,4 | - | 1,0 | - |
| Bundesgebiet | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |
| 1965 | 3,3 | 3,1 | | |
| 1966 | 2,1 | 2,1 | | |
| 1967 | 2,5 | 2,4 | | |
| 1968 | 3,1 | 3,0 | | |
| 1969 | 2,4 | 2,2 | | |
| 1970 | 2,3 | 2,3 | | |
| 1971 | 1,8 | 1,9 | | |
| 1972 | 3,0 | 3,0 | | |
| 1973 | 2,0 | 2,1 | | |

3a Vorschätzung der Weinmosternte

| Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich | Weißmost | | | Rotmost 1) | | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|
| | ertragfähige Rebfläche | Ertrag je ha | Erntemenge | ertragfähige Rebfläche | Ertrag je ha | Erntemenge |
| | ha | hl | | ha | hl | |
| Nordrhein-Westfalen | 12 | 61,9 | 743 | 2 | 60,0 | 120 |
| Hessen | 3 185 | 73,6 | 234 437 | 65 | 55,2 | 3 587 |
| Hessische Bergstraße | 305 | 72,0 | 21 971 | 2 | 61,0 | 122 |
| Rheingau | 2 880 | 73,8 | 212 466 | 63 | 55,0 | 3 465 |
| Rheinland-Pfalz | 53 694 | 102,5 | 5 502 911 | 3 906 | 125,5 | 490 269 |
| Koblenz | 7 575 | 89,9 | 680 984 | 312 | 84,0 | 26 219 |
| Trier | 8 730 | 104,3 | 910 258 | 5 | . | . |
| Rheinhessen-Pfalz | 37 389 | 104,6 | 3 911 669 | 3 589 | 129,2 | 463 642 |
| Ahr | 189 | . | . | 283 | 81,0 | 22 918 |
| Mittelrhein | 854 | 76,2 | 65 061 | 10 | . | . |
| Bacharach | 370 | 80,4 | 29 762 | 1 | . | . |
| Rhein-Burgengau | 484 | 72,9 | 35 299 | 9 | . | . |
| Mosel-Saar-Ruwer | 11 178 | 100,3 | 1 121 673 | 9 | . | . |
| Bernkastel | 6 396 | 105,6 | 675 721 | 3 | . | . |
| Obermosel | 920 | 125,5 | 115 431 | - | - | - |
| Saar-Ruwer | 1 758 | 85,7 | 150 627 | 2 | . | . |
| Zell/Mosel | 2 104 | 85,5 | 179 894 | 4 | . | . |
| Nahe | 4 043 | 90,4 | 365 461 | 41 | . | . |
| Bad Kreuznach | 2 608 | 92,1 | 240 193 | 32 | . | . |
| Schloß-Böckelheim | 1 435 | 87,3 | 125 268 | 9 | . | . |
| Rheinhessen | 19 367 | 103,5 | 2 004 668 | 1 057 | 119,5 | 126 338 |
| Bingen | 6 459 | 102,9 | 664 387 | 472 | 121,5 | 57 355 |
| Nierstein | 7 883 | 99,5 | 784 695 | 279 | . | . |
| Wonnegau | 5 025 | 110,6 | 555 586 | 306 | 130,2 | 39 837 |
| Rheinpfalz | 18 063 | 106,9 | 1 931 213 | 2 506 | 134,0 | 335 790 |
| Südliche Weinstraße | 10 437 | 115,0 | 1 200 097 | 542 | 122,3 | 66 269 |
| Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße | 7 626 | 95,2 | 731 116 | 1 964 | 137,2 | 269 521 |

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

3a Vorschätzung der Weinmosternte

| Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich | Weißmost | | | Rotmost 1) | | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|
| | ertragfähige Rebfläche | Ertrag je ha | Erntemenge | ertragfähige Rebfläche | Ertrag je ha | Erntemenge |
| | ha | hl | | ha | hl | |
| Baden-Württemberg | 11 923 | 52,6 | 626 913 | 6 853 | 52,7 | 361 285 |
| Württemberg | 3 030 | 58,4 | 177 044 | 4 164 | 58,6 | 244 132 |
| Remstal-Stuttgart | 527 | 57,5 | 30 295 | 712 | 53,3 | 37 982 |
| Württembergisch Unterland | 2 219 | 60,4 | 133 943 | 3 410 | 60,3 | 205 491 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 283 | 45,0 | 12 754 | 39 | 12,6 | 492 |
| Baden | 8 892 | 50,6 | 449 869 | 2 690 | 43,6 | 117 153 |
| Badische Bergstraße-Kraichgau | 1 474 | 63,5 | 93 545 | 361 | 54,5 | 19 673 |
| Badisches Frankenland | 408 | 25,7 | 10 504 | 25 | 28,2 | 709 |
| Bodensee | 120 | 68,5 | 8 216 | 88 | 54,5 | 4 785 |
| Markgräflerland | 2 125 | 28,1 | 59 811 | 193 | 37,1 | 7 154 |
| Kaiserstuhl-Tuniberg | 2 831 | 58,7 | 166 314 | 1 246 | 41,6 | 51 783 |
| Breisgau | 864 | 54,0 | 46 621 | 239 | 38,7 | 9 233 |
| Ortenau | 1 070 | 60,6 | 64 858 | 539 | 44,2 | 23 816 |
| Bayern | 2 937 | 56,4 | 165 562 | 46 | 62,2 | 2 860 |
| Unterfranken | 2 852 | 56,8 | 161 999 | 45 | 61,8 | 2 779 |
| Mittelfranken | 67 | 31,1 | 2 083 | - | - | - |
| Übrige Gebiete | 18 | 82,2 | 1 480 | 1 | 81,0 | 81 |
| Saarland | 83 | 97,1 | 8 074 | - | - | - |
| Bundesgebiet | 71 834 | 91,0 | 6 538 640 | 10 872 | 78,9 | 858 121 |

3b Endgültige Ergebnisse früherer Jahre

| | | | | | | |
|------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1968 | 59 147 | 83,8 | 4 954 766 | 11 067 | 98,7 | 1 092 832 |
| 1969 | 60 786 | 84,7 | 5 149 202 | 10 550 | 75,7 | 798 152 |
| 1970 | 63 024 | 130,8 | 8 246 443 | 10 676 | 153,9 | 1 642 576 |
| 1971 | 64 711 | 79,5 | 5 142 197 | 10 803 | 81,9 | 885 131 |
| 1972 | 66 791 | 96,4 | 6 440 269 | 10 760 | 94,4 | 1 016 194 |
| 1973 | 69 628 | 132,0 | 9 187 419 | 10 994 | 137,3 | 1 509 361 |

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.