

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juni 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 210231 – 750002

Erschienen im Juli 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben . .	5
2. Allgemeiner Beginn der Blüte	6
3. Durchschnittliche Dauer der Blüte	7
4. Begutachtung des Standes der Reben	8

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die in der Berichtszeit vom 24.5. bis 30.6. 1975 vorherrschende Witterung wurde von den Berichterstatlern in ihrer Auswirkung für die Entwicklung der Reben als mittel bis gut beurteilt. Es fielen meist ausreichende Niederschläge, wobei es vereinzelt zu örtlich begrenzten Unwetterschäden kam. Den Temperaturverlauf und die Sonnenscheindauer hielten die Berichterstatler insgesamt für überwiegend normal bis gut.

Dennoch wurde der Blütebeginn durch niedrige Temperaturen zu Anfang Juni verzögert. Obwohl es anschließend wesentlich wärmer wurde dauerte die Blüte bei den wichtigsten Rebsorten überwiegend 8 - 10 Tage. Die Situation veranlaßte die Berichterstatler zu folgender Gesamtbeurteilung des Verlaufs der Blüte : 45 % (1974 : 36 %) hielten ihn für gut; 49 % (1974 : 53 %) für mittel und 6 % (1974 : 11 %) für schlecht. Da der Gescheinansatz günstiger als im Vorjahr ist, deutet er im Zusammenwirken mit dem gegenüber 1974 leicht verbesserten Blüteverlauf und unter den zu dieser Jahreszeit gebotenen Vorbehalten auf ein quantitativ höheres Ernteergebnis als 1974 hin.

Der Stand der Reben hat sich gegenüber der Vormonatsnote von 1,8 auf 1,9 geringfügig verschlechtert, liegt aber noch im günstigen Bereich, wie nachfolgende Übersicht zeigt.

Jahr	Note	
	Juni	Mai
1964	1,8	2,0
1965	2,1	2,1
1966	2,3	2,4
1967	2,1	2,2
1968	2,3	2,3
1969	2,5	2,3
1970	2,0	2,4
1971	2,7	2,3
1972	2,3	2,2
1973	2,1	2,4
1974	2,3	2,5

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Juni	Mai	Juni
							1975		1974
Wetterschäden									
keine	75	72	82	71	60	100	75	94	81
schwache	25	19	11	22	16	-	17	5	14
mittlere	-	3	5	5	20	-	6	1	4
starke	-	6	2	2	4	-	2	0	1
Niederschläge									
zu gering	75	11	8	2	1	-	5	30	11
ausreichend	25	89	86	68	86	100	78	70	84
zu hoch	-	-	6	30	13	-	17	0	5
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	22	8	26	6	-	16	4	18
normal	-	56	67	54	61	57	60	58	67
günstig	100	22	25	20	33	43	24	38	15
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	11	11	28	15	-	19	.	23
genügend	50	75	78	62	72	57	70	.	70
reichlich	50	14	11	10	13	43	11	.	7
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	2	8	-	-	4	.	6
mittel	50	61	49	57	48	43	53	.	63
gut	50	39	49	35	52	57	43	.	31
Geschehensansatz									
schlecht	-	-	-	1	-	-	0	.	15
mittel	75	25	29	34	46	57	33	.	43
gut	25	75	71	65	54	43	67	.	42
Verlauf der Blüte									
schlecht	-	-	3	11	4	-	6	.	11
mittel	50	33	42	56	46	-	49	.	53
gut	50	67	55	33	50	100	45	.	36

2. Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1975

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Insgesamt	
								1975	1974
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	-	1	2	1	-	1	2
	vom 11.-20.6.	75	53	34	34	40	-	35	45
	vom 21.-30.6.	25	47	64	59	55	100	61	47
	nach dem 30.6.	-	-	1	5	4	-	3	6
Riesling, Weißer	bis 10.6.	-	-	0	1	-	.	1	2
	vom 11.-20.6.	75	37	20	22	36	.	22	34
	vom 21.-30.6.	25	63	76	69	60	.	71	57
	nach dem 30.6.	-	-	4	8	4	.	6	7
Silvaner, Grüner	bis 10.6.	-	-	0	1	-	.	1	1
	vom 11.-20.6.	100	43	25	21	30	.	24	35
	vom 21.-30.6.	-	57	73	68	62	.	69	55
	nach dem 30.6.	-	-	2	10	8	.	6	9
Elbling, Weißer	bis 10.6.	.	.	-	.	.	-	-	-
	vom 11.-20.6.	.	.	13	.	.	-	10	26
	vom 21.-30.6.	.	.	83	.	.	100	87	68
	nach dem 30.6.	.	.	4	.	.	-	3	6
Ruländer	bis 10.6.	.	.	.	1	.	-	1	1
	vom 11.-20.6.	.	.	.	33	.	-	32	30
	vom 21.-30.6.	.	.	.	61	.	100	61	57
	nach dem 30.6.	.	.	.	5	.	-	6	12
Burgunder, Blauer	bis 10.6.	-	-	1	1	-	.	1	2
	vom 11.-20.6.	-	50	18	33	43	.	31	32
	vom 21.-30.6.	-	50	75	59	57	.	61	56
	nach dem 30.6.	-	-	6	7	-	.	7	10
Portugieser, Blauer	bis 10.6.	-	-	1	2	-	.	2	1
	vom 11.-20.6.	-	50	43	36	61	.	40	53
	vom 21.-30.6.	100	50	55	59	39	.	56	41
	nach dem 30.6.	-	-	1	3	-	.	2	5

Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Müller-Thurgau	4	36	448	470	85	7	1 050	996
Riesling, Weißer	4	30	394	321	25	.	774	752
Silvaner, Grüner	2	21	323	313	71	.	730	680
Elbling, Weißer	.	.	24	.	.	7	31	31
Ruländer	.	.	.	265	.	7	272	261
Burgunder, Blauer	-	4	67	334	7	.	412	392
Portugieser, Blauer	1	2	208	231	13	.	455	440

3. Durchschnittliche Dauer der Blüte

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Insgesamt	
								1975	1974
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	8	6	7	6	-	7	4
	5 - 7 "	-	42	24	29	23	-	26	23
	8 - 10 "	50	33	48	40	47	100	44	44
	11 - 14 "	50	17	18	19	21	-	19	20
	15 Tage u.m.	-	-	4	5	3	-	4	9
Riesling, Weißer	bis 4 Tage	-	17	3	3	13	.	4	3
	5 - 7 "	-	27	25	29	37	.	27	22
	8 - 10 "	25	46	46	41	37	.	43	43
	11 - 14 "	75	10	20	24	13	.	21	23
	15 Tage u.m.	-	-	6	3	-	.	5	9
Silvaner, Grüner	bis 4 Tage	-	9	6	5	8	.	6	4
	5 - 7 "	-	29	30	28	27	.	29	25
	8 - 10 "	-	43	45	41	40	.	43	42
	11 - 14 "	100	19	16	18	18	.	17	24
	15 Tage u.m.	-	-	3	8	7	.	5	5
Elbling, Weißer	bis 4 Tage	.	.	-	.	.	-	-	-
	5 - 7 "	.	.	9	.	.	-	7	7
	8 - 10 "	.	.	50	.	.	100	62	43
	11 - 14 "	.	.	27	.	.	-	21	46
	15 Tage u.m.	.	.	14	.	.	-	10	4
Ruländer	bis 4 Tage	.	.	.	5	.	-	5	1
	5 - 7 "	.	.	.	26	.	-	26	22
	8 - 10 "	.	.	.	44	.	100	45	39
	11 - 14 "	.	.	.	19	.	-	18	26
	15 Tage u.m.	.	.	.	6	.	-	6	12
Burgunder, Blauer	bis 4 Tage	-	50	8	6	14	.	7	4
	5 - 7 "	-	25	37	27	14	.	28	23
	8 - 10 "	-	25	41	41	29	.	41	38
	11 - 14 "	-	-	11	21	43	.	19	25
	15 Tage u.m.	-	-	3	5	-	.	5	10
Portugieser, Blauer	bis 4 Tage	-	-	11	9	8	.	10	8
	5 - 7 "	-	50	36	32	39	.	34	31
	8 - 10 "	100	50	38	41	38	.	39	41
	11 - 14 "	-	-	13	15	15	.	14	16
	15 Tage u.m.	-	-	2	3	-	.	3	4

4. Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Note		
	1975		1974
	Juni	Mai	Juni
Nordrhein-Westfalen	2,5	2,4	2,2
Hessen	1,9	1,9	2,0
Hessische Bergstraße	1,9	1,9	1,9
Rheingau	1,9	1,9	2,0
Rheinland-Pfalz	1,9	1,8	2,0
Koblenz	2,0	1,9	2,1
Trier	2,0	1,8	2,3
Rheinhausen-Pfalz	1,9	1,8	2,0
Ahr	2,2	1,6	2,1
Mittelrhein	2,1	1,9	2,1
Bacharach	2,0	1,8	2,0
Rhein-Burgengau	2,2	2,0	2,2
Mosel-Saar-Ruwer	2,0	1,8	2,3
Bernkastel	1,9	1,7	2,2
Obermosel	2,3	1,8	2,7
Saar-Ruwer	2,2	1,9	2,4
Zell/Mosel	2,1	2,1	2,3
Nahe	2,0	2,0	2,0
Bad-Kreuznach	1,9	1,9	1,9
Schloß-Böckelheim	2,1	2,2	2,2
Rheinhausen	1,9	1,8	1,9
Bingen	2,0	2,0	2,0
Nierstein	1,7	1,8	1,9
Wonnegau	1,9	1,7	1,9
Rheinpfalz	1,9	1,8	2,0
Südliche Weinstraße	2,0	1,8	2,0
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	1,8	1,8	2,0
Baden-Württemberg	2,0	1,8	3,1
Württemberg	2,0	1,8	3,0
Remstal-Stuttgart	2,4	2,3	2,9
Württembergisch Unterland	1,9	1,7	3,0
Kocher-Jagst-Tauber	2,1	2,1	4,0
Baden	2,0	1,8	3,1
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,1	2,1	2,7
Badisches Frankenland	1,9	1,8	3,3
Bodensee	2,4	2,0	2,8
Markgräflerland	2,0	1,7	4,0
Kaiserstuhl-Tuniberg	1,8	1,6	2,9
Breisgau	2,1	1,8	3,2
Ortenau	2,1	1,8	2,6
Bayern	2,1	1,9	2,8
Unterfranken	2,1	1,9	2,8
Mittelfranken	2,2	2,1	3,2
Übrige Gebiete	2,1	2,0	2,3
Saarland	2,0	1,4	2,3
Bundesgebiet	1,9	1,8	2,3