

LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

Juli 1981

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2030351 — 81003

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03898

Erschienen im September 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,40

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 . Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	5
2 Verrieselungsschäden	6
3 Stand der Reben Ende Juli 1981	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten Ein-
heit, die in der Tabelle zur Dar-
stellung gebracht werden kann.

Abkürzungen

hl = Hektoliter
Mill.= Million

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben, Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende dritte Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Einfluß der Witterung auf die Höhe der Verrieselungsschäden.

Erläuterung der Ergebnisse

In der Berichtsperiode vom 6. bis 30. Juli 1981 wurden die Witterungsverhältnisse für die Entwicklung der Reben zum größten Teil als mittel (63 % der ausgewerteten Meldungen), zu 17 % als gut und zu 20 % als schlecht eingestuft. Diese Beurteilung liegt zwar etwas ungünstiger als die des Vormonats, sie übertrifft aber die außergewöhnlich schlechte Situation des Vorjahres deutlich. Obwohl die

einzelnen Klimafaktoren gegenüber dem Vormonat weniger gut bewertet wurden, blieb die Note für den Stand der Reben mit 2,8 gegenüber der Note aus dem Monat Juni gleich. Daraus wird ersichtlich, daß die Ernteerwartungen hinsichtlich der Menge im Durchschnitt nicht schlechter geworden sind. Es muß jedoch auf starke regionale Schwankungen hingewiesen werden.

Der Ansatz der Trauben, ein erster Hinweis auf die zu erwartende Erntemenge, wurde von 22 % der Berichterstatter als gut und von 62 als mittel bewertet. Angesichts dieser Beurteilung sind die Erwartungen auf einen mengenmäßig zufriedenstellenden Herbst nicht unbegründet. Sie werden noch gestützt durch die guten Meldungen über die geringen Verrieselungsschäden der wichtigsten Rebsorten.

Beurteilung	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ansatz der Trauben in %															
Schlecht	2	3	1	0	8	0	0	18	0	0	0	13	13	51	16
Mittel	29	52	62	20	74	28	20	55	24	28	29	78	35	43	62
Gut	69	45	37	80	18	72	80	27	76	72	71	9	52	6	22

Mosternte in Mill. hl															
6,1	6,0	5,9	9,9	6,0	7,5	10,7	6,8	9,2	8,7	10,4	7,3	8,2	4,6	.	.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1981		1980
							Juli	Juni	Juli
Wetterschäden									
keine	-	72	78	78	67	100	77	74	46
schwache	50	16	18	18	19	-	18	19	19
mittlere	50	6	3	3	9	-	4	6	15
starke	-	6	1	1	5	-	1	1	20
Niederschläge									
zu gering	-	-	-	2	3	-	1	1	1
ausreichend	100	42	63	71	74	29	67	87	14
zu hoch	-	58	37	27	23	71	32	12	85
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	53	48	42	56	100	46	22	92
normal	100	41	46	50	38	-	47	64	7
günstig	-	6	6	8	6	-	7	14	1
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	72	74	60	70	100	66	30	95
genügend	100	28	26	39	29	-	33	67	5
reichlich	-	-	-	1	1	-	1	3	0
Witterung für die Reben									
schlecht	-	17	18	19	36	71	20	7	83
mittel	100	66	66	62	56	29	63	68	17
gut	-	17	16	19	8	-	17	25	0
Ansatz der Trauben									
schlecht	-	-	5	21	49	43	16	.	51
mittel	100	42	66	63	43	29	62	.	43
gut	-	58	29	16	8	28	22	.	6

2 Verrieselungsschäden

% der Ertragsreblfläche

Land	Schäden ¹⁾	Weißweinsorten					Rotweinsorten		
		Mül- ler- Thur- gau	Ries- ling	Sil- vaner	Gut- edel	Ru- län- der	Por- tu- gie- ser	Bur- gun- der Bl.Sp.	Trol- lin- ger
Nordrhein- Westfalen	keine	70	90	90	-	-	-	-	-
	schwache	10	10	-	-	-	-	-	-
	mittlere	20	-	10	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	keine	64	59	77	-	-	40	57	-
	schwache	29	28	20	-	-	50	38	-
	mittlere	5	9	3	-	-	10	5	-
	starke	2	4	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	keine	80	74	69	.	73	86	69	-
	schwache	17	20	22	.	22	13	17	-
	mittlere	3	5	7	.	4	1	14	-
	starke	0	1	2	.	1	0	-	-
Baden-Württemberg	keine	75	59	73	36	77	64	78	70
	schwache	17	22	19	19	17	21	18	17
	mittlere	6	14	6	35	5	7	4	9
	starke	2	5	2	10	1	8	-	4
Bayern	keine	59	67	64	.	.	83	24	.
	schwache	27	24	25	.	.	8	63	.
	mittlere	12	7	9	.	.	9	11	.
	starke	2	2	2	.	.	-	2	.
Saarland	keine	66	-	-	-	48	-	-	-
	schwache	26	-	-	-	34	-	-	-
	mittlere	8	-	-	-	18	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1981	keine	76	69	69	.	.	81	76	.
	schwache	18	22	22	.	.	15	19	.
	mittlere	5	7	7	.	.	2	5	.
	starke	1	2	2	.	.	2	0	.
Bundesgebiet 1980	keine	19	17	33	.	.	41	19	.
	schwache	13	15	30	.	.	36	14	.
	mittlere	34	31	24	.	.	18	35	.
	starke	34	37	13	.	.	5	32	.

1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %
mittel = Schäden von 25 bis unter 50 %
stark = Schäden von 50 % und mehr.

3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = weit mehr als normaler Ertrag
 2,0 (gut) = mehr als normaler Ertrag
 3,0 (mittel) = normaler Ertrag
 4,0 (gering) = weniger als normaler Ertrag
 5,0 (sehr gering) = weit weniger als normaler Ertrag

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1981			1980
	Juli	Juni	Mai	Juli
	Note			
Nordrhein-Westfalen	3,3	3,3	3,0	4,0
Hessen	2,7	2,6	2,6	3,7
Hessische Bergstraße	2,6	2,6	2,9	4,1
Rheingau	2,7	2,6	2,5	3,5
Rheinland-Pfalz	2,7	2,7	3,0	3,2
RB Koblenz	2,8	2,8	2,9	3,4
Trier	2,7	2,9	3,2	3,5
Rheinhessen-Pfalz	2,7	2,7	2,9	3,1
Ahr	3,4	4,0	4,0	3,9
Mittelrhein	2,7	2,8	2,9	3,2
Bacharach	2,7	3,1	3,1	3,1
Rhein-Burgengau	2,7	2,5	2,7	3,2
Mosel - Saar - Ruwer	2,7	2,9	3,1	3,5
Bernkastel	2,4	2,6	2,9	3,5
Obermosel	4,0	3,9	4,2	3,4
Saar - Ruwer	3,4	3,8	3,9	3,5
Zell/Mosel	2,8	2,9	2,8	3,4
Nahe	2,8	2,7	2,8	3,4
Bad Kreuznach	2,5	2,4	2,8	3,2
Schloß-Böckelheim	3,3	3,3	3,0	3,7
Rheinhessen	2,7	2,7	2,9	3,2
Bingen	2,8	2,9	3,0	3,3
Nierstein	2,8	2,6	2,9	3,2
Wonnegau	2,6	2,5	2,7	3,0
Rheinpfalz	2,7	2,7	3,0	3,1
Südliche Weinstraße	2,6	2,7	3,0	3,2
Mittelhaardt - Deutsche Weinstraße	2,9	2,6	3,0	2,9

3 Stand der Reben

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1981			1980
	Juli	Juni	Mai	Juli
	Note			
Baden-Württemberg	3,0	3,0	3,2	3,6
Württemberg	3,3	3,5	3,8	3,2
Remstal - Stuttgart	2,7	2,7	3,1	3,2
Württembergisch Unterland	3,4	3,6	3,9	3,2
Kocher - Jagst - Tauber	3,8	4,2	4,8	4,1
Baden	2,8	2,7	2,9	3,8
Badische Bergstraße-Kraichgau .	2,9	2,9	3,0	4,0
Badisches Frankenland	4,0	4,2	4,6	4,1
Bodensee	2,9	2,9	3,2	3,3
Markgräflerland	3,0	2,9	2,9	3,6
Kaiserstuhl - Tuniberg	2,7	2,5	2,7	3,7
Breisgau	2,7	2,6	2,9	3,8
Ortenau	2,6	2,5	2,6	4,1
Bayern	3,5	3,2	3,5	3,5
RB Unterfranken	3,4	3,1	3,5	3,5
Mittelfranken	4,8	4,9	4,3	3,4
Übrige Gebiete	3,3	3,6	2,8	3,6
Saarland	3,6	2,7	4,0	3,5
Bundesgebiet ...	2,8	2,8	3,1	3,3
1967	2,0	2,1	2,2	
1968	2,4	2,3	2,3	
1969	2,3	2,5	2,3	
1970	1,9	2,0	2,4	
1971	2,6	2,7	2,3	
1972	2,0	2,3	2,2	
1973	2,0	2,1	2,4	
1974	2,4	2,3	2,5	
1975	1,9	1,9	1,8	
1976	2,1	2,1	2,5	
1977	2,1	2,3	2,6	
1978	2,8	2,7	2,3	
1979	2,5	2,6	3,0	
1980	3,3	2,6	1,9	
1981	2,8	2,8	3,1	