

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

August 1981



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 81004

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03902

Erschienen im Oktober 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,40

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	5
2 Beginn der Beerenreife	6
3 Stand der Reben Ende August 1981	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden
kann

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vor-

liegende vierte Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Zusammenhang zwischen Witterung und dem Reifebeginn der Beeren.

Erläuterung der Ergebnisse

Die Meldungen der Berichterstatter von Ende August 1981 lassen eine mengenmäßig durchschnittliche Ernte erwarten. Die Niederschläge wurden überwiegend als ausreichend, der Temperaturverlauf als normal bis günstig und die Sonnenscheindauer zu 72 % als genügend, zu 21 % als reichlich und zu 7 % als zu gering beurteilt. Aufgrund dieser mittelmäßigen bis guten Voraussetzungen gaben die Berichterstatter eine insgesamt positive Bewertung hinsichtlich der Entwicklung der Trauben ab; sie wird von 67 % der Berichterstatter als gut, zu 32 % als mittel und zu 1 % als schlecht beurteilt.

Der Beginn der Beerenreife der wichtigsten Rebsorten setzte in diesem Jahr erheblich früher als im vorigen Jahr ein; er kann aber im Vergleich mit einigen großen Jahren nur als durchschnittlich angesehen werden. Infolge dieser Entwicklung kann für die wichtigsten, frühen Rebsorten wie Müller-Thurgau und Blauer Portugieser mit einem Lesebeginn in der letzten Septemberdekade gerechnet werden. Das über den

Berichtstermin (24.8.1981) weiter anhaltende schöne Spätsommerwetter könnte allerdings die Reife der Trauben sehr stark gefördert haben, so daß ein früherer Lesebeginn auch im Bereich des Möglichen liegt.

Der Wachstumsstand der Reben wurde von den Berichterstattern mit der gleichen Note (2,8) wie im Vormonat eingestuft. Da in dieser Benotung in erster Linie die Ertragsaussichten und nicht so sehr die Qualitätserwartungen zum Ausdruck gebracht werden, kann aber aus dem Vergleich mit der Bewertung des Monats August 1980 (3,3) auf deutlich höhere Mengenerträge geschlossen werden. Es muß jedoch auf die regional sehr unterschiedliche Benotung aufmerksam gemacht werden, die einen sehr "neidischen Herbst" verspricht. In den Regionen mit sehr ungünstiger Benotung haben Frühjahrsfröste zu teilweise erheblichen Ertragsausfällen geführt.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1981		1980
							August	Juli	August
Wetterschäden									
keine	100	85	91	87	66	100	87	77	83
schwache	-	5	8	9	23	-	9	18	10
mittlere	-	5	1	3	11	-	3	4	5
starke	-	5	-	1	-	-	1	1	2
Niederschläge									
zu gering ...	50	-	3	9	1	-	6	1	2
ausreichend .	50	62	82	89	88	71	84	67	84
zu hoch	-	38	15	2	11	29	10	32	14
Temperaturverlauf									
ungünstig ...	-	12	6	2	6	-	4	46	14
normal	50	62	62	49	65	14	56	47	51
günstig	50	26	32	49	29	86	40	7	35
Sonnenscheindauer									
zu gering ...	-	21	9	4	14	-	7	66	22
genügend	50	64	78	68	73	57	72	33	62
reichlich ...	50	15	13	28	13	43	21	1	16
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	1	0	1	-	0	20	12
mittel	50	51	47	34	49	57	41	63	53
gut	50	49	52	66	50	43	59	17	35
Entwicklung der Trauben 1)									
schlecht	-	-	-	2	2	-	1	16	25
mittel	50	36	35	28	45	-	32	62	59
gut	50	64	65	70	53	100	67	22	16

1) Juli Ansatz der Trauben.

2 Beginn der Beerenreife
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nord- rhein- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
								1981	1980	1979
<u>Weiße Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	-	68	44	52	32	29	48	0	37
	21. - 24.8.	-	-	12	30	-	-	19	3	23
	25. 8. und später	100	32	44	18	68	71	33	97	40
Riesling, Weißer	bis 20.8.	-	14	5	3	5	-	4	-	4
	21. - 24.8.	-	3	5	15	5	-	10	1	8
	25. 8. und später	100	83	90	82	90	-	86	99	88
Silvaner, Grüner	bis 20.8.	.	11	11	3	12	-	8	0	7
	21. - 24.8.	.	11	9	28	2	-	17	0	16
	25. 8. und später	.	78	80	69	86	-	75	100	77
Elbling, Weißer	bis 20.8.	.	.	2	.	.	29	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	5	.	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	93	.	.	71	.	.	.
Gutedel, Weißer	bis 20.8.	.	.	.	20	.	-	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	.	34	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	.	46	.	-	.	.	.
Ruländer	bis 20.8.	.	.	12	27	.	29	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	8	38	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	80	35	.	71	.	.	.
<u>Rote Rebsorten</u>										
Portugieser, Blauer	bis 20.8.	.	33	38	37	40	-	38	1	35
	21. - 24.8.	.	33	10	46	10	-	27	2	27
	25. 8. und später	.	34	52	17	50	-	35	97	38
Burgunder, Bl. Spät	bis 20.8.	.	31	11	28	10	-	24	0	18
	21. - 24.8.	.	-	10	36	10	-	28	1	31
	25. 8. und später	.	69	79	36	80	-	48	99	51
Trollinger, Blauer	bis 20.8.	.	.	.	6	.	-	.	.	5
	21. - 24.8.	.	.	.	17	.	-	.	.	18
	25. 8. und später	.	.	.	77	.	-	.	.	77

3 Stand der Reben

3.1 Nach Ländern

1,0 (sehr gut) = weit mehr als normaler Ertrag
 2,0 (gut) = mehr als normaler Ertrag
 3,0 (mittel) = normaler Ertrag
 4,0 (gering) = weniger als normaler Ertrag
 5,0 (sehr gering) = weit weniger als normaler Ertrag

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1981		1980
	August	Juli	August
	Note		
Nordrhein-Westfalen	3,0	3,3	4,0
Hessen	2,6	2,7	3,5
Hessische Bergstraße	2,5	2,6	3,8
Rheingau	2,7	2,7	3,4
Rheinland-Pfalz	2,7	2,7	3,2
RB Koblenz	2,7	2,8	3,3
Trier	2,7	2,7	3,3
Rheinhausen-Pfalz	2,7	2,7	3,1
Ahr	3,3	3,4	3,6
Mittelrhein	2,5	2,7	3,1
Bacharach	2,6	2,7	2,9
Rhein-Burgengau	2,4	2,7	3,2
Mosel-Saar-Ruwer	2,6	2,7	3,4
Bernkastel	2,3	2,4	3,3
Obermosel	4,0	4,0	3,4
Saar-Ruwer	3,5	3,4	3,5
Zell/Mosel	2,4	2,8	3,4
Nahe	2,9	2,8	3,3
Bad Kreuznach	2,7	2,5	3,1
Schloß-Böckelheim	3,2	3,3	3,6
Rheinhausen	2,7	2,7	3,2
Bingen	2,8	2,8	3,2
Nierstein	2,7	2,8	3,3
Wonnegau	2,7	2,6	3,1
Rheinpfalz	2,7	2,7	3,0
Südliche Weinstraße	2,6	2,6	3,1
Mittelhaardt-Deutsche Weinstr. .	2,8	2,9	2,9

3 Stand der Reben

3.1 Nach Ländern

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1981		1980
	August	Juli	August
	Note		
Baden-Württemberg	2,9	3,0	3,5
Württemberg	3,1	3,3	3,1
Remstal-Stuttgart	2,8	2,7	3,0
Württembergisch Unterland	3,1	3,4	3,1
Kocher-Jagst-Tauber	3,8	3,8	4,2
Baden	2,7	2,8	3,7
Badische Bergstraße-Kraichgau ..	2,8	2,9	3,9
Badisches Frankenland	4,2	4,0	3,9
Bodensee	2,9	2,9	2,6
Markgräflerland	2,9	3,0	3,6
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,5	2,7	3,7
Breisgau	2,5	2,7	3,9
Ortenau	2,5	2,6	3,9
Bayern	3,1	3,5	3,2
RB Unterfranken	3,1	3,4	3,2
Mittelfranken	4,6	4,8	3,2
Übrige Gebiete	3,6	3,3	3,4
Saarland	3,2	3,6	3,0
Bundesgebiet ...	2,8	2,8	3,3

3.2 Im Bundesgebiet

Jahr	August	Juli	Juni	Mai
	Note			
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3
1969	2,1	2,3	2,5	2,3
1970	1,8	1,9	2,0	2,4
1971	2,5	2,6	2,7	2,3
1972	2,2	2,0	2,3	2,2
1973	1,9	2,0	2,1	2,4
1974	2,4	2,4	2,3	2,5
1975	1,9	1,9	1,9	1,8
1976	2,0	2,1	2,1	2,5
1977	2,1	2,1	2,3	2,6
1978	2,8	2,8	2,7	2,3
1979	2,5	2,5	2,6	3,0
1980	3,3	3,3	2,6	1,9
1981	2,8	2,8	2,8	3,1