

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

3. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/II - vj 3/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose im 3. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs im 3. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (Grund- und Verhältniszahlen)	6

Erkrankungs- und Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Erkrankungs- bzw. Sterbefälle beruhen, wurden eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Februar 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Zu diesen Meldungen zählen als Zugänge nur Erkrankte mit einer aktiven Tuberkulose (Gruppe I, entsprechend den Erläuterungen zur Tuberkulosestatistik vom November 1965 des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose), und zwar:

- a) Alle erstmals bekannt gewordenen Tuberkulösen einschließlich der Reaktivierten, d. h. jener Kranken, deren Tuberkulose inaktiv war und im Berichtszeitraum aktiv geworden ist.
- b) Alle Tuberkulösen, die in früheren Jahren aus der Tuberkulosefürsorge ausgeschieden waren und im Berichtszeitraum erneut erkrankten.
- c) Alle Tuberkulösen, die nach Umzug von einem in einen anderen Fürsorgebezirk dort registriert werden.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Zugänge an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten und zweiten Vierteljahres 1966 und zum Vergleich die der Vierteljahre 1965 aufgrund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach der Art und Form der Tuberkulose

im 3. Vierteljahr 1966

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose				
	insgesamt	der Atmungsorgane			anderer Organe (aktiv extrapul- monal)
		zu- sammen	an- steckungs- fähig (offen)	nichtanstek- kungsfähig (aktiv geschlossen)	

Grunoanzen

Schleswig-Holstein	543	445	171	274	98
Hamburg	492	422	136	286	70
Niedersachsen	1 625	1 383	427	956	242
Bremen	171	101	37	97	37
Nordrhein-Westfalen	5 026	4 403	1 571	2 862	593
Hessen	1 174	938	304	634	236
Rheinland-Pfalz	873	720	302	424	147
Baden-Württemberg	2 620	2 225	609	1 626	385
Bayern	2 568	2 273	766	1 509	293
Saarland	226	189	59	130	37
Berlin (West)	797	717	219	498	80
Bundesgebiet	16 115	13 897	4 601	9 296	2 218
dagegen 3. Vj. 1965	13 521	11 301	3 817	7 484	2 220

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	87,4	71,6	27,5	44,1	15,8
Hamburg	105,5	90,5	29,2	61,3	15,0
Niedersachsen	92,6	76,8	24,5	54,5	13,8
Bremen	90,8	71,1	(19,6)	51,5	(19,6)
Nordrhein-Westfalen	118,5	104,5	37,0	67,5	14,0
Hessen	89,1	71,2	23,1	48,1	17,9
Rheinland-Pfalz	96,0	79,8	33,2	46,6	16,2
Baden-Württemberg	121,8	103,9	28,3	75,6	17,9
Bayern	99,9	88,5	29,8	58,7	11,4
Saarland	79,2	66,2	20,7	45,6	(13,0)
Berlin (West)	144,4	129,9	39,7	90,2	14,5
Bundesgebiet	107,0	92,3	30,6	61,7	14,7
dagegen 3. Vj. 1965	90,7	75,8	25,6	50,2	14,9

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs

im 3. Vierteljahr 1966

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe (aktiv extrapulmonal)		
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)					
	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulose 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulose 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulose 1)	Wieder- er- krankte 2)	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 3)

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	117	51	3	195	63	16	79	18	1
Hamburg	108	27	1	21	64	11	63	6	1
Niedersachsen	264	126	37	647	230	79	192	36	14
Bremen	29	7	1	73	21	3	33	3	1
Nordrhein-Westfalen	857	693	21	1 343	1 483	36	478	105	10
Hessen	217	69	18	446	122	66	190	31	15
Rheinland-Pfalz	233	60	9	341	72	11	125	17	5
Baden-Württemberg	384	204	21	1 119	458	49	318	57	10
Bayern	506	246	14	1 116	372	21	239	51	3
Saarland	57	2	-	116	11	3	35	2	-
Berlin (West)	167	52	.	366	132	.	67	13	.
Bundesgebiet	2 939	1 537	125	5 973	3 028	295	1 819	339	60

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	18,8	8,2	(0,5)	31,4	10,1	(2,6)	12,7	(2,9)	(0,2)
Hamburg	23,2	(5,8)	(0,2)	45,2	13,7	(2,4)	13,5	(1,3)	(0,2)
Niedersachsen	15,0	7,2	(2,1)	36,9	13,1	4,5	10,9	(2,1)	(0,8)
Bremen	(15,4)	(3,7)	(0,5)	38,8	(11,1)	(1,6)	(17,5)	(1,6)	(0,5)
Nordrhein-Westfalen	20,2	16,3	(0,5)	31,7	35,0	(0,8)	11,3	2,5	(0,2)
Hessen	16,5	5,2	(1,4)	33,8	9,3	5,0	14,4	(2,4)	(1,1)
Rheinland-Pfalz	25,6	6,6	(1,0)	37,5	7,9	(1,2)	13,7	(1,9)	(0,5)
Baden-Württemberg	17,9	9,5	(1,0)	52,0	21,3	(2,3)	14,8	2,6	(0,5)
Bayern	19,7	9,6	(0,5)	43,4	14,5	(0,8)	9,3	2,0	(0,1)
Saarland	20,0	(0,7)	-	40,7	(3,9)	(1,1)	(12,3)	(0,7)	-
Berlin (West)	30,3	9,4	.	66,3	23,9	.	12,1	(2,4)	.
Bundesgebiet	19,5	10,2	0,8	39,7	20,1	2,0	12,1	2,3	0,4

1) Einschl. der Übergänge aus den Gruppen IIc, IIId, III, V.- 2) Bzw. Reaktivierete.- 3) In Niedersachsen und Hessen einschl. der Zuzüge aus den Fürsorgebezirken innerhalb der Länder.

3. Sterbefälle an Tuberkulose

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1965				1966		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Atmungsorgane							
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	83	80	67	77	82	71	74
Hamburg	71	65	50	50	60	54	44
Niedersachsen	210	207	180	180	213	186	183
Bremen	12	11	11	23	25	19	9
Nordrhein-Westfalen	501	434	441	513	458	459	395
Hessen	105	97	93	119	108	90	74
Rheinland-Pfalz	119	110	104	107	109	116	88
Baden-Württemberg	231	215	211	230	236	211	174
Bayern	408	395	322	381	382	356	335
Saarland	50	42	35	46	40	31	30
Berlin (West)	104	97	100	99	110	63	76
Bundesgebiet	1 894	1 753	1 622	1 830	1 823	1 656	1 482
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	14,0	13,3	10,9	12,5	13,6	11,6	11,9
Hamburg	15,5	14,0	12,4	10,7	13,1	11,7	(9,4)
Niedersachsen	12,4	12,1	10,3	10,3	12,5	10,7	10,4
Bremen	(6,6)	(6,0)	(5,9)	(12,3)	(13,6)	(10,2)	(4,8)
Nordrhein-Westfalen	12,3	10,5	10,5	12,3	11,1	11,0	9,3
Hessen	8,4	7,6	7,2	9,1	8,5	6,9	5,6
Rheinland-Pfalz	13,6	12,4	11,5	11,9	12,3	12,9	9,7
Baden-Württemberg	11,3	10,3	10,0	10,8	11,3	10,0	8,1
Bayern	16,6	15,8	12,7	15,0	15,3	14,0	13,0
Saarland	18,1	(15,0)	(12,3)	(16,2)	(14,4)	(11,0)	10,5
Berlin (West)	19,2	17,7	18,0	17,9	20,3	11,5	13,8
Bundesgebiet	13,1	11,9	10,9	12,2	12,5	11,1	9,8
Andere Organe							
Schleswig-Holstein	3	3	3	1	2	5	9
Hamburg	6	8	2	2	-	4	3
Niedersachsen	17	16	13	16	11	17	8
Bremen	1	3	1	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	25	25	28	49	35	25	38
Hessen	5	10	6	15	7	12	7
Rheinland-Pfalz	5	9	11	8	7	6	6
Baden-Württemberg	16	25	20	18	20	25	13
Bayern	12	21	19	15	22	22	18
Saarland	-	3	1	-	-	2	1
Berlin (West)	12	10	8	2	8	6	5
Bundesgebiet	102	133	112	129	112	124	108
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Bundesgebiet	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7