

XXIII. Krebsstatistik

Seit dem 2. Halbjahr 1966 werden im saarländischen Krebsregister alle Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung erfaßt. Durch die Morbiditätsstatistik (Krankheitsstatistik) wird es möglich, Aussagen über die Häufigkeit der Krebserkrankungen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht zu machen und den Verlauf der Krankheit zu beobachten.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen und über die häufigsten Krebsformen bei Männern und Frauen.

1. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren 1975 bis 1988

Erfassungs- jahr	Erkrankte Personen				Veränderungen zum Vorjahr in %		
	männlich	weiblich	zusammen	Geschlechts- proportion: Auf 100 Männer entfielen ... Frauen			
	Anzahl				männlich	weiblich	insgesamt
1975	2 200	2 282	4 482	103,7	+ 14,6	+ 10,3	+ 12,4
1976	2 257	2 230	4 487	98,8	+ 2,6	− 2,3	+ 0,1
1977	2 180	2 255	4 435	103,4	− 3,4	+ 1,1	− 1,2
1978	2 198	2 206	4 404	100,4	+ 0,8	− 2,2	− 0,7
1979	2 232	2 184	4 416	97,8	+ 1,5	− 1,0	+ 0,3
1980	2 320	2 360	4 680	101,7	+ 3,9	+ 8,1	+ 6,0
1981	2 222	2 321	4 543	104,5	− 4,2	− 1,7	− 2,9
1982	2 283	2 484	4 767	108,8	+ 2,7	+ 7,0	+ 4,9
1983	2 414	2 494	4 908	103,3	+ 5,7	+ 0,4	+ 3,0
1984	2 383	2 460	4 843	103,2	− 1,3	− 1,4	− 1,3
1985	2 391	2 459	4 850	102,8	+ 0,3	− 0,0	+ 0,1
1986	2 527	2 511	5 038	99,4	+ 5,7	+ 2,1	+ 3,9
1987	2 414	2 412	4 826	99,9	− 4,5	− 3,9	− 4,2
1988	2 361	2 404	4 765	101,8	− 2,2	− 0,3	− 1,3

2. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren nach Alter und Geschlecht 1988

Altersgruppen	Erkrankte Personen					
	männlich		weiblich		zusammen	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
0 bis unter 5	3	0,1	2	0,1	5	0,1
5 – 10	2	0,1	2	0,1	4	0,1
10 – 15	3	0,1	4	0,2	7	0,1
15 – 20	2	0,1	3	0,1	5	0,1
20 – 25	9	0,4	7	0,3	16	0,3
25 – 30	20	0,8	19	0,8	39	0,8
30 – 35	19	0,8	26	1,1	45	0,9
35 – 40	44	1,9	53	2,2	97	2,0
40 – 45	54	2,3	62	2,6	116	2,4
45 – 50	122	5,2	137	5,7	259	5,4
50 – 55	201	8,5	152	6,3	353	7,4
55 – 60	267	11,3	204	8,5	471	9,9
60 – 65	327	13,9	277	11,5	604	12,7
65 – 70	369	15,6	335	13,9	704	14,8
70 – 75	279	11,8	264	11,0	543	11,4
75 – 80	331	14,0	375	15,6	706	14,8
80 – 85	215	9,1	307	12,8	522	11,0
85 und mehr	94	4,0	175	7,3	269	5,6
Zusammen	2 361	100,0	2 404	100,0	4 765	100,0

3. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen 1986 bis 1988

Lokalisation	1986		1987		1988	
	Neuerkrankungen					
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%

Männer

Speiseröhre	42	1,7	46	1,9	41	1,7
Magen	146	5,8	143	5,9	129	5,5
Dickdarm und Mastdarm	347	13,7	327	13,5	281	11,9
Leber, Gallenwege	60	2,4	46	1,9	51	2,2
Bauchspeicheldrüse	55	2,2	55	2,3	60	2,5
Bronchien	474	18,8	496	20,5	523	22,2
Haut (Melanome und sonstige bösartige Neubildungen)	365	14,4	281	11,6	388	16,4
Prostata	235	9,3	221	9,2	187	7,9
Hoden	34	1,4	40	1,7	29	1,2
Harnorgane	250	9,9	252	10,4	199	8,4
Zusammen	2 008	79,5	1 907	79,0	1 888	80,0
Alle Lokalisationen	2 527	100,0	2 414	100,0	2 361	100,0

Frauen

Magen	157	6,3	154	6,4	102	4,2
Dickdarm und Mastdarm	388	15,5	344	14,3	343	14,3
Leber, Gallenwege	90	3,6	89	3,7	106	4,4
Bronchien	81	3,2	82	3,4	92	3,8
Haut (Melanome und sonstige bösartige Neubildungen)	301	12,0	342	14,2	396	16,5
Brustdrüse	531	21,2	508	21,1	524	21,8
Gebärmutterhals	90	3,6	82	3,4	100	4,2
Gebärmutter	157	6,3	138	5,7	137	5,7
Eierstock, Eileiter	97	3,9	90	3,7	77	3,2
Harnorgane	119	4,7	110	4,6	84	3,5
Zusammen	2 011	80,1	1 939	80,4	1 961	81,6
Alle Lokalisationen	2 511	100,0	2 412	100,0	2 404	100,0