


# Statistische Berichte

des Statistischen Amtes des Saarlandes



Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3,

Fernsprecher 59 29

A IV 5 - 1968/72

Ausgegeben am 17. Oktober 1973

## Tuberkulose im Saarland

Im Jahre 1956 wurde im Saarland erstmalig eine Morbiditätsstatistik nach bundeseinheitlichen Richtlinien durchgeführt, um den Bestand der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen zu ermitteln. Nach den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen der Staatlichen Gesundheitsämter waren am 31. 12 1956 insgesamt 7 078 Personen erkrankt und den Gesundheitsämtern bekannt. Trotz einer Bevölkerungszunahme von rund 113 000 Personen verringerte sich die Zahl der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den folgenden 16 Jahren bis zum 31. 12. 1972 um 3 620 oder 51,2 % auf 3 458 Personen. Auf 100 000 Einwohner kamen 1956 noch mehr als 700 Tuberkulöse, 1967 waren es noch 365 und am Ende des Jahres 1972 belief sich die Zahl auf 309 Erkrankte, das bedeutet einen Rückgang auf knapp die Hälfte des Bestandes von 1956.

Von den am 31. 12. 1972 erfassten Personen waren 26 % an Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tbc-Bakterien, 59 % an Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tbc-Bakterien um 15 % an Tuberkulose anderer Organe erkrankt. Bei den Neuzugängen des Jahres 1972 ergab sich eine prozentuale Verteilung von 36 %, 47 % und 17 % für die vorgenannten Krankheitsgruppen. Die Gesamtzahl der Neuzugänge hat sich seit 1956 um über die Hälfte verringert; sie belief sich im Berichtsjahr 1972 auf 832 Personen, wobei die Männer mit 66 % dominierten.

Statistische Berichte mit \*(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

### Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Jahr	Tuberkulose							
	insgesamt		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer	ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer		
Grundzahlen								
1968	1 193	39	345	10	686	26	162	3
1969	1 087	50	302	13	603	34	182	3
1970	1 051	39	328	12	575	25	148	2
1971	1 029	36	321	6	553	21	155	9
1972	832	45	303	9	388	28	141	8
Verhältniszahlen <sup>1)</sup>								
1968	105,5	3,5	30,5	0,9	60,7	2,3	14,3	0,3
1969	96,3	4,4	26,8	1,1	53,4	3,0	16,1	0,3
1970	93,9	3,5	29,3	1,1	51,4	2,2	13,2	0,2
1971	91,7	3,2	28,6	0,5	49,3	1,9	13,8	0,8
1972	74,2	4,0	27,0	0,8	34,6	2,5	12,6	0,7

### Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember des Jahres

Jahr	Tuberkulose							
	insgesamt		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer	ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer		
Grundzahlen								
1968	3 955	73	1 230	18	2 205	50	520	5
1969	3 950	82	1 175	26	2 211	51	564	5
1970	3 913	92	1 141	27	2 221	59	551	6
1971	3 824	93	1 056	19	2 221	62	547	12
1972	3 458	102	892	19	2 049	67	517	16
Verhältniszahlen 1)								
1968	349,9	6,5	108,8	1,6	195,1	4,4	46,0	0,4
1969	350,0	7,3	104,1	2,3	195,9	4,5	50,0	0,4
1970	349,5	8,2	101,9	2,4	198,3	5,3	49,2	0,5
1971	340,8	8,3	94,1	1,7	197,9	5,5	48,7	1,1
1972	308,6	9,1	79,6	1,7	182,8	6,0	46,1	1,4

<sup>1)</sup> Auf 100 000 der Bevölkerung.

**Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht**  
am 31. 12. 1972

Altersgruppe	Aktive Tuberkulose											
	Absolute Zahlen						Verhältniszahlen auf 10 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe					
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	
	mit Nachweis v. Tbk. Bakt.		ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.		insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	mit Nachweis v. Tbk. Bakt.		ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.		Tuberkulose anderer Organe	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1 Jahr	—	—	2	—	2	—	—	—	3,6	—	—	—
1 bis unter 5 Jahren	—	—	7	6	7	—	—	—	2,4	2,1	—	2,1
5 bis unter 10 Jahren	—	—	25	20	27	4	—	—	5,2	4,3	0,4	5,0
10 bis unter 15 Jahren	1	1	43	33	50	4	0,2	0,2	8,4	7,5	1,2	8,7
15 bis unter 20 Jahren	7	7	64	47	78	10	1,5	1,8	14,1	11,9	1,5	16,2
20 bis unter 25 Jahren	16	24	109	71	144	21	3,9	6,1	26,4	18,0	4,6	29,4
25 bis unter 30 Jahren	29	14	56	43	94	18	9,6	5,0	18,5	15,2	3,0	26,6
30 bis unter 35 Jahren	41	16	84	60	135	25	9,8	3,9	20,1	14,7	2,4	24,7
35 bis unter 40 Jahren	46	13	102	41	168	20	11,3	3,3	25,1	10,4	4,9	18,8
40 bis unter 45 Jahren	57	14	96	47	180	27	15,2	3,9	25,5	13,0	7,2	24,3
45 bis unter 50 Jahren	51	20	128	36	214	31	15,5	5,0	38,9	8,9	10,6	21,6
50 bis unter 55 Jahren	48	25	111	52	185	21	18,0	7,0	41,7	14,5	9,8	27,3
55 bis unter 60 Jahren	63	10	120	33	202	21	29,2	3,3	55,7	10,9	8,8	21,2
60 bis unter 65 Jahren	102	9	166	38	294	34	38,6	2,3	62,7	9,9	9,8	21,1
65 bis unter 70 Jahren	133	9	145	21	293	16	54,6	2,7	59,5	6,2	6,2	13,7
70 bis unter 75 Jahren	70	12	100	32	183	14	42,1	4,8	60,1	12,7	7,8	23,0
75 bis unter 80 Jahren	32	5	53	22	87	8	39,4	3,2	65,2	14,2	2,5	22,6
80 und mehr Jahre	11	6	27	9	41	4	18,9	5,6	46,5	8,4	5,2	17,8
Insgesamt	707	185	1 438	611	2 384	278	13,3	3,2	27,0	10,4	4,5	18,3