


# Statistische Berichte

## Statistisches Landesamt SAARLAND

6600 Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3. Postfach 409, ☎ 0681/505-1 Telefax 0681/505 921-3 Btx \* 2039560



A IV 5 – j 1989

Ausgegeben am 29. Mai 1991

### Tuberkulose im Saarland 1989

#### Überblick

Im Jahr 1989 erkrankten im Saarland 187 Personen an Tuberkulose. Das waren 13 % weniger als im Vorjahr.

In der überwiegenden Zahl der Fälle (165) handelte es sich um eine Lungentuberkulose, andere Organe waren nur in 22 Fällen betroffen.

Die Erkrankungsziffer (Erkrankte je 100 000 Einwohner) sank von durchschnittlich 20,5 auf 17,7. Sie lag wie in den Vorjahren für Männer (24,8) erheblich über der für Frauen (11,1).

#### Verteilung der Inzidenzen nach Altersgruppen 1986 bis 1989

Alter von ... bis unter ... Jahren	1986		1987		1988		1989	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 15	5	1,7	3	1,3	3	1,4	5	2,7
15 bis unter 25	17	5,9	19	7,9	15	6,9	11	5,9
25 bis unter 40	60	20,9	48	20,5	39	18,1	34	18,2
40 bis unter 65	152	53,0	92	38,5	82	38,0	66	35,3
65 und mehr	53	18,5	76	31,8	77	35,6	71	38,0
<b>INSGESAMT</b>	<b>287</b>	<b>100</b>	<b>239</b>	<b>100</b>	<b>216</b>	<b>100</b>	<b>187</b>	<b>100</b>

## 1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1989

Altersgruppe in Jahren						Aktive der		
	Alle Formen							
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	—	1	1	1	—	—	—	—
5 bis unter 10	1	2	3	3	—	—	—	—
10 bis unter 15	1	—	1	1	—	—	—	—
15 bis unter 20	1	—	1	1	—	—	—	—
20 bis unter 25	6	4	10	10	—	3	4	7
25 bis unter 30	7	4	11	9	2	5	3	8
30 bis unter 35	4	4	8	8	—	2	1	3
35 bis unter 40	11	4	15	13	2	6	1	7
40 bis unter 45	6	2	8	8	—	3	2	5
45 bis unter 50	15	3	18	17	1	9	1	10
50 bis unter 55	12	6	18	13	5	9	2	11
55 bis unter 60	6	1	7	7	—	4	—	4
60 bis unter 65	12	3	15	10	5	8	3	11
65 bis unter 70	14	4	18	13	5	11	2	13
70 und mehr	30	23	53	45	8	24	14	38
<b>INSGESAMT</b>	<b>126</b>	<b>61</b>	<b>187</b>	<b>159</b>	<b>28</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>117</b>

## 2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1989 nach

Stadtverband Landkreis <b>LAND</b>	Alle Formen					Tuber- mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
Saarbrücken	49	27	76	59	17	34	14	48
Merzig-Wadern	5	4	9	8	1	3	2	5
Neunkirchen	38	13	51	46	5	25	8	33
Saarlouis	13	7	20	17	3	6	4	10
Saarpfalz-Kreis	4	4	8	8	—	2	3	5
St. Wendel	17	6	23	21	2	14	2	16
<b>SAARLAND</b>	<b>126</b>	<b>61</b>	<b>187</b>	<b>159</b>	<b>28</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>117</b>

## nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose											
Atmungsorgane							anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
7	—	2	—	2	2	—	1	—	1	1	—
6	2	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—
3	—	1	2	3	3	—	1	1	2	2	—
6	1	4	1	5	5	—	1	2	3	2	1
5	—	2	—	2	2	—	1	—	1	1	—
10	—	5	1	6	5	1	1	1	2	2	—
8	3	3	4	7	5	2	—	—	—	—	—
4	—	1	1	2	2	—	1	—	1	1	—
7	4	3	—	3	3	—	1	—	1	—	1
9	4	1	2	3	2	1	2	—	2	2	—
31	7	2	4	6	5	1	4	5	9	9	—
96	21	29	19	48	43	5	13	9	22	20	2

## Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte
35	13	12	10	22	19	3	3	3	6	5	1
5	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	1
29	4	9	5	14	13	1	4	—	4	4	—
7	3	4	2	6	6	—	3	1	4	4	—
5	—	2	—	2	2	—	—	1	1	1	—
15	1	2	2	4	3	1	1	2	3	3	—
96	21	29	19	48	43	5	13	9	22	20	2

### 3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1985 bis 1989

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1985	184	36,9	103	20,7	62	12,4	19	3,8
1986	175	35,3	104	20,9	45	9,1	26	5,2
1987	153	30,9	87	17,5	49	9,9	17	3,4
1988	152	30,1	108	21,4	32	6,3	12	2,4
1989	126	24,8	84	16,5	29	5,7	13	2,6
weiblich								
1985	95	17,3	44	8,0	26	4,7	25	4,5
1986	112	20,5	53	9,7	30	5,5	29	5,3
1987	86	15,8	42	7,7	22	4,0	22	4,0
1988	64	11,7	26	4,7	18	3,3	20	3,6
1989	61	11,1	33	6,0	19	3,5	9	1,6
INSGESAMT								
1985	279	26,6	147	14,0	88	8,4	44	4,2
1986	287	27,5	157	15,0	75	7,2	55	5,3
1987	239	22,9	129	12,4	71	6,8	39	3,7
1988	216	20,5	134	12,7	50	4,7	32	3,0
1989	187	17,7	117	11,1	48	4,5	22	2,1

### 4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1989 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	5	2	3	—	—	—	5	2	3	—	—	—
15 bis unter 25	11	7	4	7	3	4	3	3	—	1	1	—
25 bis unter 40	34	22	12	18	13	5	11	7	4	5	2	3
40 bis unter 65	66	51	15	41	33	8	20	14	6	5	4	1
65 und mehr	71	44	27	51	35	16	9	3	6	11	6	5
INSGESAMT	187	126	61	117	84	33	48	29	19	22	13	9
auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	3,3	2,6	4,1	—	—	—	3,3	2,6	4,1	—	—	—
15 bis unter 25	7,6	9,5	5,7	4,8	4,1	5,7	2,1	4,1	—	0,7	1,4	—
25 bis unter 40	13,4	16,8	9,8	7,1	9,9	4,1	4,3	5,3	3,3	2,0	1,5	2,4
40 bis unter 65	19,1	29,9	8,6	11,9	19,4	4,6	5,8	8,2	3,4	1,5	2,3	0,6
65 und mehr	43,5	79,5	25,1	31,3	63,2	14,9	5,5	5,4	5,6	6,7	10,8	4,6
INSGESAMT	17,7	24,8	11,1	11,1	16,5	6,0	4,5	5,7	3,5	2,1	2,6	1,6