

Statistische Berichte

Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3. Postfach 409, ☎ 0681/505-1 Telex Btx 0681 505 1+ Btx * 2039560

A IV 5 — j 1986

Ausgegeben am 6. Juli 1988

Tuberkulose im Saarland 1986

Hinweis

Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen werden ab 1986 nur noch die Zugänge an Tuberkulosekranken nachgewiesen.

Überblick

Im Verlauf des Jahres 1986 erkrankten im Saarland 287 Personen, rund 3 % mehr als im Vorjahr, an aktiver Tuberkulose. Bei vier von fünf Neuerkrankungen wurde eine Lungentuberkulose festgestellt. Die Erkrankungsziffer (Erkrankte je 100 000 Einwohner) stieg von 26,6 auf 27,5; sie lag für Männer (35,3) erheblich über der für Frauen (20,5).

Verteilung der Inzidenzen nach Altersgruppen 1983 bis 1986

Alter von ... bis unter ... Jahren	1983		1984		1985		1986	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 15	14	4,3	16	6,1	5	1,8	5	1,7
15 bis unter 25	24	7,4	22	8,4	24	8,6	17	5,9
25 bis unter 40	61	18,8	44	16,9	56	20,1	60	20,9
40 bis unter 65	163	50,1	121	46,4	132	47,3	152	53,0
65 und mehr	63	19,4	58	22,2	62	22,2	53	18,5
INSGESAMT	325	100	261	100	279	100	287	100

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Altersgruppe in Jahren						Aktive		
	Alle Formen					der		
						mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
Erst-				Wieder- erkrankte				
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	1	—	1	1	—	—	—	—
5 bis unter 10	2	2	4	4	—	—	—	—
10 bis unter 15	—	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 20	2	2	4	4	—	1	2	3
20 bis unter 25	2	11	13	12	1	—	6	6
25 bis unter 30	13	9	22	21	1	9	—	9
30 bis unter 35	7	8	15	13	2	5	3	8
35 bis unter 40	17	6	23	22	1	11	5	16
40 bis unter 45	18	3	21	17	4	9	1	10
45 bis unter 50	17	9	26	20	6	11	2	13
50 bis unter 55	17	6	23	18	5	12	2	14
55 bis unter 60	23	13	36	31	5	10	6	16
60 bis unter 65	21	25	46	37	9	15	16	31
65 bis unter 70	28	10	38	31	7	17	5	22
70 und mehr	7	8	15	12	3	4	5	9
INSGESAMT	175	112	287	243	44	104	53	157

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1986 nach

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen					Tuber- mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
Saarbrücken	77	37	114	91	23	44	13	57
Merzig-Wadern	16	15	31	25	6	10	11	21
Neunkirchen	24	26	50	42	8	16	10	26
Saarlouis	28	18	46	46	—	20	12	32
Saar-Pfalz-Kreis	17	9	26	21	5	7	4	11
St. Wendel	13	7	20	18	2	7	3	10
SAARLAND	175	112	287	243	44	104	53	157

im Jahre 1986 nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose											
Atmungsorgane							anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
—	—	1	1	2	2	—	1	1	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
6	—	2	3	5	4	1	—	2	2	2	—
8	1	3	7	10	10	—	1	2	3	3	—
8	—	1	2	3	3	—	1	3	4	2	2
15	1	4	1	5	5	—	2	—	2	2	—
8	2	5	2	7	6	1	4	—	4	3	1
10	3	3	2	5	3	2	3	5	8	7	1
12	2	3	2	5	3	2	2	2	4	3	1
15	1	8	5	13	11	2	5	2	7	5	2
25	6	3	3	6	3	3	3	6	9	9	—
19	3	9	1	10	6	4	2	4	6	6	—
7	2	3	1	4	3	1	—	2	2	2	—
136	21	45	30	75	59	16	26	29	55	48	7

Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon	
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
46	11	18	13	31	23	8	15	11	26	22	4
17	4	5	—	5	3	2	1	4	5	5	—
22	4	6	11	17	13	4	2	5	7	7	—
32	—	4	2	6	6	—	4	4	8	8	—
9	2	7	2	9	8	1	3	3	6	4	2
10	—	5	2	7	6	1	1	2	3	2	1
136	21	45	30	75	59	16	26	29	55	48	7

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1982 bis 1986

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1982	245	48,7	129	25,6	77	15,3	39	7,8
1983	209	41,8	123	24,6	57	11,4	29	5,8
1984	162	32,5	93	18,6	54	10,8	15	3,0
1985	184	36,9	103	20,7	62	12,4	19	3,8
1986	175	35,3	104	20,9	45	9,1	26	5,2
weiblich								
1982	125	22,4	58	10,4	38	6,8	29	5,2
1983	116	20,9	46	8,3	33	6,0	37	6,7
1984	99	17,9	28	5,1	43	7,8	28	5,1
1985	95	17,3	44	8,0	26	4,7	25	4,5
1986	112	20,5	53	9,7	30	5,5	29	5,3
INSGESAMT								
1982	370	34,9	187	17,6	115	10,8	68	6,4
1983	325	30,8	169	16,0	90	8,5	66	6,3
1984	261	24,8	121	11,5	97	9,2	43	4,1
1985	279	26,6	147	14,0	88	8,4	44	4,2
1986	287	27,5	157	15,0	75	7,2	55	5,3

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1986 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	5	3	2	—	—	—	2	1	1	3	2	1
15 bis unter 25	17	4	13	9	1	8	5	2	3	3	1	2
25 bis unter 40	60	37	23	33	25	8	18	8	10	9	4	5
40 bis unter 65	152	96	56	84	57	27	36	22	14	32	17	15
65 und mehr	53	35	18	31	21	10	14	12	2	8	2	6
Insgesamt	287	175	112	157	104	53	75	45	30	55	26	29
auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	3,4	3,9	2,8	—	—	—	1,3	1,3	1,4	2,0	2,6	1,4
15 bis unter 25	10,0	4,6	15,7	5,3	1,1	9,7	2,9	2,3	3,6	1,8	1,1	2,4
25 bis unter 40	26,0	31,2	20,5	14,3	21,1	7,1	7,8	6,8	8,9	3,9	3,4	4,4
40 bis unter 65	44,4	58,8	31,3	24,5	34,9	15,1	10,5	13,5	7,8	9,3	10,4	8,4
65 und mehr	34,9	68,1	17,9	20,4	40,9	9,9	9,2	23,4	2,0	5,3	3,9	6,0
Insgesamt	27,5	35,3	20,5	15,0	20,9	9,7	7,2	9,1	5,5	5,3	5,2	5,3