


Statistische Berichte

Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3. Postfach 409, ☎ 0681/505-1 Telex Btx 0681 505 1 + Btx * 2039560

A IV 5 — j 1987

Ausgegeben am 10. Mai 1989



Tuberkulose im Saarland 1987

Überblick

Im Jahr 1987 erkrankten im Saarland 239 Personen an Tuberkulose, das waren 17 % weniger als im Vorjahr.

Damit setzte sich der langjährige rückläufige Trend der Tuberkuloseerkrankungen fort. Vor zehn Jahren lag die Zahl der Erkrankungen noch etwa doppelt so hoch, vor zwanzig Jahren sogar fünfmal höher.

In der überwiegenden Zahl der Fälle (200) handelte es sich um eine Lungentuberkulose, andere Organe waren nur in 39 Fällen betroffen.

Die Erkrankungsziffer (Erkrankte je 100 000 Einwohner) sank von 27,5 auf 22,9. Sie lag wie in den Vorjahren für Männer (30,9) erheblich über der für Frauen (15,8).

Verteilung der Inzidenzen nach Altersgruppen 1984 bis 1987

Alter von ... bis unter ... Jahren	1984		1985		1986		1987	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 15	16	6,1	5	1,8	5	1,7	3	1,3
15 bis unter 25	22	8,4	24	8,6	17	5,9	19	7,9
25 bis unter 40	44	16,9	56	20,1	60	20,9	49	20,5
40 bis unter 65	121	46,4	132	47,3	152	53,0	92	38,5
65 und mehr	58	22,2	62	22,2	53	18,5	76	31,8
INSGESAMT	261	100	279	100	287	100	239	100

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1987

Altersgruppe in Jahren	Aktive der							
	Alle Formen					mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	—	1	1	1	—	—	—	—
5 bis unter 10	1	—	1	1	—	—	—	—
10 bis unter 15	—	1	1	1	—	—	1	1
15 bis unter 20	5	2	7	6	1	1	1	2
20 bis unter 25	3	9	12	12	—	2	6	8
25 bis unter 30	11	11	22	22	—	6	5	11
30 bis unter 35	7	5	12	12	—	3	2	5
35 bis unter 40	9	6	15	13	2	7	4	11
40 bis unter 45	9	—	9	8	1	6	—	6
45 bis unter 50	10	6	16	13	3	7	3	10
50 bis unter 55	22	6	28	17	11	9	2	11
55 bis unter 60	16	3	19	14	5	9	1	10
60 bis unter 65	15	5	20	15	5	9	2	11
65 bis unter 70	13	6	19	12	7	8	3	11
70 und mehr	32	25	57	48	9	20	12	32
INSGESAMT	153	86	239	195	44	87	42	129

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1987 nach

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen					Tuber- mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
Saarbrücken	59	26	85	65	20	30	11	41
Merzig-Wadern	17	8	25	20	5	11	4	15
Neunkirchen	32	20	52	42	10	19	11	30
Saarlouis	16	12	28	25	3	10	7	17
Saar-Pfalz-Kreis	18	9	27	23	4	12	4	16
St. Wendel	11	11	22	20	2	5	5	10
SAARLAND	153	86	239	195	44	87	42	129

nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose											
Atmungsorgane							anderer Organe				
riennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon	
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	3	1	4	3	1	1	—	1	1	—
8	—	1	2	3	3	—	—	1	1	1	—
11	—	5	5	10	10	—	—	1	1	1	—
5	—	2	—	2	2	—	2	3	5	5	—
10	1	—	1	1	1	—	2	1	3	2	1
6	—	3	—	3	2	1	—	—	—	—	—
8	2	3	1	4	3	1	—	2	2	2	—
8	3	10	1	11	4	7	3	3	6	5	1
7	3	5	2	7	5	2	2	—	2	2	—
8	3	3	1	4	2	2	3	2	5	5	—
9	2	5	1	6	1	5	—	2	2	2	—
30	2	9	6	15	11	4	3	7	10	7	3
113	16	49	22	71	48	23	17	22	39	34	5

Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte
35	6	24	8	32	20	12	5	7	12	10	2
12	3	2	1	3	1	2	4	3	7	7	—
26	4	11	5	16	12	4	2	4	6	4	2
16	1	4	3	7	6	1	2	2	4	3	1
14	2	3	5	8	6	2	3	—	3	3	—
10	—	5	—	5	3	2	1	6	7	7	—
113	16	49	22	71	48	23	17	22	39	34	5

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1983 bis 1987

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1983	209	41,8	123	24,6	57	11,4	29	5,8
1984	162	32,5	93	18,6	54	10,8	15	3,0
1985	184	36,9	103	20,7	62	12,4	19	3,8
1986	175	35,3	104	20,9	45	9,1	26	5,2
1987	153	30,9	87	17,5	49	9,9	17	3,4
weiblich								
1983	116	20,9	46	8,3	33	6,0	37	6,7
1984	99	17,9	28	5,1	43	7,8	28	5,1
1985	95	17,3	44	8,0	26	4,7	25	4,5
1986	112	20,5	53	9,7	30	5,5	29	5,3
1987	86	15,8	42	7,7	22	4,0	22	4,0
INSGESAMT								
1983	325	30,8	169	16,0	90	8,5	66	6,3
1984	261	24,8	121	11,5	97	9,2	43	4,1
1985	279	26,6	147	14,0	88	8,4	44	4,2
1986	287	27,5	157	15,0	75	7,2	55	5,3
1987	239	22,9	129	12,4	71	6,8	39	3,7

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1987 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	3	1	2	1	—	1	1	—	1	1	1	—
15 bis unter 25	19	8	11	10	3	7	7	4	3	2	1	1
25 bis unter 40	49	27	22	27	16	11	13	7	6	9	4	5
40 bis unter 65	92	72	20	48	40	8	29	24	5	15	8	7
65 und mehr	76	45	31	43	28	15	21	14	7	12	3	9
INSGESAMT	239	153	86	129	87	42	71	49	22	39	17	22
auf 100000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	2,1	1,4	2,9	0,7	—	1,5	0,7	—	1,5	0,7	1,4	—
15 bis unter 25	12,0	9,9	14,2	6,3	3,7	9,1	4,4	4,9	3,9	1,3	1,2	1,3
25 bis unter 40	20,2	21,6	18,7	11,1	12,8	9,3	5,4	5,6	5,1	3,7	3,2	4,2
40 bis unter 65	27,3	44,3	11,4	14,2	24,6	4,6	8,6	14,8	2,9	4,4	4,9	4,0
65 und mehr	46,9	81,6	29,0	26,5	50,8	14,0	13,0	25,4	6,5	7,4	5,4	8,4
INSGESAMT	22,9	30,9	15,8	12,4	17,5	7,7	6,8	9,9	4,0	3,7	3,4	4,0